

52030 | B

Digitized by the Internet Archive
in 2017 with funding from
Wellcome Library



WENCESLAI TRNKA
DE KRŽOWITZ

S. R. I. EQVITIS MEDICIN. DOCTOR.
IN REG. UNIVERS. THERESIANA BU-
DENSI PATHOLOGICÆ PRO-
FESSORIS P. O.

HISTORIA
AMAUROSEOS

OMNIS AEVI OBSERVATA
MEDICA CONTINENS.

PARS II.



VINDOBONAE

Prostat apud RUD. GRÆFFERUM.

MDCCLXXXI.

306038





HISTORIAE
AMAUROSEOS
PARS II.

DE METHODO MEDENDI
AMAUROSIS.

PROLEGOMENON.

§. 62.

In limine curationis amauroseos paucis innuisse tironi sat erit, eadem hic prorsus obtinere, quæ in *Cophoseos historia* (q) nuper

(q) §. 24. p. 102. 103.

a me edita de *indicante*, *indicatione*, *indicatisque* in medium attuli; modo ad organum visorium ejusque morbum præsentem applicentur: ut proinde haud visum fuerit, eadem huc verba eandemque rem transcribere. Isthoc præmonito mox ad varia indicata, quæ varia ætate adversus amaurosin sunt reperta, faciemus transitum.

S E C T I O I.
PHARMACEUTICA REMEDIA
INTERNO USUI DICATA.

C A P U T I.
E M E T I C A.

§ 63.

E M E T I C A. adversus amaurosin commendare paradoxum forte cuiquam videri posset, tum quod ab iis assumptis amaurosin fuisse natam (r) constet, tum quod artis periti serio dissuadeant illa hic exhiberi, vel certe

(r) Vide §. 39. b).

non sine circumspectione danda esse arbitrentur. M. ETTMÜLLERUS (s) „ vomitoria caute usurpentur „ ait. Verum si emetica, quia vomitus amaurosin causavit, forent rejicienda, eodem sane jure ac metu & alvi purgatio, & missio sanguinis, & vesicantia, probatissima ad curandam amaurosin præsidia, quæ perinde morbum hunc subinde accivere (t), essent reprobanda. Et quoniam amaurosis vomitu cum sponte oborto (u) tum arte moto sæpenumero profligata est, non est, cur ab emeticorum usu ejus in curatione pauca exempla sinistra absterreant quemquam. S. YVES (x) refert Ecclesiasticum paucis post diebus, quam amaurosi correptus est, sumpto prima die emetico, altera die tusa vena jugulari, cum biduo inde post alterum usurpasset emeticum, visum cœpisse recuperare, quem dein vapor e ∇ oculo immissus brevi restituit. GÜNZII (y) „ feminæ 30 circ. annor... cum ferrea trabs „ in dextram lateralem ossis frontis partem

(s) Opp. omn. T. 2. P. 1. f. m. 731.

(t) Vide §. 39. a). c). §. 36. a).

(u) Vide §. 60. No 5. d).

(v) l. c. Cap. 27. §. 15.

(y) l. c. §. 8. p. 17. sq.

„ incidisset, in dextro oculo videndi facul-
„ tas ablata est. Huic feminae primum san-
„ gvis ex vena brachii detractus est, &
„ altero die post in mannæ solutione stibium
„ datum, quod eam sæpius vomere coegit.
„ Redeunte protinus aliquo lucis sensu, &
„ dolore capitis imminuto, jussit Medicus
„ feminam aquas minerales per octiduum
„ potare, tumque iterum emeticam medi-
„ cinam dedit, & acie magis acuta reddita
„ rediit femina ad aquarum usum, tandem-
„ que 4 septimanarum spatio perfecte sana-
„ ta est. Alterum exemplum pueri est, cui
„ acies fuit ob repressam tineam erepta: is-
„ que brevi ad sanitatem rediit, cum ipsi-
„ fere eadem medendi ratio adhiberetur;
„ namque fuerunt tantum aliqua in victus
„ ratione mutata „. Clarius etiam effica-
„ ciam emeticorum docent observationes ab
E. RIBE (z) factæ, nempe rusticola ad 20
annos natus in silva ex arbore in terram præ-
ceps lapsus, parvo inde incommodo perce-
pto domum sanus vegetusque revertit. At
postero die totum brachium dextrum prorsus
paralyticum factum est, exiguo sensu in eo-
dem superstito; simulque visus adeo cœpit
obscurari, ut post 24 horas ex toto perierit.

(z) Act. Svec. Vol. 1. Trimestr. 1. No 10.

Post 8 dies consultus Medicus exhibuit emeticum; alteroqve die jam æger lucem inter ac tenebras, dum palpebras attolleret & clauderet, discrimen sensit. Biduo post emeticum iteratum discrimen lucis ac tenebrarum auxit, nulla interea in paralytico brachio percepta emendatione. Post 3. 4^{ve} dies tertium emetico dato æger jam objecta vicina majora (ut mensam, sedilia, &c.) agnovit, simulqve motus aliquis digitis, manui, ac brachio paralytico rediit. Post 4 vel 5 dies quartum exhibito emetico æger etiam colores discrevit, ungves suos vidit, & in objecta sibi proposita rite collimavit; motus quoque paralyticæ partis erat auctior. Inde octiduum interpositum, ut stomacho parcatur: quo tempore morbus nihil prorsus mutabatur. Tum vero quintum emeticum datum brachio pristinam restituit mobilitatem cum tanto etiam robore, ut &prehendere aliquid posset; visus vero adeo increvit, ut lineas sat minuti typi, non item literas, dignosceret. Post alios 4. 5. dies sextum emeticum nil jam emendavit, nec usus acicularum Wiksbergensium, nec bis adhuc postmodo iteracum emeticum. Hinc omne negotium naturæ relictum est. Haud secius juveni conspicuo ad 22 annos nato visus intra trimestre ita sensim abiit, ut demum per-

fecta adesset amaurosis: at post septies usurpatum emeticum ita denuo rediit, ut mediocrem characterem æger legere qviverit. Plura similia paulo post. Sed cum tamen aliquando emeticorum usus noxam adferat; satis liqvet, inconsiderate illa præberi neutiquam debere: dispiciendum itaqve erit, qveis in casibus vel utilia vel noxia, duce experientia, sint reputanda.

§. 64.

Indicant usum emeticorum præprimis

1. *Infarctus vasorum ophthalmicorum laxiorum*, a vi externa, metastasi, &c. ut paulo ante in casibus GÜNZII ac RIBEI vidimus.

2. *Obstructio viscerum abdominalium præsertim hepatis a bile prava ac lenta*, id quod ex inferius (a) dandis casibus manifestum fiet.

3. *Saburra primarum viarum ab ingestis, a colluvie pravorum humorum, maxime biliosorum, aut verminosa, &c.* Sic A. G. RICHTERUS (b) „Ecclesiasticum novit, „qui vehementer iratus subito occæcatus

(a) Vide §§. seqq.

(b) l. c. fasc. 2. Cap. 5. p. 73.

„ est adeo , ut solem splendentem sine omni
 „ luminis sensu inspicere posset. Sumpto
 „ altero mane vomitorio , quod signa for-
 „ dium biliosarum requirere videbantur, vi-
 „ sum eodem die recuperavit,,. Perinde
 R. W H Y T T (c) „ novit feminam , cui , quo-
 „ tiescunqve stomachus acido laborabat, o-
 „ mnia quæque spisso fumo velata videban-
 „ tur, & cui proinde emetica, ☿^{es} absor-
 „ bentes , atqve amara remedia optima fue-
 „ runt ophthalmica ,,.

§. 65.

Selectus autem id genus remedii. ex eme-
 ticorum classe , justaqve ejus *dosis* , nec non
forma idonea , negligi haud debent ; quan-
 doquidem ea est amauroseos contumacia,
 ut ad ejus profligationem nullum studium nul-
 laqve circumspectio nimia esse possit. Prin-
 cipem autem locum sibi hic vindicat ☐ eme-
 ticus vel solus vel efficacibus aliis etiam
 remediis copulatus. „ Inter insigniora con-
 „ tra hunc morbum remedia ☐ emeticum
 „ eminere mea me , inquit RICHTERUS (d),

(c) Beobacht. über die ... Nerven-hypochondr. u.
 hyster. Zufälle I Cap. No. II. i).

(d) l. c. p. 85.

„ aliorumque, in primis Cel. SCHMUCKERI
 „ & THEDENII observatio docuit. Neque
 „ efficaciore dosi, ut vomitum excitet, ex-
 „ hibere illum debes; convenit sæpe magis
 „ refracta illius dosi, ast sæpe repetita, sub
 „ quapotenter resolvit, nauseam movet, &
 „ non nisi subinde vomitum excitat. Con-
 „ venire autem illum iis in primis in casibus,
 „ ubi viscera abdominalia stagnantibus la-
 „ cessentibusque humoribus liberanda sunt,
 „ ego quidem puto „. J. L. SCHMUCKER (e) ad tonum retinæ opticoque nervo
 restituendum optimum remedium esse ☐ eme-
 ticum parvis ac refractis dosibus datum testa-
 tur, jubetque præmissa antiphlogistico pur-
 gante, gr. iij in ∇^a $\text{℥}vj$ solvi, ac toto an-
 temeridiano tempore 2^{da} quaque hora cochl. j
 præberi. „ Remedium hoc (inquit) plerum-
 „ que nauseam, interdum vero ipsum quo-
 „ que vomitum vel alvi fluxum, excitat,
 „ atque in posteriore casu dosi est minuen-
 „ da; sin vero nullam nauseam moverit,
 „ potest quavis hora ad cochl. j. ij. præbe-
 „ ri. In pilulis quoque exhiberi potest.
 „ Mihi, quæ sequuntur, sunt usitatæ:

(e) l. c. p. 16.

„ R. Gumm. Sagapen.

———— Galb.

Sap. Venet. aa. ʒj.

Rhei optimi ʒjss.

☐ emetici gr. xvj.

Succ. liqvir. ʒj. F. l. a. pil. pond.

„ gr. j. S. m. ac v. No xv. per 4 vel 6 he-

„ bdomades. Felicissimos inde fere semper

„ successus observavi „

§. 66.

Caute tamen quædam practicæ circa emetici usum haud sunt negligendæ, nempe:

1. *Sanguinis missio*, ubi plenitudo vasorum vel insignis humorum ad caput congestio, vel rarefactio sanguinis, præsto est, emetici usui præmittenda, imo etiam sæpius intercalanda, pro re nata, erit. Sic sæpe SCHMUCKERUS (f) observavit milites itinere properato sub æstu & onere magno subito cæcos factos. Væ Se præmissa dabantur ☐ emet. gr. iij. cum saccharo. Vomitu vix finito visus plerumque rediit. Aliqvot post diebus pro re nata catharticum, & fatus e

(f) Chirurg. Wahrnehm. 1 Th. 43 Beobacht. p. 430.

Ω Lavend. c. Ω Θ* in usum vocabatur. Si Væ So & emeticum haud profuit, secta vena jugulari postero mane denuo data emetica & vesicantia admota. Hisque fere semper morbus cessit.

2. *Solventia* quoque interdum, ubi lentor humorum in morbo simul adest, præprimis ubi bilis spissa hepar infarcit, utiliter aliquamdiu præmittuntur, intercalantur, aut simul usurpantur. Sic „juvenis 24 annor. „narrat RICHTERUS (g), post febrem acutam amaurosi sensim corripitur perfectissima, adeo ut, cum ad me veniret, ne splendidissimi quidem solis radiorum minimum haberet sensum. Morbus annum & dimidium duraverat, cum curæ meæ æger se committeret. Facies illius pallida tumida erat, appetitus abolitus, coctio ciborum languida, omnium functionum vigor imminutus, somnus turbulentus, pupilla purissima quidem, adeo vero dilatata, ut iridis vix vestigium appareret. Primum illi exhibui ☐ri ☐lati 3ß, quam per 3 dies ter quotidie sumpsit. Quarto die ad me venit, & de insigni nausea & vomitione, de ructibus nauseosis, fasti-

(g) l. c. p. 80. sqq.

„ dio ciborum summo, & inquiete totius
„ corporis, qverulo exhibui gr. ij ☐ eme-
„ tici, qvæ copiosam materiem viridem a-
„ cerrimam dentes corrodentem evacuave-
„ runt. Die 5^o dextrum oculum luminis
„ aliquem sensum habere, sinistrum vero fe-
„ nestram tantillum distingvere, lætus mihi
„ narrat æger. Oculos cum inspicerem, pu-
„ pillam paulo magis contractam reperi; un-
„ de pergendum mihi esse via, quam in-
„ gressus eram, putans iterum exhibui 3ß
„ ☐ri ☐sati ter qvotidie per 3 dies sumen-
„ dam. Die 8^{vo} ægro vertiginoso de sum-
„ mo capitis dolore, sapore oris maxime
„ austereoso, cibos fastidienti iterum duo
„ grana ☐ emetici exhibui. Vomuit ille
„ septies acrem viridemqve saburram. Die
„ 9^{no} summa cum voluptate vidi latiore
„ esse iridem, angustiore pupillam; æger
„ vero colores se jam distincte, majoraqve
„ objecta quasi umbras videre narravit. Pal-
„ lor tumorqve faciei imminui, appetitus
„ ciborum, lætior aspectus, functionumqve
„ omnium vigor redire jam incepit. Solus
„ jam subinde obambulavit æger; ego au-
„ tem tartarum tartarifatum ter qvotidie su-
„ mendum, & die 12^{mo} vomitorium iterum
„ exhibui. Die 13^{tio} solus ad me, duce
„ non amplius egens, venit æger, & qvo-

„ tidie increfcere vidēdi facultatem nar-
 „ rat. Naturalis jam fere erat magnitudinis
 „ pupilla, libere, qvamvis paulo feignius ad-
 „ huc, movebatur iris; majora, imo minora
 „ qvoqve, diftincte fatis videbat æger, fo-
 „ lus obambulabat, fimul atqve vero folis
 „ fplendor cubiculum impleret, cœcus qua-
 „ fi ftetit. Ut magis adhuc increfceret ocu-
 „ lorum vigor, electricitate uti fvafor illi
 „ fui. Ufus illa eft per 14 dies, aft fine o-
 „ mni emolumento. Inde liqvozem terræ
 „ fol. ☐ cum extracto trifolii fibrini per 14
 „ dies fumpfit, cui, cum qvotidie ad-
 „ huc augeri oculorum aciem viderem, ad-
 „ didi tandem TRæ ♂ cydoniatæ aliquid;
 „ qvorum medicamentorum ope factum eft,
 „ ut qvi ante duos menses penitus occœca-
 „ tus ad me pervenerat æger, folus jam ob-
 „ ambulet, objecta majora clare videret,
 „ libros literis majoribus impreffos legeret,
 „ omniūqve totius corporis functionum vi-
 „ gore reftituto egregia frueretur fanitate.
 „ Simplificiffima hac methodo in alio qvoqve
 „ cafu, non qvidem tam egregio cum suc-
 „ ceflu, infigni tamen cum emolumento,
 „ ufus fum. Juvenis Hildeſienſis 20 & ali-
 „ qvot annor. utriusqve oculi perfecta a-
 „ mauroſi laborans me adiit, rogans, ut vi-
 „ ſum illi reftituerem; Mobilis erat, ſplen-
 „ di-

„ didissimiqve nigroris pupilla, æger vero sa-
„ nissimo corpore præditus, ut vitium, cui
„ gutta serena tribui posset, nullo modo
„ detegi posset. Cum valde se iracundum
„ esse confiteretur, variisque mœroribus,
„ aliisque animi adfectibus ab aliquot jam
„ annis se perpetuo agitatum esse narraret,
„ præcordiis hic in primis prospiciendum es-
„ se putavi, & liqore terræ fol. ☐ ple-
„ num cochleare ter quotidie sumi iussi.
„ Quarto die plurima in tota corporis super-
„ ficie punctula rubra apparuerunt insigni
„ cum pruritu, rediitqve tantillus luminis
„ sensus. ☐ri ☐sati 3ss ter quotidie jam
„ exhibui. Septimo die totum ægri corpus
„ punctulis illis rubris valde prurientibus
„ tectum quasi erat, æger vero adeo ver-
„ tiginosus, ut stare vel obambulare vix
„ posset: de dolore capitis simul insigni,
„ appetitū prostrato, sapore in ore valde
„ ingrato, querebatur. Sumpsit ille 8o die
„ vomitorium, quod ingentem foetidæ acer-
„ rimæqve saburræ copiam evacuabat, &
„ egregio quidem cum levamine; evanuit
„ enim vertigo, dolor capitis, nausea,
„ rediit appetitus ciborum, oculorumqve vi-
„ gor adeo increvit, ut jam colores majore
„ raqve objecta æger distingveret. Sumpsit
„ ita iterum ☐rum ☐satum per 4 dies, qui-

„ bus elapsis rediit iterum nausea, vertigo,
 „ fastidium, quæ quidem symptomata eme-
 „ ticum iterum dissipavit. Sanissimum jam
 „ se esse, plurima objecta satis distincte se
 „ videre, solum quoque se obambulare pos-
 „ se æger affirmavit. Speravi inde fore,
 „ ut quæ tantum jam attulerant salutis, in-
 „ tegrum visum restituerent medicamenta;
 „ ast spes me fefellit, morbus enim, qualis
 „ jam erat, mansit, quamquam plurima re-
 „ media, & inter alia ælia & electricita-
 „ tem tentarem, unde æger, nisi insigni,
 „ aliqua tamen videndi facultate præditus
 „ abiit „. Simile exemplum etiam I. L.
 SCHMUCKER (b) suppeditat, nempe puel-
 læ septenni ab retrogressis ob frigus admis-
 sum morbillis perfectam utriusque oculi a-
 maurosin biennio jam passæ primum ter quo-
 tidie \square ri \square sati \square j dabatur, cum diætâ ve-
 getabili, & decoctio rad. graminis pro potu,
 imperatis. Die 10 catharticum sumpsit, ac
 postea quater quotidie xij pil. superius (i) me-
 moratæ sumendæ erant. Primis binis hebdoma-
 dis nec nausea nec alia mutatio inde orta; at
 3^a & 4^a hebdomade cum nausæ, tum &

(b) Vermischte chir. Schriften l. c. p. 21. sqq.

(i) Vide §. 65.

vomitum interdum, adfuere. Post 6 hebdomades mobilibus aliquatenus factis pupillis, præsertim dextra, ægra lucis aliquid vidit, noctemque a die discrevit. Abhinc vero in dies mane millepedes 40 in jure, & bis quotidie pilulæ, ac spiritus roborans (k) usui datus. Lapsis inde 6 hebdomadis jam objecta, dextro in primis oculo, distinguebat. Idcirco iisdem in remediis pergebatur, ac præterea pone utramque aurem vesicans est admotum, & 19 dies in fluxu servatum. Cumque interea temporis visus magis magisque emendaretur, majoris etiam revulsione causa aliud amplum vesicans nuchæ applicatum 14 dies ulceris in statu sinebatur. Postea excitato in lævo brachio fonticulo, non nisi ante somnum xij pilulæ, & spiritus roborans, administrabatur, sicque ægra intra 9 menses prorsus convaluit.

3. *Iteranda* esse emetica in pertinaciori malo, quousque proficua esse videntur, allata hætenus exempla, ac plura etiam postmodo danda, satis superque ostendunt.

4. *Revulsiones* per alia loca eodem tempore institutæ, ut sanguinis missio (l), ve-

(k) Vide §. 103. B. No. 3.

(l) Vide §. 91. sq.

ficantia (m), &c. maximopere energiam emetici adjuvant, curationemque accelerant.

5. *Paregoricum* interponere interdum oportet, si a diuturniori emetici usu stomachus læsus fuerit; quam in rem facit PÜSCHELII exemplum apud SCHMUCKERUM (n): vir e metastasi (ut videbatur) jam $\frac{3}{4}$ anni cæcus & usque adeo surdus erat, ut nec sclopeti cominus explosi fragorem exaudiret; porus acusticus prorsus erat fectus, oculorumque bulbi cum immobilibus pupillis versus canthos internos fuerunt detorti. Cumque Væ Ses, vesicantia, ac varii generis solventia ubertim adhibita nil profecissent, quater quotidie dabatur \square ri emet. gr. ß cum Gum. ammon. gr. x in pilulis, dosisque \square ri emet. aliquot post diebus ita aucta erat, ut quotidie & ano catoque vacuaret, & sudores urinamque simul moveret. Toto autem hoc tempore vesicantia in fluxu servabantur. Die 120 æger lucis aliquid sensit, & pupilla post frictionem parumper contracti videbatur. Tunc vero dosi tartari ita minuebatur, ut non nisi 30 quovis aut 40 die vomitum cieret. Sed cum digestio inde

(m) Vide §. 111.

(n) l. c. art. 7. Bemerk. 8. p. 130.

læderetur, die 21^o opiatum est exhibitum: inde resumpto per 12 dies remedii usu visus ita rediit, ut æger ad 30^o passus homines rite agnosceret. Auditus quoque multum est emendatus; dextri tamen lateris cum visus tum auditus melior, quam lævi, fuit: sed præternaturalis bulborum situs mansit. Eadem quoque methodo miles quidam dextri tantum oculi amaurosin passus convaleuit: omni quidem mense abhinc amblyopia dictum oculum repetebat, sed eccoproptico semper iterum cedebat.

§. 67.

Contraindicant vero emeticorum usum, teste R. A. VOGELIO (o) haud pauca, nempe

1. *Tumores ossi* encephali, adversus quos emesis, si non noxia, inutilis certe est.

2. *Cachexia lenta* turgente corpore; emesi enim facile humores immeabiles ad vasa encephali pulsi stases ibi facerent vix emendandas.

3. *Plethora* ex ebrietate, vacuationibus sanguinis consuetis non succedentibus, &c.

(o) Opusc. med. select. Vol. 1. Diss. 6. §. 17.
p. 196.

Hac tamen egregie prius imminuta emetica cum fructu dari poterunt. Denique

4. *Inopia humorum* bonorum, nempe
 „ si lumen ob succorum defectum aliquis a-
 „ misit, velut puerpera in partu, vel alius
 „ ex venere immoderatus culta, aut ex li-
 „ beraliori sanguinis missione profusione-
 „ ve „ (p). Quam noxia his in casibus pe-
 „ ne omnia sint vacuantia, vel solus BOER-
 „ NERI (q) juvenis documento est, & „ per-
 „ niciosissima hæc, inquit I. E. GEISLE-
 „ RUS (r), per evacuantia curandi ratio est
 „ tum, ubi tubuli nervorum ob defectum
 „ succi collabuntur. Qua in re falli meden-
 „ tes solent potissimum tunc, ubi acies sen-
 „ sim hebescit. Cujusmodi nuperum juve-
 „ nis exemplum novi, qui cum sensim lu-
 „ men amittens a plerisque evacuantibus,
 „ cum sudoriferis, tum fonticulis & seta-
 „ ceo, vexatus esset, tandem... valentissi-
 „ mi generis emetica medicina, &... ar-
 „ gento vivo, sed sine salivatione, eo cum
 „ eventu usus est, ut paulo post prorsus
 „ occœcicaretur, & post mortem invenire-

(p) Ibidem.

(q) Vide §. 98. No 2.

(r) l. c. p. 18.

„ tur omnes cerebri partes ficcissimas ha-
 „ bere „ .

C A P U T II.

C A T H A R T I C A.

§. 68.

CATHARTICA in amaurosi nemo non commendat: quippe quorum usum sola bonorum humorum inopia contraindicet. Ceteroquin vero „ ut in omni oculorum valetudine, inquit F. HOFFMANNUS (s), „ ita quoque serena gutta maximopere juvat alvum esse fuliorem, quo stagnans „ in capite humor ad inferiora ducatur. „ Eo fine adhibenda remedia non decet esse drastica purgantia, sed blanda laxantia „ roborantibus nupta; quæ laude pollent „ pilulæ balsamico-cephalicæ, quarum capite de paralyti (t) exemplum proposuimus. In usum quoque trahi possunt pilulæ nostræ balsamicæ cum Œrio dulci, &

(s) Med. rat. syst. T. 4. P. 4. C. 4. thes. therap. §. 4.

(t) I id. C. I. thes. therap. §. 8.

„ extracto panchymagogo CROLLII com-
 „ binatæ „. Interea tamen draſtica non
 prorsus ſunt hinc proſcribenda; enim vero
 eſt, ubi lenioribus tantum catharticiſ locus
 datur, eſtqve etiam, ubi valentiora deſide-
 rantur: certe in illo amauroſeos genere,
 cujus ſedes eſt retina, vel occipiente adhuc
 morbo H. BOERHAAVE (u) commendat
 primum lotionem ſotumqve aquæ frigidæ ad
 tonum priſtinum vaſis retinæ dilatatiſ reſti-
 tuendum, tum vero ad impetum humorum
 verſus eadem imminuendum „ optima (in-
 „ quit) ... avellentia & reſolventia ſunt
 „ Væ So & purgantia fortiora ꝯlia, quæ
 „ copiam minuunt, & ſimul reſolvunt, &
 „ licet ſigna plethoræ non adſint, tamen
 „ adhiberi debent. Ergo per aliquot dies
 „ continuos purgationes ꝯles propino, ut
 „ quaſi ſalivatio fiat per alvum, ꝯus enim
 „ diſſolvit, purgans autem medicamentum
 „ additum vim ejus ad alvum determinat,
 „ & niſi hoc fiat, clyſma injiciendum eſt,,.
 Selectum itaqve cathartici cauſa ipſa, ſedes-
 qve morbi, & ægri conditio docebunt. Ce-
 terum tanta eſt catharticorum in amauroſ

(u) l. c. Cap. 1. §. 90. Cap. 3. §. 109.

præstantia, ut vix non omni satisfaciant indicationi, quandoquidem humores lentos resolvunt, copiosos minuunt, stagnantes vel effusos in remotiora vasa derivant, spasmos a saburra primarum viarum obortos hacceeducta sopiunt, &c. id quod numerosa variorum evincunt exempla. Senferunt sane catharticorum utilitatem medicus HEE-RII (x), HEISTERI (y) adolescens, homo HILDANI (z), STÖRCKII (a) femina, STORCHIIque cum puer (b) tum puella sexennis (c). At non hi soli. Apud L. E. HIRSCHEL (d) mulier 20 annor. menses semper justo parciores experta, nunquam non ante eorum eruptionem aliquamdiu inter alia hysterica symptomata epilepsiæ etiam insultus aliquot patiebatur. Nec interna remedia, nec pediluvia crebra, nec Væ Ses quovis fere mense factæ catamenia in ordinem redigere poterant. Singulare autem

(x) Vide §. 30. b).

(y) Vide §. 41.

(z) Vide §. 39. b)

(a) Vide §. 112. a).

(b) Vide §. 35. d).

(c) Vide §. 36. b).

(d) Gedank. die Heilungsart der fallenden Sucht betreffend §. 31. p. 49. sqq.

fuit, quod ægra periodica etiam aphonía laborarit, quo tempore simul spiratio ad suffocationem fere prorsus intercipiebatur; qui paroxysmus nec odoribus cedebat, nec frictionibus inferiorum partium, sed cum epilepticis insultibus sæpius per diem alternas tenens $\frac{1}{2}$ vel 1 hora durabat, quoad suspiriis editis finiretur, solisque emollientibus enematis aliquantum citius terminabatur. Ab his malis visus, cum alioquin semper deterior efficeretur, interdum prorsus etiam peribat, nihil proficientibus remediis: imo cum ob latentis plicæ Polonicæ suspicionem a domesticis ad ejus eruptionem promovendam unguosa varia capiti adhiberentur, visus ita inde læsus est, nihil ut rite discernere ægra posset. Donec demum accidit, ut paroxysmo aphonie cum spirationis difficultate diutius sæviante cum tensione ac rugitu ventris, pulsu admodum pleno, rubenteque facie inflata mulier lotium reddere nequivret: tum enim vero larga in brachio Væ So facta post consveta suspiria liberiores spirationem effecit. Interea ingruente circ. post $\frac{1}{4}$ horæ insultu epileptico injectum enema cum \odot^* $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ dum intra $\frac{1}{4}$ horæ foetidam alvum cum numerosis vermibus elicuisset, paroxysmus inde remittens rarius deinceps rediit. Idcirco dato quotidie rheo cum \odot^* ad $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}$ alvus

copiosa semper cum vermibus prodibat, symptomatis inde manifeste remittentibus, visuque pedetentim revertente, atque ab exhibito die 8^{va} Ypecacuanhæ ʒj rejecta copiosa pituita lenta & amara appetentia, prius fere abolita, illico rediit. Eodem vespere menses ubertim profluxere; atque ab hoc tempore symptomata omnino desierunt, pristino visu reverso. Nihilominus usu ∇æ Sedlicensis, stomachicorumque, ac sumpta quovis vespere Nitri ʒß cum aliquot Castorei granis, periodis insequentibus ordinatos nacta mulier menses in posterum sana, præter leviora illa hysterica mala, quæ etiam postmodo sensim desiere, vixit. Porro „ virgo „ ætatis annum agens 18, refert M. A. MORUS (e), post gravia intestinorum tormina alvi fluxionem passa fuit, quæ clysteribus, longis aquarum potionibus, & inunctione olei amygd. dulc. curabatur, at statim dolor redibat: unde post tales multas vicissitudines tribus diebus a cessatione fluxus potum propinavi cum unciiis duabus & dimidia mannæ confectum. Ab hoc medicamento mane sumpto levamen sensit, optimas & conferentes evacuatio-

(e) Misc. nat. cur. Cent. I. Obs. 78.

„ nes obtinuit; at post prandium vaporem
„ qvemdā instar flammæ calidissimum ex
„ ventris imo persensit, qvi ad caput dela-
„ tus deliquium intulit, a qvo brevi resur-
„ rexit, ac de totali visus deperditione con-
„ qvesta fuit. Accersitus ego cerebrum of-
„ fensum judicans ad medicamenta specifica
„ cerebrum corroborantia curationem direxi,
„ & post 4 dies denuo videre cœpit. Sed
„ non diu hæc lætitia duravit; nam 14 ho-
„ rar. spatio elapso novo, sed minore, sur-
„ gente vapore iterum derepente cœcitas
„ advenit, & per plures dies duravit: unde
„ visionem amplius non redituram credeba-
„ tur, licet ego recuperatum iri non despe-
„ rarem. Ideo supra ordinatis medicamen-
„ tis etiam purgantia adjunxi, ut minera il-
„ la vaporum in intestinis latens educere-
„ tur: & revera post 35 dierum spatium va-
„ riis adhibitis medicamentis, longo usu
„ seri rhabarbarati, &c. visio rediit,;. Per-
inde „ civis . . . melancholicus, inquit D.
„ WINCLERUS (*f*), subito in epilepsiam
„ incidit; ea recedente cœcus remanet per
„ dies aliquot. Ego . . . per clysteres ma-
„ teriam a capite revellere studeo, hu-

(*f*) Ibid. dec. 1. ann. 6. obs. 50.

„ morem melancholicum expurgo, antiscor-
„ butica exhibeo: post aliquot dies visum
„ integrum cum sanitate integra recipit pa-
„ tiens „. Haud secius A. G. RICHTER-
RI (g) „ pistor juvenis plethoricus, dum pon-
„ derosam subactæ farinæ massam depserat, vi-
„ sum sibi imminui sentit, cumque eodem die
„ sequentique eodem opere iterum iterumque
„ perfungeretur, 3^o die visum penitus per-
„ didit. Vena pedis secta, unciisque xij san-
„ gvinis emissis, rediit aliquis luminis sen-
„ sus, fortique remedio purgante exhibito.
„ integer rediit visus. Nonne... morbus...
„ humoribus ad caput congestis debeba-
„ tur „? quos purgans forte aliorum dedu-
xit. Mirum autem est, id genus humorum
ad caput congestionem, eorumque inde de-
rivationem ab uno eodemque remedio pro-
ficisci! Observationem hujusmodi in me-
dium adfert G. D. MAYERUS (h): „ in Re-
„ ligioso quodam (ait) ad purgandum cor-
„ pus vernali tempore pilularum ☿ lium do-
„ sin convenientem exhibenti mihi hoc e-
„ venit inexpectatum phaenomenon, ut
„ quamquam regiminis legibus bene obtem-

(g) l. c. p. 73.

(h) Misc. nat. cur. Cent. 8. Obs. 82.

„ perasset in omnibus, finita laudabili alias
 „ operatione cœcus tamen factus fuerit su-
 „ bito patiens, & remanserit ita, donec re-
 „ petito alio ꝯli laxante eundem denuo
 „ dejectionibus quibusdam . . . liberassem „.
 Auctor quidem amaurosin hanc malæ ꝯrii
 dulcis præparationi imputat; at male meo
 iudicio, si præsertim ad alibi (i) dicta adver-
 tas animum: quandoquidem & alia catharti-
 ca acriora eundem interdum effectum edide-
 re. Ad ejusmodi autem humorum in caput
 congestiones tollendas, præsertim ubi lento-
 re simul humores peccant, eximio cum fru-
 ctu *aquæ soteriæ* catharticæ potantur. Sic
 I. C. TILLINGII (k) vir 62 annor. post
 ꝯlem ptyalissimum ad luem veneream sanan-
 dam toleratum visu privatus CAROLINA-
 RUM thermarum usu intra 6 hebdomades
 pristinum recuperavit visum. Perinde (l)
 rusticæ 54 annor. a crebris, e præmaturo
 mensium defectu pullulantibus, cumque ve-
 hementi cephalalgia sævientibus ophthalmiis
 muscarum idola primum oculis illudere; tum

(i) Vide §. 39. c).

(k) Obs. med. sing. 34. p. 63.

(l) Wisbadischer Krankengeschichten 3ote Geschich-
 te p. 71.

visus pedetentim deficere cœpit, donec non amplius legere, tandem nulla etiam objecta, imo demum ne consanguineos quidem rite discernere quiret, aliqua tantum superflite visus lucula: unde nec incedere sine duce, nisi exploratis jam in locis, valebat. Sic afflicta Junio A. 1754 ad fontem Wisbadensem abiit. Oculi inflammatione quidem caruere; at lens tantisper opaca (ni, quod credibilius, pallor pupillæ fuerit amauroticæ) visa, & pupillâ, oculis quæ perfrictis quæ luci obversis, immobilis pene mansit. Haustus igitur, præter Schwalbacenses (at non ultra unam alteramve mensuram ob sumptuum inopiam) etiam aquis Wisbadensibus cum pilulis balsamicis, facta bis scarificatione, adhibitisque sæpius pediluviiis, ægra post 10 dies non modo omnes colores & objecta minuta discernebat, sed etiam typum mediocrem ope perspicillorum prompte, sine hisce autem molestius, legebat.

CAPUT III.

DIAPHORETICA.

§. 69.

DIAPHORETICA quoque in amauroseos curatione præclare se se interdum gerere solent, ac tum vel maxime, dum ægritudo a cutaneis malis intropulsis originem trahit, aut ubi perspiratio suppressa vel catarrhalis affectio eidem occasionem præbuit. Profuit sane sola diaphoresis *SEGERI* (*m*), ægrotae, cui in graviditate ex inopinato sæpius convulsæ, excluso sub convulsionibus tætu, his cessantibus coma superfuit, hocque discusso amaurosis adesse observata est; quam diaphoresis demum abegit. Porro *I. F. CONSBRUCH* (*n*) medicinam fecit mulieri 59 annor. iracundæ, hysteriæ, diuturno brachii lævi rheumatismo afflictæ, olim vero etiam ophthalmiis, ob quas fonticulum dextro in pede cum fructu aluit, obnoxia. Hæc vice quadam purpura rubra ita affici cœpit, ut novæ semper pustulæ prioribus non dum

(*m*) Misc. nat. cur. dec. 1. ann. 3. obs. 161.

(*n*) Nov. act. nat. cur. T. 5 Obs. 37.

plane evanidis pullularent; ex qua tandem post 3 hebdomades eluctata, cum humido in horto laboraret, ex 8 diebus visum imminui sensit cum purpuræ reversione, ut brevi amaurotica evaserit. Ubi vero purpura nervinis datis, eruptionemque pustularum promoventibus confertior apparuit, visus etiam oculo dextro aliquis rediit, tum lævo quoque, donec facta per urinas crisi ad pristinum vigorem fuisset restitutus. Perinde s. YVES (o) „ vidit malum hoc hominibus ab „ lichene oculos circumqvaque ambiente, „ pomatique unguenti litu retropulso, acci- „ disse; usu autem jusculorum aperientium „ ac diaphoreticorum visus iterum rediit „. Ita & A. Q. RIVINUS (p) „ memini (ait) „ me... vidisse puellam gutta serena per ali- „ quot septimanas occæcatam penitus, meo „ consilio... unice restitutam fuisse per... „ expellentia, postquam cognovi malum „ paulo post curatam tineam capitis traxis- „ se ortum „.

(o) l. c. Cap. 28. §. 4. p. 326.

(p) Diss. de recidiva §. 33.

CAPUT IV.

EMMENAGOGA.

§. 70.

EMMENAGOGA ad expugnandam feminarum amaurosin, quæ mensēs vel nunquam fluxere, vel subſistere, aut defecere, non utilia modo, ſed neceſſaria etiam interdum eſſe, vel inde liquet, quod gutta ſerena haud raro a catameniis ſuppreſſis ortum ducat (*q*); quod item iisdem ſponte arteve profluentibus cœcitas aut minuat, aut plane tollatur (*r*), ſi nervi optici non dum omne ſuum robur amiſerunt (*s*); quod denique fruſtra ſæpe aliis quibusvis præſidiis tentatis ſola demum catamenia provocata viſum reſtituerint. Satis hæc, opinor, exemplis BLOCHII (*t*), HOFFMANNI (*u*), PECHLINI (*x*), RIEDLINI quæ (*y*) aſſerta videri

(*q*) Vide §. 37. e).

(*r*) Vide §. 60. g).

(*s*) Vide §. 59.

(*t*) Vide §. 37. e).

(*u*) Vide §. 38. b).

(*x*) Vide §. 60 No 4. f).

(*y*) Vide §. 90.

possent; sed SCHAARSCHMIDTII (z) quoque ac STÖRCKII (a) casus huc facient. Perinde J. F. CARTHEUSERUS (b) „novit
 „feminam, quæ ob diuturnam catameniorum
 „suppressionem primo visus obscuratio-
 „ne, tandemque leviori gutta serena, cor-
 „ripiebatur. Medicus advocatus exhibebat
 „usitata cephalica & nervina, ast sine ullo
 „effectu. Quare... deinde... pediluvia,
 „inseffus uterinos, phlebotomiam in pede,
 „& alia appropriata, quæ negotium men-
 „struum in ordinem redigebant, (Auctor)
 „commendavit: quibus ad tempus usurpatis,
 „iisdemque restituto fluxu menstruo rediit
 „perfecte visus,,. Porro S. ALISCHE-
 RI (c) netrix a 3^{na} regulari, at contumaci,
 cortice Peruviano sæpe varieque dato fuga-
 ta brevi post perfectam in amaurosim incidit.
 Datis crasin sanguinis corrigentibus incepit
 lucem a tenebris denuo discernere. Cum
 vero catamenia simul parum aut nihil flue-

(z) Vide §. 115.

(a) Vide §. 84.

(b) Diss. de necessar. consensu partium attentione
 practica (4^{to} Francof. 1741. Resp. c. G.
 LIEBICHIO) §. 9.

(c) Annal. Vratisl. Tent. 22. A. 1722. Decembr.
 Cl. 4. art. 10. §. 2. p. 684.

rent,, post sectam aliquoties pedis venam, usumque elixirii alcalini lixiviosi, ac bis circa novilunia data resinæ Jalappæ gr. viii. jx. in Ψ rectificatiss. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}\mathfrak{s}$ per digestionem soluta, menses demum ordinatius uberiusque erupere: unde visus etiam pedetentim fiebat melior, præsertim durante fluxu, ut spes esset, eum ad aciem pristinam rediturum. Perinde cum feminæ in aqua frigida stanti, linumque lavanti menses tum fluentes ocyus substitissent, amaurosi lævi oculi continuo subsequente, 14 post diebus consuluit L. HEISTERUS (d) 1^o) MRæ ex elix. ppr. s. acido $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$. & salis vol. oleosi $\mathfrak{z}\mathfrak{s}$. ter qvotidie gutt. 50. cum infusi ex Euphras. & Rosmar. aa. M. j. parati $\mathfrak{f}\mathfrak{b}$. j calide haurienda; 2^o) Pilul. BECHERI No 20 qvovis vespere usque ad mensum periodum sumendas, ista vero adventante per 14 dies seponendas; 3^{tio}) ∇^{am} ophthalmicam ex ∇^{x} Valerian. $\mathfrak{z}\mathfrak{vj}$. Ω Rosmar. & Lavend. aa. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$. M. pro oculis qvater qvotidie eluendis, proque oculo lævo noctu eadem ope linteoli fovendo; 4^{to}) Pediluvium ex herbis matricar. artemis. rosmar. sabinæ aa. M. j. in urna ∇^{x} decoctis tepide qvovis vespere per $\frac{1}{2}$ horam

(d) Medic. Chir. Wahrnehm, l. c. I Band. No. 358.

usurpandum, pedesque in eo probe perfri-
candos; 5^{to}) Vesicans ad caput ac nucham;
6^{to}) Væ Sem in pede instante mensium pe-
riodo ad 3x. xij. Intra 3 hebdomades ab his
visus aliquis oculo rediit, non item menses:
ea propter remedia sub No 4 & 5 iterata per
alias 3 hebdomades, qveis elapsis visus qvi-
dem plus emendatus, menses vero non dum
reversi. Idcirco 14 diebus ante consuetam
mensium periodum omnium prius dictorum
remediorum usus denuo imperatus, octiduo
vero ante periodum pediluvium, ut prius,
ac postmodo ad utrumque surarum latus,
amboque femora supra genua, scarificatæ cu-
curbitæ sunt applicitæ. His factis menses
erupere, visusque lævo oculo pristinus red-
iit. Similem quoque casum refert C. WE-
BER (e): „vigni aliquot annor. feminæ
„phlegmatici temperamenti, robustæ, men-
„strui fluxus tempore nocte quadam æstiva
„iter per silvam facienti fortuitus animalis
„cujusdam clamor tantum inducit pavorem,
„ut exanimata in terram concidat. Rediens
„ad se se præ lassitudine pedes movere vix
„potest, itinereque intra 2 horas peracto

(e) Obs. medic. fascic. 2. Obs. 14. §. 15. p. 60. sqq.

„ de anxietate , respiratione suppressa , ca-
„ pitis doloribus , horrore & æstu alternan-
„ te , & siti conqveritur. Menses hinc in-
„ terrupti elici neqveunt, inquietudo manet
„ toto in die , capitis dolores æstusqve au-
„ gentur , circa vesperam oculi obscuran-
„ tur, nox est inquietissima, 3^{ti}oqve mane
„ doloribus capitis gravissimis ista oculis ca-
„ pta in lecto jacet. Væ So in pede itera-
„ ta, purgantia, vesicatoria, aliaqve reme-
„ dia febrem quidem, capitis autem dolo-
„ res æqve parum ac cœcitatem, minuunt;
„ priores potius circa sequens menstruum
„ tempus augentur adeo , ut vix perferri
„ possent... Diu noctuqve summis capitis
„ oculorumqve cruciabatur doloribus , pul-
„ sum habebat compressum & celerem, at-
„ qve de abdominis per intervalla expan-
„ sione dorlique dolore tensivo qviritaba-
„ tur; in oculis vero externe ne minimum
„ quidem vitium conspiciendum erat. Post
„ venæ incisionem in pede , & lactis sac-
„ chari, boracis, nitriqve usum altero ma-
„ ne capitis dolores paullulum remittebant,
„ & pulsu propius naturali accedente ægro-
„ tam neqve nausea, sapor amarus, sitis,
„ neqve abdominis expansio , dorfive do-
„ lor, premebant. Lactis serum ideo tarta-
„ ri cremore paratum , addito oxymellitidis

„ scillitici pauxillo, \square rumque vitriolatum
„ cum borace præscripsi, circaque noctem
„ semper balneum ex ∇^a calida dulci utile
„ duxi. Somnus 4^{to} die erat quietus, capi-
„ tis oculorumque dolores cedebant, ita ut
„ ista 12^{mo} die sæpius scintillas præ oculis
„ observans his lætaretur quam maxime.
„ Decima tertia vespera luminis accensi
„ flammam detegens, & 15^{to} die objecta per
„ nebulam quasi in distantia profunda con-
„ spiciens, 19^{no} omnia perfecte distingve-
„ bat, pressioni autem sensus in oculis ad-
„ huc remanebat: 25^{to} die adductorum re-
„ mediorum loco aloes & myrrhæ pilulas,
„ infusumque cheiri florum 4 dies in usum
„ vocavi, mensesque inde ex doloribus co-
„ licis prægressis 36^{to} die largiter prorump-
„ bant. His tandem finitis ægrota martis
„ limatura, electrificationeque plenarie resti-
„ tuta est,,. Haud multum abludentem ca-
sum observavit C. F. KALTSCHMIED (f)
in virgine 21 annor. sangvineo-cholerica,
quæ fluentibus menstruis e scalis lapsa, dex-
trumque capitis latus ad easdem valide alli-

(f) Diff. de virgine ch'orosi & gutta serena labo-
rante 4^{to} Jenæ 1768. (Auct. J. G. NEST-
LERO).

dens, subsistentibus illico ob terrorem catamenii, in dextri oculi amaurosim incidit. Abhinc vero semestres capitis ventrisque præfertim circa os sacrum, dolores jam leviores jam vehementiores patiebatur, subque cicuta usu invalescente sensim anorexia chlorotica simul evasit. Ope tandem quæsit sanguis primum e pede ad 3 viij eductus cum symptomatum levamine. Cicuta, quod symptomata exacerbasset, in locum sequentia mensis spatio sunt exhibita:

R. Lap. 69 ppt. 3j.

Sal Centaur. min.

Abfynth.

Tartar. vitriolati aa. 3ß.

Cinnab. nat. 3ß. M. F. 5. S. ter de die $\frac{1}{6}$ partem; & ante prandium ac cœnam cochl. j. sequentis MRæ:

R. ∇æ Meliss.

Menth. aa 3ij.

Extr. Centaur. min.

Abfynth. aa. 3j.

Liqv. terræ fol. tartari 3ß. M.

Potui ordinario ∇^a Selterana data. Lapso mense per 8 dies imperatæ ante somnum pilul. BECHERI No xx; postea in priorum tantum usu per 14 dies relicta est: accedente vero novilunio denuo pilulas cum 5 quatruido usurpavit; a quævis reversi menses

symptomata mitigarunt. Inde in aliquot adhuc menses catameniorum periodo præmittebatur per 3. 4ve dies cum ꝑis tum pilularum usus. Mox vero initio totius hujus curationis simul externe applicabantur sacculi, facti speciebus nervinis, herba majoranæ, rosmarini, salviæ, floribus lavendulæ, chamomillæ Romanæ, & rad. iridis Florentinæ, atque vino coctis; vertici porro guttæ aliquot balsami vitæ propriæ aliquoties per diem instillatæ, palpebræque humectatæ crebroque perfrictæ. Hac methodo virgo 5ta hebdomade radios oculo dextro sentire cœpit, 6ta vero pristinum jam recuperavit visum. Quantum itaque legitimus mensium fluxus ad amauroseos profligationem valeat, vel inde colligere est, quod hic ipse ut sanguinis missio derivatoria ac depletoria sit spectandus, tum quod remedia eundem ciere valentia sint vel vacuantia ano, vel derivantia ad uterum, vel antiparalytica, vel incipientia, &c. quæ per se etiam ad amaurosin tollendam sunt efficacia.

CAPUT V.

ANTHELMINTICA.

§. 71.

ANTHELMINTICA quoque ad amauroseos curationem interdum maximopere faciunt. Etenim cum certis constet observatis, amaurosin a vermibus primas vias infidentibus produci posse (g), iisdemque inde eliminatis illam quoque solutam esse (b): in aperto est, anthelmintica, ut quæ necandis abigendisque vermibus apprime inserviunt, hujusmodi in casibus esse omnibus aliis remediis anteponenda; id quod ipsa etiam experientia dudum evicit, cum in quadrimo RICHTERI (i) puero, tum ejusdem ætatis puella G. HANNAEI (k), quæ „ jam bi-
„ duum immodico effervescentes calore cor-
„ pus summopere contorsit, imo nec ore
„ ejulatus, nec palpebris lacrymas compri-
„ mere valens, faciem & obvia corpusculi

(g) Vide §. 48.

(b) Vide §. 60. No 5. f). & §. 68.

(i) Vide §. 86.

(k) Misc. nat, cur. dec. 2. ann. 5. obs. 170.

„ sui membra ungvibus præ dolore gravif-
„ fimo laceravit misere. Dum his defungi-
„ tur... variaque alienatæ mentis signa o-
„ stendit, destituit misellam & visus & fer-
„ mo ! ... Vermibus ... per anthelmintica
„ debite oppugnatis rediit... loqvela circa
„ proximi diei vesperam : tertii autem diei
„ auroram suis lætabunda vidit oculis,, &c.
Perinde VANDERMONDII (1) octennis pu-
ella, febre continua remittente putrida cum
indiciis saburræ primis in viis correpta, die
3^{to} subito visum & loqvelam perdidit ; lin-
gvam serpentum in modum agilissime ex ore
vibrabat, donec post horam ita exactam lin-
gua exserta immobilis penderet : in momen-
ta porro aërem valide intra nares attrahe-
bat, velut si quid molesti ibidem præsto es-
set. Anxietas & inqvies tanta diu noctu-
que aderat, ut caput ac facies perpetuo su-
daret. Dato itaque emetico alvum simul pro-
be ciente ægra lumbricum $\frac{1}{2}$ pedem longum
evomuit, febre inde mitescente. Idcirco
exhibito cathartico cum anthelminticis post
horam visus & loqvela aliquatenus rediere ;
sed nullis porro prodeuntibus vermibus de-
nuo post 12 horas interciderunt. Unde va-

(1) Journ. de Medec. &c. T. 10. p. 129.

lentioribus anthelminticis ad emetica & cathartica adjectis, postquam rursus bini lumbrici ore fuissent rejecti, visus abhinc & loqvela ita pedetentim redibant, ut ægra post 7^{mum} diem pristino gauderet visu & loqvela. Febris ipsa intra 12 dies etiam expugnata est.

C A P U T VI.

S O L V E N T I A.

§. 72.

SOLVENTIA perinde haud exiguum sæpe ad amaurosin curandam adferunt momentum, ac tum vel maxime quidem, dum illi viscerum abdominalium, præsertim vero hepatis, infarctus occasionem præbuit (*m*), aut ubi insignis humorum lentor adest, aut etiam tumores inde enati vasa ophthalmica, iisve vicina, comprimentes (*n*). Priori vitio tollendo egregie satis faciunt

I. *Salia media* blanda, ut terra fol. \square ri vel \square rus \square fatus, &c. quæ etiam sum-

(*m*) Vide §. 27. No 6.

(*n*) Vide §. 31.

mo cum fructu aliquamdiu emeticis, ut superius (o) dictum, præmittuntur & interpolantur; imo sola per se interdum omnem absolvent paginam. Sic „ pictorem quendam „ pallidum, debilem, pupilla quam maxime „ dilatata, summa visus debilitate, verbo „ amaurosi incipiente affectum, usu liberiori liquoris terræ fol. \square ri & Fris cachectici QVERCETANI integerrimæ sanitati „ restituit, A. G. RICHTERUS (p). Alterum vero in scopum

2. *Cicuta* se se exhibuit admodum efficacem, ubi nimirum aut diathesis tantum lenta humorum, aut etiam tumores strumosi, mucosi, &c. vasa nervosque prementes præsto erant. Illustria hanc in rem suppetunt variorum exempla. Ill. L. B. de STÖRCK (q) „ virgo 25 annor. (refert) post morbum acutum subito privatur visu, & afficitur „ vera amaurosi. Vidi sæpissime Fris in „ Ω frum. solutum præter decocta solventia „ simili in casu profuisse. Hunc igitur huic „ ægræ præbui, ejusque usum satis largum

(o) Vide §. 66. No 2.

(p) l. c. p. 85.

(q) De cicuta Lib. II Cap. 2. casu. 28. p. 155. sqq.

„ per 2 fere menses continuavi, verum fru-
 „ ctum inde nullum adverti. Quoniam ve-
 „ ro observavi sæpius cicutam ibi penetrare,
 „ ubi sublimatus non potest, hanc vocavi in
 „ usum. Statim à scrupulo seu 20 granis
 „ per diem incepti. Post 3 septimanas fre-
 „ quentes vertigines & scintillationes ægra
 „ conquerebatur, & sibi videbatur quando-
 „ que lucem & colores distingvere. Verum
 „ lucida talia intervalla mox iterum eva-
 „ nuerunt, & caput inde factum est vertigi-
 „ nosum; dedi tunc purgans. Versus finem
 „ secundi mensis ægra jam obscure potuit
 „ quædam videre, neque a scintillatione
 „ neque a vertigine adeo frequenter affi-
 „ ciebatur. Sub initium tertii mensis jam
 „ 2 drachmas quotidie de extracto cicutæ
 „ absumpsit, & visus fiebat multo melior.
 „ Hac dosi in 5^{to} mensem ægra continua-
 „ vit, & tunc potuit omnia videre, distin-
 „ gvere. Quamvis larga dosi & longo tem-
 „ pore sumpsit cicutam, nil unquam inde
 „ mali conquesta est; imo augebatur appe-
 „ titus, increverunt vires, & omnes actio-
 „ nes, alias languidæ, restaurabantur. Men-
 „ ses debito tempore & debita copia sem-
 „ per habuit. Porro (r) „ homo 32 an-

(r) Lib. quo cont. experim. &c. Cap. 3. cas. 9.

„ nor. a pluribus annis sensit visum suum
„ debilitari, demum nec objecta nec colo-
„ res amplius distingvere potuit, pupilla u-
„ traque erat multum dilatata; ceteroquin
„ in oculis nullum vitium detegebatur. Re-
„ media solventia, alvum ducentia, pedi-
„ luvia, vesicantia, &c. mali progressum
„ impedire non potuerunt. Svasi igitur,
„ cicutæ extractum sumeret. Per 3 septima-
„ nas nullum sensit effectum; postea vero
„ lancinantes in oculis dolores percepit, &
„ frequentes scintillæ versabantur ante ocu-
„ los; dein potuit objecta per vices magis
„ dignoscere: paulo post autem visus erat,
„ ut ante, turbatus & debilis valde. In
„ 5^{ta} septimana jam omnia erant meliora,
„ nec adeo frequentes advertiebantur in ocu-
„ lis lancinationes, & pupillæ videbantur
„ longe mobiliiores, & erant magis contra-
„ ctæ. Spatio 5 mensium solo hujus reme-
„ dii usu continuato visus integre rediit, &
„ pupillæ erant in statu naturali,,. Alio-
„ rum quoque idem hic Ill. Auctor testimonia
„ hanc ipsam in rem passim producit. Sic HE-
„ ZELIUS (s) „ homo (inquit) 25 annor. per
„ aliquot annos castra seqvebatur, & subito

(s) Ibidem Cap. 8. p. 168. sq.

„ præter causam sibi notam cœpit vera a-
 „ maurosi in oculo dextro laborare. Ad-
 „ hibebantur illico efficacissima remedia; ve-
 „ rum visus mansit deletus. Post aliquot
 „ septimanas pes inflammabatur, & intumu-
 „ it, & accessit febris vehemens cum magna
 „ siti. Applicata quamvis fuissent debita
 „ remedia, tumor tamen rumpebatur, &
 „ abiit in ulcus malignum, trahebatur mor-
 „ bus, & supervenit cachexia. Æger pes-
 „ simo in hoc statu mihi commendabatur.
 „ Dedi statim quotidie gr. xvj extracti ci-
 „ cutæ, & vulnus decocto cicutæ & ∇^a cal-
 „ cis vivæ deligavi. Post octiduum dedi gr.
 „ xx extracti per diem, & oculo amaurosi
 „ laboranti applicui vapores decocti cicutæ.
 „ Intra paucas septimanas omnia mutaban-
 „ tur in melius, & æger sensit fugitivos lu-
 „ cis radios, nil tamen adhuc potuit distin-
 „ gvere. Auxi posthac dosim extracti ci-
 „ cutæ, & dedi gr. 20 mane, & totidem
 „ vesperi: reliquis externis remediis conti-
 „ nuatum est. Tantum hæc cura habuit
 „ successum, ut spatio binorum mensium
 „ non solum ulcus pessimum & fistulosum
 „ fuerit integre sanatum, sed & rediit visus
 „ ita, ut æger potuerit omnia objecta opti-
 „ me distingvere & videre. Mirabantur o-
 „ mnes tantum remedii effectum, qui ægrum
 in

„ in miserrimo statu antea viderunt „. Per-
inde narrante C. STRACKIO (t) „ juvenis
„ 22 annor. sensim videndi facultatem ma-
„ gis atqve magis amisit, sic ut metueret,
„ se deniqve omnino cœcum ita futurum
„ esse;... erant vero oculi sanorum simi-
„ les, neqve ullum in his vitium depre-
„ hendere potui. Quare juvenem collum
„ denudare jussi, visurus, num aliquod vi-
„ tium venas jugulares afficeret, inqve his
„ sanguinis reditum impediret. Apparuit
„ tum lata struma, quæ aliquam jugulari-
„ um venarum portionem amplexa infar-
„ ctum sanguinis in capite effecit, exqve eo
„ cœcitatem. Retulit etiam juvenis, ubi
„ montem aut scanderet, aut corpus quovis
„ modo velocius agitare, difficulter spira-
„ re se, atqve angere. At posteaquam ex-
„ tracti cicutæ drachmam quotidie in 5^{um}
„ usqve mensem assumpsisset, dissipata stru-
„ ma est, & spiritus liber evenit, & acutus
„ visus „. Simili quoque cum successu ci-
„ cutam præbuit F. LEBER (u), nempe „ vir
„ 40 annor. (inquit ille) amaurosi post mor-
„ bum acutum afficiebatur: plurima adhibi-

(t) Ibidem p. 182. sq.

(u) De Cicutâ L. 2. Cap. 3. p. 248.

„ ta remedia nihil juverunt. Dedi inde
 „ cicutæ pilulas, & post 3 menses cœpit lu-
 „ cem distingvere & paulisper videre: 10mo
 „ mense jam iter 3 horar. solus sine duce
 „ confecit; interim omnia distincte videre
 „ non dum potuit: 16to mense ex solo usu
 „ cicutæ integrum visum habuit „. Deni-
 „ que (x) „ Cl. TAUBE Aulæ Britannicæ Me-
 „ dius in epistola refert: virgini 20 annor.
 „ per 4 annos perfecta amaurosi affectæ in-
 „ tegrum visum solo hoc remedio esse re-
 „ stitutum „. Sed apage te cum Cicuta,
 inquit quis, quæ toties imposuit! Bene
 habet! Sed & vos hinc facessite cum ꝑrio,
 cum Ypecacuanha, cum aere fixo, cum
 opio, cortice Peruv. ac sexcentis aliis, ut
 quæ perinde haud semper ægros medentes-
 que voti compotes reddant! Non is fuit Ill.
 STÖRCK, aliique, qui cicutam nunquam
 fallere & viderint, & scripserint. Enim ve-
 ro ipse Ill. Observator (y) binos in medium
 attulit casus, ubi hoc remedium necquid-
 quam est exhibitum. Nempe „ alii ægro
 „ (ait) eodem prorsus morbo laboranti, cu-
 „ jus autem oculorum bulbi erant diffformes,

(x) Lib. de Colchic. autumn. rad. append. p. 87.

(y) Lib. quo continetur experim. Cap. 3. cas. 10. 11.

„ protuberantes, & acuminati, idem cicuta
„ tæ extractum longo tempore fuit exhibi-
„ tum, sed nulla fiebat in melius nec in
„ pejus mutatio. Juvenis 12 annor. in oculo
„ sinistro habebat pupillam admodum dilata-
„ tam, intra quam hærebat corpus ex-
„ flavo cœruleum, subpellucidum, rotun-
„ dum, & visus eo in oculo erat penitus
„ extinctus. Tentavi, quid cicuta hoc in
„ casu præstaret. Per 3 fere septimanas nul-
„ la fiebat mutatio: postea vero æger sensit
„ $\frac{1}{4}$ hora post assumptum remedium magnam
„ in oculo pulsationem & vehementem do-
„ lorem; contrahebatur illud corpus hete-
„ rogeneum ita, ut per pupillam protuberaret.
„ Duravit hoc per plura minuta; dein
„ erant iterum omnia pacata, sed manebat
„ malum immutatum. Idem motus in
„ oculo convulsivus rediit quotidie eodem
„ modo per binos menses: & cum malum
„ non emendaretur, abstinui ab hoc remedio.
„ Juvenis antea cachecticus & macilentus
„ fiebat robustus, & recuperavit optimum
„ colorem; ratione visus autem lucrabatur
„ nihil. Atque hinc satis conficitur, amaurosin
„ haud quavis de causa ortam cicuta esse
„ medicabilem, sed eam tantummodo, cujus ad
„ causam tollendam cicuta a Creatore vires
„ est adepta, qualis est

diathisis frumosa , &c. Hinc etiam c.
sTRACK (z) ,, amaurosim . . . quæ orta ex
,, alia causa erat , extracto cicutæ per inte-
,, grum anni spatium frustra curavit ,, . Re-
cte proinde ,, si unus ex centum cæcis , qui
,, ceteroquin curari non possunt , curetur
,, cicuta , inquit STÖRCK (a) , an non hoc
,, nobis sit incitamento , ut in omni data oc-
,, casione prudenti methodo hoc remedium
,, adhibeamus ,, ? Atque hæc de solventium ,
quæ solos humores lentore peccantes poten-
ter fundunt , genere attigisse sufficiat. Sed
& alterum habetur solventium genus , hic
perinde admodum efficax , quod & humorum
lentorem frangit , & langventem vasorum
vim contractilem simul excitat , variisque se
se ab experientia commendat remediis ; ve-
rum de his aptius alio loco (b) erit agendi
occasio.

(z) Ibidem Cap. 8. p. 183.

(a) Lib. de Colchic. autumn. l. c. p. 88.

(b) Vide §. 77. sqq.

C A P U T VII.

M E R C U R I U S.

§. 73.

MERCURIUS vero, tametsi ob virtutem suam humores quam maxime fundentem in solventium censum referendus fuisset; cum tamen simul non salivam modo, verum menses quoque efficaciter moveat, nec non ad partes spasmodicis constrictas relaxandas magno cum successu hodie usurpetur, ac denique & anthelminticus sit, & præsertim antisyphiliticus, proindeque multifariis amauroseis causis tollendis par: suo seorsim loco proponendus est. Quapropter si vim ejus lentos humores liquantem ac per salivales vias (vasis oculorum admodum vicinas) ubertim evenientem spectemus, facile apparebit, cur §. 90 Cl. quique Practici in amauroseos cura plurimum fere tribuerint, & eum ad ptyalismum usque præbendum svaserint. Neque sperato caruit hoc remedium in contumacissimo etiam ac vetusto malo successu II. BOERHAAVE (c) in amaurosi sedem in reti-

 (c) l. c. Cap. I. §. 90.

næ vasis habente, post frustra tentata alia
 extremo loco salivationem svadet,, quæ,
 ,, quando indicatur, quantocyus (ait), &
 ,, ad summum 5^{to} die instituenda est, & ob-
 ,, servanda diæta in cura morbi Gallici præ-
 ,, scribi solita. Hoc unicum hic remedium
 ,, superest, resolvit nimirum integre sangvi-
 ,, nem, ut in eo paucae particulæ rubræ su-
 ,, persint, & totus reddatur tenuis & sero-
 ,, sus, quod patet ex halitu foetido, tumo-
 ,, re gingivarum, & summa flacciditate. Hac
 ,, ratione aliquot ægros curavi. Actionem
 ,, vero § iii pro lubitu ad loca meliora de-
 ,, rivare possumus. Ergo quotidie ad. gr.
 ,, xij vel xjv § um adhibui, donec signa
 ,, salivationis, foetor & halitus putridus, a-
 ,, nimi deliquia, & alia symptomata acceffe-
 ,, runt. His signis adparentibus ▽^a hordei
 ,, cum lacte pro potu fuit. Quo autem ma-
 ,, jor salivatio fiat, fomenta ad caput ad-
 ,, plicanda sunt. Observamus enim iis, qui
 ,, § um adsumunt, & caput valde tegunt,
 ,, caput in primis tumere, iis autem, qui
 ,, pedes tegunt, pedes magis intumescere,
 ,, eosque vix salivationem pati; illi denique,
 ,, qui abdomen tegunt, diarrhœa fere labo-
 ,, rant. Quia vero hoc malum curandum
 ,, in capite est, actionem § ii ad caput ut
 ,, derivemus, necesse est. Hinc iis caput

„ linteis ∇^a calida madidis tegi debet, ut
 „ salivatio eo melius succedat. Et omnino
 „ remedium arcanum est salivatio etiam in a-
 „ maurosi „. De qua perinde R. MEAD (*d*)
 „ hoc ego (ait) usus experimento, dum
 „ juvenis adhuc medicinam facerem, pau-
 „ peribus primum in nosocomio, deinde &
 „ aliis, visum... reddidi, laudantibus Me-
 „ dicis, qui ad id usque tempus malum hoc,
 „ cum invaluerat, immedicabile esse puta-
 „ rant „. Haud secius, si quibusvis aliis præ-
 „ fidiis „ cedere recuset morbus confugien-
 „ dum, inquit F. HOFFMANNUS (*e*), ad
 „ lenem salivationem, cujus ope nonnullos
 „ a cœcitate gravi sanatos novi „. A.
 WESTPHAL (*f*) refert puero egeno sum-
 me cacochymico, pedibus nudis semper in-
 cedenti, ac per 24 hebdomades plane jam
 cœco, cum oculis valde turbidis, atque hinc
 inde, præsertim prope pupillam, albis ma-
 culis apparentibus, cumque continuo fere
 capitis, maxime in regione frontis, dolore,
 post 8 hebdomadum usum ℞ in dulc. cum
 triplo lap. 69, & decocti ex rad. chinæ,

(*d*) Monit. & Præc. med. Cap. 10. Sect. 1.

(*e*) l. c. thes. therap. §. 5.

(*f*) Act. nat. cur. Vol. 8. Obs. 62.

farfaparillæ, bardanæ, & scrophulariæ, nec
 non vesicantium ad furas, ad oculos vero
 epithematum ex herbis roborantibus ac discu-
 tientibus, interpositis subinde eccoproticis,
 visum ita rediisse, ut & colores varios dis-
 cernere, & majusculum typum legere qvi-
 ret, usque dum demum plene, ut ante, vi-
 su polleret. Perinde, narrante G. H.
 BEHR (g), uxor nautæ... 42 annor. statu-
 „ ræ gracilioris, macilentioris, tempera-
 „ mentique cholero-melancholici, per
 „ aliquot jam annos de intensissimis capitis-
 „ doloribus conqvesta, ante 11, & qvod
 „ excurrit, menses inopinanter... visionis
 „ sensu privata erat, ita ut ocellorum nul-
 „ lo aliquid cognoscere aut percipere pos-
 „ set... Multa incaßum ante adhibita: tan-
 „ dem... salivationis curam... pana-
 „ cea... & li adeo fortunate absolvit, ut
 „ inseqvente 4^{ta} septimana lucis prius amif-
 „ sæ radios respicere... atqve paulo post
 „ gemino rursus frontis sidere cuncta distin-
 „ cte accurateqve discernere posset,,. Ne-
 qve minus notus est L. HEISTERI (b) ca-

(g) *Commerc. Nor. T. 3. A. 1733. hebd. 27.*
 p. 212.

(b) *Dissert. cit. §. 1. 17. sqq.*

fus: „ mulier (inquit ille)... 46 annos na-
„ ta, pallida, macilenta, catarrhis sæpius
„ obnoxia, aliquando matutino tempore
„ furgens bene adhuc videt; post horam circ.
„ levi caligine oculorum corripitur, quæ
„ sensim ita augebatur, ut circa meridiem
„ tam cæca facta, ut ne minimam lucis &
„ tenebrarum distinctionem amplius perciperet,
„ caput dolore gravativo distendente
„ dolere incipit, & sic per 14 circ. dies in
„ misero hocce ... statu degebat... Ego
„ adveniens ægram de perfectissima cœcitate
„ utriusque oculi conquarentem inveni:
„ oculos binos examinans sanis prorsus cognovi
„ similes, ac nihil quidquam vitii in
„ eis observare potui, præterquam pupil-
„ lam valde dilatatam, sed nigram; tandem
„ omnibus experimentis percepi, ægram
„ omni visu penitus privatam esse. Præter-
„ ea in causas procatarticas mihi inquiren-
„ ti nihil aliud ægra referre noverat, quam
„ quod sæpius antea cephalalgia gravativa
„ & catarrhis fuerit afflictata, a mense cir-
„ citer ante cœcitatem elapso meminit, se
„ cornu vaccino ictum, cum in lacte emul-
„ gendo occupata esset, accepisse in capite,
„ attamen per integrum illum mensem nul-
„ lum singulare incommodum inde percepisse.
„ Ceterum satis valebat, menses ordi-

„ nario adhuc modo se habebant, parum
 „ vero appetebat. Hæc ægra non solum,
 „ qvo morbo laboraret, scire desiderabat,
 „ sed potissimum, ut visus ipsi restituere-
 „ tur... Igitur & sine ulteriori mora cum
 „ ægra nostra salivationem ꝯlem instituen-
 „ dam consultum duximus, cujus regimen
 „ jam trademus. 1^o) ut corpus ægræ ad
 „ salivationem rite disponderetur, Væ Sem
 „ instituimus, etiam si ceteroqvin nulla san-
 „ gvinis mittendi urgens indicatio adeffet,
 „ sed ut ꝯio ac dissolventibus remediis eo
 „ melius spatium paretur in vasis sangviferis,
 „ qvo liberius agere qveant. 2^{do}) Ad pri-
 „ mas vias expurgandas seqvens medicamen-
 „ tum hydragogum exhibuimus:

R. ꝯrii dulc. ʒ ss.

Ref. Jalapp. subact. gr. vij.

Conf. fl. tunic. q. s. F. bolus,

„ qvem ægra vesperi assumpsit, unde altero
 „ die aliquoties dejecit. Postridie purga-
 „ tionis cum de nausea & conatu vomendi
 „ conqvesta esset, exhibitum fuit lene vo-
 „ mitorium, nempe

R. ☐ emet. gr. ij.

„ Sacch. alb. ʒss. M. F. ☐, a qvo
 „ cum regimine optime vomuit, & nausea
 „ periit. Interea pro potu ordinario ad

„ sangvinem attenuandum sequenti uteba-
„ tur decocto :

R. Passul. minor. ʒj.

Rad. Sarsaparill.

—— Chinæ

—— Liqvirit.

Rasur. CC. aa. ʒʒ.

Sem. Anisi ʒij.

Cinnam. ʒj. M. incis. & contus.
coq. in ∇^a fontan. ℥. viij. per

„ $\frac{1}{4}$ h. Colatura fervetur pro usu, de qua
„ bibit pro libitu. Postea ad ʒrii applica-
„ tionem, ipsiusque salivationis excitatio-
„ nem progressus factus est, nempe

R. ʒ dulc. gr. xxx.

Extr. fumar. q. s. F. pilul. ʒo de
„ quibus quotidie 10 sumpsit; simul se-
„ quenti unguento glandulas parotides quo-
„ tidie inungebat:

R. ʒ crud. ʒʒ.

Axung. porcin. q. s. F. Ungv.
„ De hoc ægra singula vice magnitudinem
„ fabæ in quovis latere affricavit, ut sic eo
„ melius ʒus ad vasa salivalia determinare-
„ tur. Ad eundem scopum errhinum, &
„ quidem sequens, utile judicavimus:

R. ʒ dulc. gr. ij.

Sacch. alb. gr. x. M. F. ʒ, de
„ quo subinde gr. j. naribus hausit, unde le-

„ nem in naribus percepit stimulum. Cum
 „ post triduum nulla adhuc salivationis signa
 „ adessent, variationis gratia loco priorum
 „ pilularum interne sequens ordinatum est
 „ medicamentum ☿ le:

R. ☿ dulc. ℥ss.

Conserv. rosar. 3j. M. F. bolus.

„ D. in triplo pro 3 dosibus, quotidie unam
 „ assumendam. A quorum usu tandem die
 „ 6to lenis salivatio oborta est. Die 9no
 „ curationis incepit vesperi, cum candela
 „ in cubiculum apportaretur, lucem a te-
 „ nebris distingvere. Postea cum saliva-
 „ tio admodum parva esset, ut melius pro-
 „ cederet, singulo biduo similem bolum
 „ ☿ lem denuo assumpsit; & cum ægra la-
 „ ctis desiderio corripereetur, cujus potu a-
 „ lias delectabatur, minime hoc ipsi dene-
 „ gavimus, sed loco decocti illius ordinarii
 „ hydrogala usa est ex parte j lactis & vñ
 „ partibus jv paratum, leniter simul antea
 „ coctis, imo etiam subinde lac ebutyratum
 „ desideravit, & bibit. Sic salivatio me-
 „ lius, quam antea, processit, sine ullo in
 „ faucibus incommodo, dolor capitis remisit,
 „ & circa diem 14 homines atqve colores
 „ insigniores distingvere cœpit. Die 16 tem-
 „ pore matutino vomitu spontaneo correpta
 „ fuit, ob quem Diascord. ℥ij assumpsit, &

„ ventriculo empl. de Tacamahac. imposi-
„ tum fuit. Nausea tamen postea ægram
„ adhuc per 4 vel 5 dies vexaverat, tamen
„ sine vomitu, & forte a lactis usu orieba-
„ tur; interea tamen ægra lacte potius,
„ quam alio potu medicamentofo (quorum
„ varii conficiebantur) uti malebat. Ne
„ autem salivatio prorsus remitteret, quæ
„ tunc lenissima erat, ad eam denuo ex-
„ suscitandam, sequentibus postea usa est
„ pilulis:

Rx. ꝯ dulc.

Extr. Gentian.

—— Absinth. aa. ʒij. M. F.

„ pil. pond. gr. j. de quibus singulo vesperi
„ 10 assumebat: unde salivatio blanda &
„ lenis continuata est usque ad 30 circ.
„ diem, & visus quotidie auctus. Interea
„ pro ventriculo continuo nauseante robo-
„ rando sequens tragea ordinata fuit:

Rx. Sem. Anisi

—— Fœnicul. aa. ʒij.

Cinnamom.

Macer. aa. ʒjv. M. F. trag. de

„ qua aliquoties quotidie assumat circ. ʒj.
„ pro dosi. Præter hydrogalæ potum se-
„ quentibus speciebus, usa est instar The-
„ bibendis;

R. Herb. Betonic.

— Euphras. aa. ʒj.

Cinnamom.

Sem. Fœnic. aa. ʒj.

„ Incis. & contus. crasso modo D. pro in
 „ fuso pugillari mane & a meridie instar
 „ Theæ forbillando. Die 34^{to}, cum sa-
 „ livatio jam a biduo cessaverat, extra ur-
 „ bem (erat enim mense Junio) sine ducto-
 „ re, omnium cum admiratione, prodeambu-
 „ lare cœpit, & quotidie visus majorem acqui-
 „ sivit perfectionem. Svasi, ut quotidie con-
 „ tinuaret tragea illa ac Thea medicata, at-
 „ que singulo triduo de pilulis ultimis unam
 „ caperet dosin, ut lenissima adhuc aliquamdiu
 „ salivationis vestigia maneant. Quod cum
 „ ageret, factum est, ut 5 septimanis per-
 „ actis domum . . . pedibus reversa sit, o-
 „ mnia satis accurate dignoscens. Ubi au-
 „ tem adhuc per 14 dies medicamentis mo-
 „ do dictis continuavit; quibus ita conva-
 „ luit, visumque talem recuperavit, ut le-
 „ gere, suere, fila per acus etiam tenuissi-
 „ mas transmittere . . . potuerit, & adhuc
 „ hodie, dum hoc scripsi, possit. Tempo-
 „ re curationis pro cibo nihil aliud, quam
 „ subinde tenue quoddam jusculum assumpsit.
 „ Topica medicamenta oculo adhibita non
 „ sunt; quia ob profundiorum mali situm
 „ parum in hoc morbo præstare possunt ef-

„fectus.“ Porro (i) studiosus ejusdem occipientem amaurosin cum vehementi dolore & carie septi narium passus, post varia multis mensibus incassum usurpata leni demum ptyalismo convaluit, sequentem in modum excitato :

R. ♂ Jalapp. ℥j.

♀ dulc. ℥ss.

Diagryd. sulph. gr. v. D. S. mane pro una dosi.

R. Rad. Sarsapar. ℥iiij.

Herb. Euphras. M. j.

Ras. ling. Sassafr. ℥j. M.

conc. gr. m. D. Spec. pro infuso bis per diem forma Theata bibendo ; reliquum vero in ℥ss jv aquæ decoctum potui serviat.

R. ♂ purif. n. gr. v.

Matr. perl. præp.

♂ii diaph. aa. ℥j. M.

F. ♂ D. in xij. p. æqv. S. No j bis per diem cum potu prius dicto.

R. Ungv. nigr. n. ℥jss. D. ad fict. m. & v. carpis manuum infricandum.

Ab his ubi die quodam ptyalismus occepit, posteroque die ultra mensuras duas æger

(i) Med. chir. u. anat. Walurnehm, 2 Band No 375. p. 700.

sputaffet, ꝥ iii dulc. usu seposito, lituqve non nisi vesperi imperato, amplum inter scapulas vesicans appositum est, ac seqvens collyrium præscriptum:

R. ▽^x Valerian.

Fœnicl.

Euphras. aa. ʒij.

Reg. Hung. ʒss.

Sal. vol. oleof. ʒj. M. D.

pro oculis sæpius per diem illinendis. His remediis æger intra mensem prorsus iterum convaluit. Porro juvenculam salivationis ope ab utriusque oculi amaurosi A. Q. RIVINI opera liberatam narrat ISAACUS (k). Hæc itaqve satis, opinor, ostendunt, ꝥ unum ad amaurosin debellandam ingentis esse efficacix remedium. Rejicit illum tamen summa cum severitate C. E. ESCHENBACH (l) seqventem ob casum vel maxime ejus ab usu deterritus: E. F. BURCHARDUS „ vir „ ... doctus, annos 24 natus, tempera- „ menti cholericæ, habitus corporis strictio- „ ris, staturæ mediocris, sanus atqve inco- „ lumis, tempore hyberno milliaria quæ-

(k) Diss. de salivat. ꝥ li &c. 4to Halæ. Præside
STAHLIO.

(l) l. c. Obs. 20.

dam ab urbe nostra cum amico proficiscitur,
& domum reversus brevi postea ex refrigeratione, uti opinabatur, in itinere perpeffa mane surgens alterius oculi usum, antecedente vespera, dum cubitum iret, adhuc illæsum, esse amissum percipit, bulbo ipso nihil plane vitii monstrante. Ipse, cum esset Medicus practicus, guttam serenam sibi adeo subitaneam advenisse cognoscebat. Mali gravitatem contemplan, & de altero etiam oculo adhuc dum sano metuens... statim experiri... & rii usum ad mediocrem salivationem usque statuebat. Hæc strenue exsequens, & sputatione jam jam ad finem iterum properante, postquam ultra 14 dies duraverat in gradu mediocritatem paulo adhuc superante, e causa quadam accidentali ira vehementius excandescit, forte & aerem liberio rem, tunc temporis frigidior em, incautius admittit. Exinde mox corripitur spasmodica pectoris constrictione, quæ diætæ & medicamentis congruis iterum debellata, & salivatione continuo durante, insimul vero magis magisque decrescen te, imo & finita fere, 8^o circ. ab experta iracundia die, post præcedentem gingivarum cruentationem, ægroto ex improviso & sponte vas quoddam sangviferum

„ aperitur in faucibus , qvod per horarum
„ aliquot spatium tantam emittebat sangvi-
„ nis copiam , ut affluentem continuo cruo-
„ rem cum saliva , ipsa adhucdum aliquvali-
„ ter fluente , permixtum æger vix posset
„ exspuere , qvin statim iterum os sanguine
„ esset repletum , cujus qvantitas qvoqve
„ deglutita ad ventriculum deferebatur. Flu-
„ xus hic cum 12 horas , a meridie usque
„ ad mediam noctem , duravisset , tandem
„ sponte sistebatur ; medicamenta enim as-
„ sumpta atroci illi symptomati nil quidquam
„ derogabant. Qvo facto ventriculus cruo-
„ rem deglutitum atqve coagulatum vomitu
„ rejiciebat in magna copia , adeo ut ef-
„ fluxi atqve rejecti sanguinis qvantitas ge-
„ neralis facile aliquot libras æqvaret pon-
„ dere. Post superatum hoc accidens , ...
„ æger vires amissas recuperare omni studio
„ laborabat , qvæ etiam pedetentim reverte-
„ tebantur , in primis cum appetitus acce-
„ deret bonus. Verum enim vero post elap-
„ sos alios dies circ. 8 sine omni errore
„ dietetico noviter commissio , dum una cum
„ proxime cognatis æger pranderet domi ,
„ ... de facta quasi cum cultro per caput
„ interius transversim adacto ruptura in ce-
„ rebro improvisa subito conqveritur , ad
„ lectum properans ... Ibi ... jacentem re-

perio, qui vix malum ipsi superventum
narrabat, cum leviter jam delirare, &
præsertim pedes more incongruo... lecto
emissos commovere inciperet, accedente
post unum alterumve verbum prolatum
femihora a dicta ruptura accepta morte...
placidissima. Sectio post obitum non con-
cedebatur. Interim prægressus cruor pri-
mo e gingivarum vasis dilatatis, deinde e
majori in faucibus vase sangvifero fluens,
hac etiam vice vas ejusmodi sub cranio
sponte esse ruptum, & effusum sangvinem
quocunque loco emissus steterit, copia
atque gravitate sua cerebrum letaliter
compressisse vero est simillimum,,. Hac
observatione præmissa pergit,,posito (in-
quiens), quod observationes istæ omni
ex parte fuerint completæ id est, quod
in hisce ægrotis tam revera amaurosis ad-
fuerit, & rii usu, nec forte alia quadam
causa accidentali abiens, quam postea
nunquam redierit. Id ultimum enim ac-
cidere interdum, & guttam serenam non
in omnibus ægrotis, continuatis æquali
modo passibus augeri, sed quandoque per
aliquod tempus remittere, experientiâ
clinica jam dudum Medicos edocuit: nec
semper occasio adest, ejusmodi sanatos
post aliquod tempus peractum denuo in-

visendi, variis quippe mutationibus & loci & aliis interdum obnoxios. Interim & contra ea dantur historiæ multo plures salivationis in morbo dicto nullam plane efficaciam edentis, quales a Medicis fide dignissimis mihi relatas quasdam novi, & nonnullas ipse annotavi in Tract. quem de Oculista Anglo TAYLOR nominato lingua composui vernacula Rost. 1752 impressum: quod idem ægrotus supra... descriptus testatur, plane nullum quippe levamen morbi e salivatione, licet sufficienti, percipiens. Et sane si guttæ serenæ, quæ est nervorum affectio, naturam perpendamus, & quæ contra affectus paralyticos vires experientia præeunte percontemur, ipsius efficacia ad debellandam guttam serenam, quæ species habetur paralysis, maxime redditur dubia; quin & istam aliquando exinde provocatam auctores (m) observarunt. Quamvis enim ille inter subtilissima atque fortissima medicamenta aperientia adhucdum cognita recenseri mereatur; nihilominus contra paralysis, nisi sub certis conditionibus, iisque accidentibus (e. g. si nervi compres-

(m) Misc. nat. cur. Cent. 7. Obs. 82.

„ fio sola, orta a vase sangvifero aliove ob-
 „ structo, sicque dilatato ab humore nimio,
 „ libere haud transeunte, morbum produ-
 „ xerit), nil valere eundem clinica expe-
 „ rientia monstrat. Unde recte concluditur,
 „ ipsius subtilitatem ad eum nondum ascen-
 „ dere gradum, ut canaliculos nervorum
 „ intrare queat; inque iis vim suam ape-
 „ rientem exserere. Qvin imo, etiamsi
 „ diætæ errores... vel pauci vel nulli pe-
 „ nitus accedant, varia mala ejus usum ad
 „ salivationem usque protractum fuisse se-
 „ cuta, præter experientiam quotidianam
 „ Auctorum historiæ relatæ testantur (n).
 „ G. de RABOURS (o) generatim de ma-
 „ lis assumptum in larga dosi hydrargyrum,
 „ hinc salivationem quoque, nonnunquam
 „ sequentibus sic loquitur: *nec hæmorrhæ-*
 „ *giæ solum periculi genus est, quod inde per-*
 „ *timescas. Sæpe integris vasculis ita incu-*
 „ *neatur (¶ us), ut membranas dolorifice di-*
 „ *strabat, prætereuntibus liquoribus ponat*

(n) Annal. Vratisl. Tent. 7. A. 1719. p. 344. M. ALBERTI Prax. extempor. Caf. 16.

(o) Quæst. med. an in lue Vener. parciore & longius dissitæ ¶ ii doses pleniorib. & cretiorib. anteponeandæ? Paris. 1739. §. 4. p. 6.

„ obicem, spirituum animalium cursum com-
 „ pressis nervis intercipiat, partes ubique gra-
 „ vet. Cephalicam itaque, delipientiam quan-
 „ doque, cœcitatem, lethargum, pectoris
 „ suffocationem, anxietatem, anorexiam,
 „ tormina, dysuriam, artuum tremores, pa-
 „ ralylin, & infinita hujus generis mala ex-
 „ citat. Idem optimi Auctores varii, qui
 „ de salivatione, de §^{io}, & de morbis a-
 „ gunt, in quibus hic potissimum in usum du-
 „ citur, affirmant. Ne tandem dubium re-
 „ maneat ullum, quod etiam in caput atque
 „ cerebrum omni sua vi agere queat Mercur.
 „ exempla prostant globulorum Mercurial.
 „ post mortem in craniis apertis invento-
 „ rum, qualia referunt R. LENTILIUS (p)
 „ & J. J. WEPFERUS (q), „. Hæc ille.
 Sed nos theoremata haud magni facimus,
 neque ulli credo mortalium incidit præbere
 eo fine Mercur. ut canaliculos nervorum in-
 trare queat, sed ut vasa lentore farcta fun-
 dendo & evehendo humores depleat, a
 quæis prius nervi optici premebantur. Has-
 ne vero conditiones quis accidentales esse
 ESCHENBACHIO hic dabit? Neque nos

(p) Misc. med. pr. P. 1. p. 74.

(q) Tract. de apoplex. p. 303.

eventus ptyalismi hinc inde sinistri morantur, quales omnibus aliis etiam remediis eodem jure objicere licet. Sed quorsum hæc omnia nobis, dicet quis, si usque adeo raro Mercur. amaurosin tollit? sane G. A. RICHTERUS (r) „Mercurium . . . profuisse „nunquam observavit „. Et W. ROWLEY (s) ex pluribus centenis ægris amaurosin passis non nisi binis visum restituit ope mercurii ac farsaparillæ. At feliciorine, quæso, successu alia ad amaurosin laudata præsidia gaudent? Multoties plures seu ☐o emetico seu alio quovis remedio visum recepere, quam quot ☿rio sanati sunt? Jure hic eadem de ☿rio, quæ recte STÖRCKIUS de Cicutâ (t) notavit, pronunciare licet. Neque me fugiunt etiam casus ii, in quibus amaurosis a ☿li ptyalismo inducta videri posset; sed id genus amauroses non tam ipsi ☿li ptyalismo, quam eidem potius ad frigus capiti admissum interturbato, tribuendas esse vel unus in testem sufficiet H. HEINRICI (u): „femina . . . erat (narrat ille),

(r) l. c. p. 87.

(s) A Treat. on the princip. Dis-eas. of the Eyes.

(t) Vide §. 72. No 2.

(u) l. c. p. 10. sq.

„ cui ꝯ dulc. pro salivandi fine dosibus ex
„ minoribus ad medias successive ascenden-
„ tibus, injuncto regimine dedi; cum in
„ propinquo effet salivæ fluxus & moderate
„ inciperet, ea rixantes in platea vicinas
„ inauditura caput per fenestram prospicien-
„ do exponit aeri frigidiori, qvalis solet ef-
„ se adulto autumnno, postea turbatur caput
„ vertigine, titubât, cadit super lectum,
„ transit vertigo, sed scotomia transit in
„ cœcitatem subitanæ, verbo: in guttam
„ serenam: durat hæc integrum diem, alte-
„ ro mihi nunciatur malum. Jubeo tantif-
„ per seponere ꝯ lia, porrigoqve purgans
„ ad derivandos humores: redit tantisper vi-
„ sus, purganteqve iterum repetito, melius.
„ Jubeo quiescere per binos adhuc dies,
„ ne purgans præmissum frustraret effectum
„ salivatorium. Postmodum vero repetere
„ ꝯ lia ad perfectam salivationem, tanto
„ cautiore regimine moderandam. Sequitur
„ ptyalismus largus per 14 dies & ultra, nec
„ quidquam denuo læditur visus, sed po-
„ tius debilitas ejus adhuc restans cessat pe-
„ nitus, manifesto indicio, non ꝯ um, non
„ salivationem, sed hujus incipientis restri-
„ ctionem, humorumqve ad cerebrum re-
„ gurgitationem, in causa mali illius fuisse.
„ ... Vidi tamen etiam eandem (amauro-

„ fin) a ☿^{rio} dulci pro salivatione puero
 „ moderatissimis dosibus exhibito sub frigi-
 „ diusculo itidem regimine non sequente sa-
 „ livatione, simile symptoma secutum, ad
 „ quod territus Medicus cum seponeret pe-
 „ nitus ☿^{lia}, nec ad effectum salivatorium
 „ satis dirigeret, permanfit quoque cœci-
 „ tas, quæ sine dubio cessasset, si debite
 „ fluxisset „.

§. 74.

In *sypbilitica* autem *amaurosi* (x) nihil
 ☿^{io} efficacius esse, nemo, opinor, vel ad-
 dubitabit, cum luculenta hujus mali ☿^{rio}
 quæ cum salivatione quæ citra eandem cura-
 ti exempla existant. Sic A. SPIGELIUS (y)
 „ vidit hoc morbo ex lue venerea laborau-
 „ tem, qui hydrargyro inunctus, liquefactis
 „ omnibus humoribus sanitati restitutus
 „ fuit „. Perinde D. NEBELII (z) „ vir
 „ quinqvagenarius & robustus per aliquot
 „ annos ozœna non finè luis venereæ suspi-
 „ cione laborans... opem imploravit, de

(x) Vide §. 49. d).

(y) De hum. corp. fabr. L. 7. C. 2. p. 244.

(z) Misc. nat. cur. dec. 3. ann. 9. obs. 123.

„ dolore frontis, oculorum, genarum, at-
 „ que narium, cum harum pertinaci obstru-
 „ ctione a muco viscido in subvirides par-
 „ ticulas coacto, & foetore odoratusque de-
 „ fectu potissimum conqvestus. Adhibita
 „ mox fuerunt tum interna decocta lignorum
 „ cum TRa δ ii \square sata, & pilulæ ex gum-
 „ mi ammon. myrrha, sal. vol. viperar. &
 „ cinnab. nativa præp. quibus sudor per plu-
 „ res septimanas prolectus, interpositis sæ-
 „ pe purgantibus \S libus, tum externa de-
 „ tergentia & mundificantia naribus per sy-
 „ phonem & cum turundis penicillisque im-
 „ missa ex ∇^a plantag. tutia præp. myrrha
 „ & sacch. \S ni, item ∇^a calc. vivæ, cui
 „ radices aristoloch. rot. summitates centau-
 „ rii min. folia sabinæ & myrrha incocta,
 „ tandemque TRa euphorb. cum \S para-
 „ ta, quibus 2 frustula ossei dissepimenti na-
 „ rium paulo post separata, & volsella binis
 „ vicibus extracta fuerunt, succedentibus fis-
 „ suris atque pustulis narium pinnas exe-
 „ dentibus, quæ consolidatæ tandem lini-
 „ mento ex bals. Peruv. & Copayv. terr.
 „ vitr. dulci, sarcocolla, \S \equiv rubro, &
 „ melle rosaceo, præmisso usu externo
 „ ∇^x phagadenicæ. Molestus tamen adhuc-
 „ dum fuit capitis dolor vespertinus, & ar-
 „ tuum lassitudo cum profluxu ichoris flave-

scantis ac purulenti e naribus; qvo dimi-
nuto visus in dextro oculo paucos intra
dies periit, & post septimanam, fluxu il-
lo narium penitus cessante, alter quoque
oculus admodum caligare cœpit, nulla in
utroque labe apparente, præter pupillæ
dilatationem & oculorum dolorem. Pur-
gantia, vesicatoria, errhina, sal. volati-
lia, & cinnabarina frustra in usum voca-
ta sunt: unde ad generosiora, ipsamque
inunctionem & lem deventum, qva debi-
te instituta primo diarrhœa, & hac diascor-
dii ope sublata, largus salivæ fluxus secu-
tus, atqve ita cephalalgia diminuta, &
pristina videndi potentia oculo sinistro
paulatim restituta, sed dextro denegata,
licet saliva per 4 septimanas largiter diu
noctumque ex ore distillaverit. Postquam
ptyalismus remisit, particula ossei sepimen-
ti sponte separata e naribus extracta fuit,
& æger sic sensim integram sanitatem re-
cuperavit, qva etiamnum per 3 annos si-
ne ullo recidivæ metu fruitur,,. Pari mo-
do L. HEISTERI (a) famulus syphiliticus
ex ulceribus externis incongruo litu tracta-
tis in 8 hebdomadam amaurosim incidit. Die

(a) Medic. chir. u. anat. Wahrnehm. 2 Band No 19.

10^a Septembr. præscripta sunt remedia sequentia :

R̄. MP. polychr. nostr. ℥ss. F. pil. No 26. consp. ♂^e liqvirit. S. No 13 vesp̄ri cum cerevisia.

R̄. Lign. Sassafr.

Rad. Liqvirit. aa. ℥j.

—— Valerianæ

Sem. Fœnicul. aa. ℥ss. M. crasse concis. D. & qvovis mane eorum cochlear $\frac{1}{2}$ coqv. in ∇^x ℥b. jv. Post alvum pilulis rite motam videbatur visus aliquatenus emendari. Die 13^a Septembr. porro datum

R̄. ☿ dulc. ppt. ℥ijss

Cinnab. nativ. ℥ss

Sacch. alb. ℥iij. M. S. m. v. & meridie ad cultri cuspidem. Porro

R̄. Ung. ☿ lis ℥j. pro illitu in articulos ac parotides.

R̄. ∇^x Rosar. ℥ij.

Ω Anthos ℥ss. M. F. Collyr. cuius qvotidie aliquoties quidpiam oculis instillet, palpebrisqve illinat. Ptyalismo finito pristinus revertit visus. Citra omnem vero ptyalismum I. F. CONSBRUCH (b) morbum hunc ope ☿ ⚭ corros. c. Ω frum. profliga-

(b) Nov. act. nat. cur. Tom. 5. Obs. 25.

vit: „fartor (ait ille) 40 & aliquot annor.
„homo bibax & libidinosus mense Septem-
„bri A. 1766 meum petiit consilium. Is
„jam ultra annum visionem sibi sensim he-
„bescere sensit, denique omnia, quæ aspe-
„xit, tenui quasi nube velata apparuerunt,
„oculisque ignes obversati sunt variis splen-
„dentes coloribus. Ego tum oculos inspi-
„ciens, eos neque inflammatos neque ma-
„le ferenos deprehendi, sed mira ista iri-
„dis ad lucis mutationes sensibilitas languit.
„Ægrotus multa medicamina incassum se
„usurpasse conqvestus est; ast rescivi, il-
„lum quondam venerea labe fuisse inqvi-
„natum, quod & æger demum mihi est con-
„fessus, licet nullum amplius vulgarium hu-
„jus mali symptomatum in corpore super-
„esset. Itaque procul dubio visus depra-
„vatio a venerei virus reliquiis in oculo-
„rum nervos translatis provenit. Quamob-
„rem... præscripsi ad modum Ill. de H A E N
„(c) $\text{℥} \text{ } \frac{1}{2}$ corros. gr. iij. in Ω frumen-
„ti $\text{℥} \text{ } \frac{1}{2}$ solvenda. De hoc medicamine æ-
„ger m. & v. cochl. j sumens, post quam-
„vis dosin libram apti alicujus decocti aquo-
„si (quale illud fuit ex radicib. althææ,

(c) Rat. medendi P. 2. C. 12. p. 174.

„ bardanæ, & liqviritiæ), affuso prius la-
 „ cte, debuit bibere. Alvus interdum pi-
 „ lulis ꝯ lib. pharmacop. Wirtenbergicæ ex-
 „ purgata fuit. Fateor, me in danda ꝯ $\frac{1}{2}$
 „ corr. solutione sub initio timidum fuisse,
 „ qvum ægrotus macilentus effet, & sicca
 „ tussicula crebro divexaretur; metum ta-
 „ men excussitejusdem remedii semper abs-
 „ qve noxa a me adhibiti memoria. Sar-
 „ tor vero cum sentiret oculis suis oppor-
 „ tunam esse hanc medicinam, sæpe per diem,
 „ me in scio, 5 illius cepit cochlearia, qvod
 „ cum mihi enarraret, serio prohibui. Ul-
 „ tra 7 menses medicamina assumpsit, ast
 „ non continue, prout enim morbum auge-
 „ ri vel imminui putavit, remedia accipere
 „ aut negligere ipsi placuit, neqve curatius
 „ diætæ præcepta observavit. Nihilominus
 „ his ita peractis falsa ista igniculorum simu-
 „ lacra defierunt oculis illudere, & æger
 „ tam bonum obtinuit visum, ut filum prom-
 „ pte in acum trajicere, & opificium suum
 „ tam interdiu qvam ad lumen nocturnum
 „ exercere posset,,. Eandem hujus ipsius
 remedii efficaciam G. H. HUDEMANN (d)

(d) Diss. de cicutæ, merc. subl. corros. & phosphori usu interno. 4to Helmstad. 1763.

observavit, sequentemque ceteris omnibus præfert formulam :

R. ∇^x Cinnam. vinosæ ξ v.

$\text{☿} \text{☿}$ corros. ☿

Syr. capill. Ven. Monspel. ξ j. M.

S. quovis vespere ξ j. vel ξ jss. Hæc proinde ☿ ii in curanda amaurosi venerea efficaciam satis superque evincunt. Unde J. L. SCHMUCKER (e) „ amaurosis (inquit) a „ miasmate venereo profecta solo ☿ io est „ medicabilis, quo nil proficiente nullum „ plerumque ægris remedium est reliquum „. Similia quoque paulo etiam post (f) repetit : „ amauroseos (dicens) a causa syphilitica natæ efficacissimum remedium est ☿ us „ externe haud secius, quam interne administratus, vidiqve sæpenumero id genus „ cœcitatem sub ipsa salivatione, aut alia „ quavis citra istam methodo, evanuisse : „ nihilo tamen minus hujusmodi ægris percurato malo venereo, si visus etiam tum „ erat imbecillior, millepedes etiam collyriumque (g) usui dedi. Quocunque autem (subjungit) alio in casu ☿ us nun-

(e) l. c. p. 8.

(f) Ibidem p. 24.

(g) Vide §. 103. B. No. 3.

„ quam est svadendus ; ut qvi tenero in
 „ texto vasculoso oculorum moras trahen-
 „ do malum potius augere qveat „ . Sed
 huncce metum nobis allata paulo ante (b)
 exempla auspicato eximunt.

C A P U T . VIII.

N E R V I N A.

§. 75.

NERVINA ad obtinendam amauroseos cu-
 rationem e duplici classe petenda esse, ob-
 servatio causæ & remediorum successus do-
 cuit. Enim vero cum amaurosis ea sit ner-
 vorum affectio, ut vel *paralysi* vel *spasmo*
 debeat, clarum est, prout hicce vel illa
 præsto fuerit, nervina quoque ejusmodi esse
 in usum vocanda, quæ vel spasmus præ-
 sentem abigere, vel paralyin, paræsin,
 atoniam tollere, tonumque pristinum resti-
 tuere qveant. Quamobrem

(b) Præced. §. 73.

§. 76.

I. ANTISPASMODICA *pacantia* nervorum turbas egregie sæpenumero profuisse visa sunt, inter quæ Opium primas tenet. Sic teste CAMERARIO apud I. SCHENCKIUM (i) „ J. LANG ex ingentissimis capitis cruciatibus, nec non & vigiliis de repente occæcatus est; cui cum gr. 5 opii extracti exhibuissem, somnus accersitus, dolorque ablatum, & subito quove uno momento visum recepit „. Meminit quoque R. LENTILIUS (k) matronæ ad 36 annos natæ, quæ ex atrocissima colica, castoreo sibi infenso oppugnata, in horrendos insultus epilepticos, crebro diuque per diem cruciantes, deliquia, aphoniam cum pulsu celeri debili intermittente, imo cessante, ac facie HIPPOCRATICA, & amaurosim incidit usque adeo, ut ardentem candelam oculis apertis, conspicuo vitio carentibus, admotam non senserit. Datis pilulis Wildegansianis ac specifico Physicrato desiere convulsiones, visusque inde pedetentim est reversus.

(i) l. c. L. 1. fol. m. 159.

(k) Misc. nat. cur. dec. 3. ann. 7. append. p. 130.

§. 77.

II. ANTIPARALYTICA *excitantia* nervos debiles , languentes , atonos , iisque majus conciliantia robur ac vigorem , perinde haud infrequenter morbum profligant. Atque ea vel maximè efficacia hic reperta sunt, quæ lentorem humorum simul potenter fundunt , ac proinde stases & obstructions tollunt , & suppressas ob debilitatem vasorum propellentium , lentoremque humorum immeabilium evacuationes consuetas restitunt. Talia sunt :

§. 78.

I. *Aconitum*. Quantæ sint hujus plantulae in arthriticis spasmodis & obstructions tollendis vires , post Ill. STÖRCKIUM (*l*) etiam P. A. BOEHMERUS (*m*) , H. J. COLLIN (*n*) , I. A. P. GESNERUS (*o*) S. A.

(*l*) Lib. de stram. hyosc. & aconit. Cap. 3. & Lib. quo contin. experim. &c. p. 97. 99. 103. 110. 113. 115. 163. sq. 209. 228. sq. 254. sqq. & Lib. de pulsatill. p. 58. sq.

(*m*) Diss. de usu salut. extr. Aconit. in arthrit.

(*n*) Obs. circa morb. acut. & chron. P. 2. C. 2. cas. I. 2. 3.

(*o*) Samml. v. Beob. aus d. Arzn. I B. No 18 p. 196.

REINHOLD (*p*), KAEMPF (*q*), I. G. SCHENKBECHER (*r*), & F. C. STOELLER (*s*), aliiqve sunt experti. Unde si id genus, aut ei analoga, diathisis, seu inducto vasorum ophthalmicorum infarctu, seu tumore circa nervos opticos elevato, amaurosin creet, non poterit aconitum non esse proficuum. Et vero experientia rem confirmat; siquidem, narrante Ill. de STÖRCK (*t*) „D. GOTTSCHENER Medicus Aulicus ex-
„tractum Aconiti optimo cum effectu ad-
„hibuit in amaurosi, ita quidem, ut æger
„visum iterum recuperaverit„. Præbetur hoc remedium STÖRCKII (*u*) methodo in pulvere,

R. Extr. Aconiti gr. ij.

Sacch. alb. ʒij. M. contere diu in marmoreo mortario, ut F. ♂ subtilissimus, cujus dosis est m. & v. ad gr. x. & amplius pro re nata.

(*p*) Diff. de Aconit. napello §. 11.

(*q*) Act. Hassiac. Vol. 1. art. 23. p. 154.

(*r*) Bericht von den heilf. Wirk. der Peruv. Rinde, &c. p. 159.

(*s*) Beob. u. Erfahr. aus der Heilkunst p. 146.

(*t*) Lib. quo contin. experim. &c. Cap. 8. p. 268.

(*u*) Lib. de stramon. hyosc. & aconit. l. c.

§. 79.

2. *Arnicae flores*. Hos multo jam ante, quam H. J. COLLIN (x) observationes suas edidisset, summa cum utilitate cum in febribus intermittentibus tollendis in Dania, teste V. B. AASKOW (y), tum in contusionibus sanandis, ut ex Annalib. Vratislaviensium (z) videre est, usurpatos fuisse, neminem, nisi monumentorum Medicorum prorsus ignarum, latere potest. Cum autem in contusis vasorum atoniam, lentoremque stagnantium humorum arnica emendare, in febribus vero intermittentibus nervosum etiam systema a turbis vindicare, queat: satis liquet, in amaurosi quoque, ubi eadem non raro obveniunt indicationes, plurimum ab eadem expectari merito posse. Et vero capitis ab H. J. COLLIN (a) hanc in rem experimentis eventus spem haud est frustratus, id quod sequentes commonstrant historiae:

(x) l. c. P. 4.

(y) Collectan. Havn. med. Vol. 2. No 19. p. 166.

(z) Tent. 7. p. 347 sqq. T. 9. p. 254. T. 15. p. 314. sqq. T. 18. p. 522. T. 19. p. 198. T. 22. p. 581. T. 28. p. 494. T. 29. p. 34. 217. sq. T. 33. p. 111.

(a) l. c. P. 4. C. 3.

A. *Virgini* 30 annor. 17^{mo} anno primos ordinatosque menses naſtæ anno ætatis 22^{do}, ad qvem uſque ſana vixit, ſubito dextrum oculum amauroſis citra manifeſtam cauſam invaſit, ac 6^{to} poſt anno lævi quoque oculi viſus ita minuebatur, ut majora non niſi objecta illo diſcerneret. Anno abhinc ſuperata febre acuta continua enureſin contraxit. Poſt varia fruſtra tentata datur demum arnica:

R. Flor. arnicæ ʒj. infund. in

▽^a ferv. $\frac{1}{2}$ h. vaſe clauſ. Col. ʒj. adde

Syr. fl. chamom. ʒj M. & intra diem 4 vel 5 hauſtibus abſumat. Cum octidui uſu nil proficeret, datum valentius infuſum e flor. ʒij in ▽^a ʒj. factum. Poſtero inde mox die ambos oculos per interval- la dolores urentes punctorii, lacrimas elicientes, horam ſubinde durantes, vexarunt; enureſis ſenſim intra 17 dies prorſus deſiit; pupilla dextra, prius immota, nunc admoto lumine contrahi, viſusque oculi ſiniſtri augeri cœpit, donec intra menſem pedetentim utrique oculo priſtinus rediiſſet. Toto tempore infuſi uſurpati catharticum qvater eſt porrectum (b).

B. *Juveni* undeviginti annos nato febris acuta continua, lente remediis cedens,

(b) Ibidem caſ. I. p. 79.

Octobri mense die 18^{va} morbi in tertianam versa est, cujus post alterum insultum admodum vires prostermentem sumpto Cortice non nisi unum adhuc lenissimum sustinuit; sed a prima jam invasione, cum cephalalgia sæviente, simul visus utrique oculo sensim usque adeo minuebatur, ut 17^{mo} inde die mane plena adesset amaurosis cum pupillis admodum dilatatis. Binæ uberes catharses, & latum nuchæ vesicans, frustra fuere. Datum ergo infusum e fl. arnicæ ʒij in ∇^x lb. j paratum, & post 4 dies e fl. ʒß in ∇^x lbj; cujus sub usu crebris ex intervallis æger breves, at acutissimos, dolores a fundo orbitæ ad corneam usque celeriter propagatos sentiebat: 5^{to} post die pupillis mobilitas aliquali cum visu redibat. Idcirco catharsi bidui instituta 3^{tio} die ad infusum reditum. Mitius jam dolor oculos habuit, visusque ac pupillarum mobilitas increvit. Diei 6^{ti} vespere æger post frigus tremoremque per $\frac{1}{4}$ horæ incaluit, sequente sub matutinum leni totius corporis sudore, sub quo pupillæ prope naturales evasere cum visu exiguorum etiam corporum, oculique vix amplius doluere. Pergente leni sudore fuscæ toto corpore effloruere petechiæ cum pulsu celeri, molli, debili, anxioque spiratione. Eapropter præter arnicæ infusum quotidie dabatur.

℞ vitrioli ℥j in decocti emollient. ℥.j. Die 10^o definit sudor, petechiæ flavescent disparituræ, crura tumescunt, pulsus spiratioque fit naturalis. Die 14^{to} petechiæ nullæ, oculi plus proficiunt; crura vero genuum tenus admodum oedematosa facta. Hinc posterioris decocti loco datæ quotidie oxymellis Colchici ℥ij intra 6 dies omne oedema per urinas motas discuffere; alvum vero inde adstrictam postero die catharticum datum reseravit. Continuato porro per hebdomadem adhuc arnicæ infuso juvenis sanissimus est dimissus (c).

C. *Puellæ* 23 annor. superata febre epidemica petechiali delirium superfuit, & 27^{ma}, a 1^{ma} morbi, die utrumque oculum obscuravit amaurosis cum pupillis immotis admodumque diffusis. Die 34^{ta}, cum vesicantia nuchæ verticique capitis admota nihil profuerint, cumque ob vires morbo fractas valentiora vacuantia locum non haberent, datum est infusum e fl. arnicæ ℥℥ in ∇^a ℥.j. Unde lenis subinde sudor, die 38^{va} delirium desit, visusque ac pupillarum motus ita pedetentim rediit, ut ægra die 43^a prorsus

(c) Ibidem cas. 2. p. 81.

convalescerit, imperato tamen in osiduum adhuc infusi usu (d).

D. *Chirurgus* nosocomii 26 annor. febre continua acuta epidemica prehensus die 7^{mo} delirat, & præter consveta morbi symptomata petechiæ rubræ profunde in cute hærentes aliquoties emergunt, abeuntque, nunquam ex toto emergentes. Die 17^{mo} oborta lenis diarrhœa cum symptomatum omnium levamine duravit ad 19^{um} morbi diem, quo sponte desit. Æger a 10^{mo} die Cortice decoctisqve emollientibus acidulatis usus in dies emendabatur. Die 20^{mo} pultacea alvo quinqvies reddita febris quievit, ægro sui magis compote. Die 21^{mo} meteorismum abdominis enema mota aliquoties alvo sopivit. Postero autem die subita ambos oculos invasit amaurosis cum celeri bulborum rotatione, tremore cum palpebrarum tum artuum omnium, continuaqve balbutie & corporis agitatione, pulsu parvo debili inæquali, minime febrili, inæquali spiratione; alvus & urina inscienti ægro abibant. Amplis nuchæ femoribusqve admotis vesicantibus præbetur infusi e fl. arnicæ 3 ℥ in 7^a lb. i. parati omni sesquihora vasculum, & 4^{ta} quaque

(d) Ibidem cas. 3. p. 85.

hora datur enema, quod, cum nil levaret, die 23^{ta} omiffum est. A prandio diei 23^{tie} bis monitus urinam reddidit saturatam, rubram, copiosum brevi ponentem enæorema, plurimis moleculis tenuis rasuræ auri instar refertum. Noctu minus agitated per brevia intervalla dormivit. Die 24^{ta} crurum agitatio quævit, minus simul trementibus artibus palpebrisque, minusque rotatis oculorum bulbis. At pupillæ nil mutatæ, nisi quod luce admota leviter contraherentur. Æger tamen sui magis compos, minus balbutiens, obsequentior, lectum nec alvo nec lotio polluit: urina multa, biliosa, frequens, sedimentum citum uberrimum cinereum dimisit. Sudor subinde lenis. Nox insequens bona, somno magnam partem transacta. Postero die & 6 consequentibus urinæ eadem. Tremor omnis, bulborumque rotatio desit: pupillæ arctiores ac mobiles: æger lucem famemque sentit. Intra octiduum, quo lotium copiosum fluxit, pristinus rediit visus. Inde in triduum adhuc infusum e fl. arnicæ ℥iij paratum imperabatur (e).

E. *Studiosus* 19 annor. post febris ejusdem petechialis diem 21 convalescens pau-

(e) Ibidem cas. 4. p. 87.

cis lapsis diebus mane quodam evigilans cæcus est. Frustra variis per 5 & amplius hebdomades usurpatis tandem præbetur fl. Arnicæ ʒß in ∇^æ ℥b. j. infusa. Unde triduo post oborti crebri in oculis dolores lancinantes, perforantes. Post 8 dies pupillæ, ante amplissimæ & ad lumen admotum immobiles, moveri jam, ægerqve lucem a tenebris discernere cœpit, rarioribus jam ac mitioribus factis oculorum doloribus. Infuso interpolatum 6^{to} quovis vel 8^{vo} die catharticum. Sicqve nondum exacto trimestri æger convaluit (*f*).

F. *Juveni* 20 annor. eadem e febre decumbenti post 14 diem videbatur morbus desisse; sed gravior paulo post recidiva secuta est, e qua post 20^{um} morbi diem convalescere cœpit, at hebetè cum visu, cui emendando analeptica sunt ordinata: cumqve a 5 jam diebus æger teneris carnibus aliisque eupeptis vesceretur, denuo cœpit febricitare, cum anorexia. Idcirco catharticum & antiphlogistica data. Triduo post præviis doloribus transversim per frontem lancinantibus uterqve oculus perfecta corripitur amaurosi. Post varia necquidquam per

(*f*) Ibidem cas. 5. p. 91.

7 dies adhibita, datum tandem infusum e flor. arnicæ $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ in ∇^x \mathfrak{lb} j. Postero die oborti dolores crebri, e fundo orbitæ antrorsum vergentes: quarto post die levis jam pupillis rediit motus cum obscuro visu, appetituque valido. Data eupepta, ac præter prius infusum etiam electuarius e \mathfrak{f} fl. arnicæ $\mathfrak{z}\mathfrak{iiij}$. c. mellis q. s. diei spatio absumendum. Horum sub usu dolores oculi post triduum abiere, & visus post 6 dies evasit insignis. Misso ergo electuario, solo tridui usu infusi continuato sanitas pristino cum visu revertit (g).

G. *Puella* 17 annor. hac ipsa febre superata dies aliquot subdelira mansit, ac circ. 24^{to} morbi die utriusque oculi amaurosi correpta est, ut lucem a tenebris discernere nequiret, sed mentis simul compos evasit. Cum nec consveta remedia, nec dein quatruiduo usurpatum infusum e fl. arnicæ $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ in ∇^x \mathfrak{lb} j. quidquam efficerent, demum dato electuario e \mathfrak{f} fl. arnicæ $\mathfrak{z}\mathfrak{iiij}$. cum melle postero die dolores, quales præcedens ægrotus percepit, oborti. Die altero & lucem ægra sensit, & pupillæ moveri cœptæ. Inde doloribus sensim remittentibus, visuque

(g) Ibidem cas. 6. p. 94.

increfcente puella intra menfem fanitatem priftino cum vifu eft adepta (*b*).

H. *Puellæ* 22 annor. poft 30 horar. febrem eryfipelas crus dextrum late infedit, qv od perperam tractatum in phlegmonem & & gangrænâ defuit, qva remota ulcus amplum enatum, hocqve non dum prorfus cicatrice obducto, fub diuturno licet cum corticis Peruv. tum aliorum antifepticorum ufu & applicatione, febris petechialis fupervenit, ex qva ad 17^{um} diem ægra vifa eft convalefcere. Sed paucis elapfis diebus poft levem vertiginem amaurofis oculos invafit. Poft 8 dies exhibitio cathartico præbetur infufum e flor. arnicæ $\text{℥}\text{ss}$ in ∇^x $\text{℔}\text{b. j.}$ Hujus fub ufu qvavis nocte dolores ex intervallis utrumqve pervadebant oculum, maximi in fundis orbitarum, ac fuperiore oculorum parte, inde verfus aures propagati, ibi fæviores fomnum omnem arcebant, ufqve dum interdiu prorfus conquieviffent: lacrymæ crebræ utroqve ex oculo manabant. Poft 4 dies pupillæ moveri cœptæ, ac vifus dextro primum, tum biduo poft lævo etiam, oculo cum viribus vitæ fenfim redibat, fimulqve dorfum digitos ac plantam dextri præfertim

(*b*) Ibidem caf. 7. p. 96.

pedis tumor pallidus elasticus infedit; ac postmodo nocturni dolores rarius mitiusque laceraverunt. Datum catharticum. Biduo post pupillis & motus & amplitudo nativa rediit, cum pristino oculi dextri visu, quem sinister lacrimosus adhuc nondum prorsus indeptus est. Iterata ergo catharsis. Hebdomade lapsa pes detumescebat, visus utriusque oculi optimus, vires optimæ; sed oculos noctu bis terve adhuc dolores, leniores tamen, molestabant. Post octiduum desit cephalalgia; at pedis tumor jam sic satis imminutus post 4 dies reverti cœpit, donec demum apertus saniem primum, tum pus præbuit; quo tandem confanato innumeræ pustulæ rubræ in crure a malleolis ad superiorem usque suræ partem effloruerunt: hisque brevi evanidis puella prorsus convaluit (i).

I. *Puella* 23 annor. post infantia variolas morbillosque ultra semestrem quotidie fere convellebatur; postmodo vero vehementi plurium dierum cephalæ, sæpe vexanti, obnoxia evasit, ob quam bis quotannis venam secabat, quo neglecto largam narium patiebatur hæmorrhagiam. Anno ætatis 15^{to} catamenia nacta est, quæ dein

(i) Ibidem cas. 8 p. 98.

quovis tantum trimestri per 5. 6. dies experiebatur. Anno 16^{to} erysipelas faciem infestare cœpit, per sexennium 3^a quaque hebdomade circ. reverti solitum, quod frigida farinae secales vel panis fumo aromatico imbutis cedebat. Anno 17^{mo} cum post validum tempore calido motum hausta affatim frigida præsentem mensium fluxum subito sistisset, paulo post scabiem nata est; sumptoque propterea purgante drastico in plurium dierum hypercatharsin, eaque cessante in asciten & anasarca incidit: quod utrumque sumptis per 5 hebdomades quotidie oxym. Colchici ℥ij. est profligatum, & demum roborantibus per 8 hebdomades usa puella convaleuit, reversis etiam catameniis. Deinceps etiam petechiali febre superata biennium adhuc erysipelas ei, ut ante, infestum erat, quo denique cessante cephalæa & crebrior fiebat, & sævior, adeo ut dolores tandem fierent continui, tempora frontem ac superiora occipitis tenentes. Unde visus minui cœpit, oculis multum lacrimantibus, lancinantesque dolores sentientibus, quævis anxia accessit spiratio cum crebra cordis palpitatione: his remittentibus mala capitis fiebant graviora, istisque mitigatis denuo anxietas cum palpitatione augebatur. Ab his demum omnibus visus ita interiit, ut non nisi obscu-

re lucem a tenebris discernere posset. Isthoc in statu post 7 hebdomales nosocomio receptam, emollientibusque & aperitivis cum antiphlogisticis utentem die 6^{to} pleuritis acuta cum graviore palpitationeprehendit, a qua methodo antiphlogistica liberata cephala nihilominus & amaurosis perstitit, oculi admodum subito lumine dolebant, pupillae interdum arctari parumper, at mox iterum diduci, alias vero nil mutari cernebantur. Præter serum lactis nitratum usa est infuso fl. arnicæ ad $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ in ∇^x lb. j. cujus a primis dosibus omnes canthos, in primis externos, tensivus & urens dolor invasit, alvusque quotidie quater quinqviesve reddita. Quarto post die pupillae arctiores mobiliioresque factæ, dolores lævi temporis, frontis, canthorum desierunt, omnesque functiones emendatæ, ipso etiam visu redeunte. Prosero lactis ob molestam subinde tussiculam datum decoctum Saleb cum nitro. Post 6 dies ambo oculi facti naturales, visu insigniter vigente, cephalæa prorsus conquievit, desinit tussis, cunctæque functiones erant secundum naturam, & ægra post 9 dies sana discessit (k). Binis itaque modis remedium hoc

(k) Ibidem cas. 9. p. 101.

Cl. Vir exhibuit, nempe forma vel infusi vel electuarii :

R. Flor. Arnicæ ʒ. j. ij. iiij. vel ʒʒ. inf. in
 ∇^a ferv. q. s. per $\frac{1}{2}$ h. vase clauso,

bulliant dein per $\frac{1}{8}$ h. vase clauso.

Colat. ꝥ j. adde syr. fl. chamom. vel
 capill. ven. ʒ j. vel q. s. ad gratiam. M. ab-
 sumatur nycthemeri spatio. Vel.

R. ♂ subtiliss. flor. Arnicæ ʒij. iiij.

Mellis q. s. F. elect. molle intra diem
 absumendum. Postmodo (1) in extracto quo-
 que hoc ipsum remedium eodem cum suc-
 cessu exhibuit sequenti in casu :

K. Puella 17 annor. semper sana, 15^{to}
 ætatis anno menses nata, iisdem ante sesqui-
 annum per 7 menses in carcere caruit,
 reversosque deinceps ante bimestre tandem
 iterum amisit; unde oculorum amaurosi pre-
 hensa vix lucem a tenebris dignovit: pupil-
 læ amplæ erant, immotæque, habitus cache-
 cticus, ac synciput leviter dolebat. Præmis-
 sa bidui catharsi per epicrasin, alvo inde vi-
 cies & porro mota, datum est extractum
 flor. Arnicæ ad ʒiiij in MR^a intra diem absu-
 mendum. Triduo post data per diem ejus-
 dem ʒʒ. Postero die puella objecta obscure

(1) Ibidem P. 5. S. 1. C. 1. append. cas. 5. p. 178.
 cer-

cernebat, lancinantes in orbitarum fundo bulbisque oculorum dolores aderant, pupillæ moveri arctarique cœptæ. Altero die catamenia erupere, biduoque parce fluxere. Sexto post die sumpto cathartico alvus copiose mota, vesperique pauci rursus menses erumpentes dimidio die fluxerunt. Post tri-duum integer adfuit visus; remedium tamen aliquot adhuc diebus continuandum imperabatur. Ex his jam omnibus liquet 1^{mo}) Omnes ægros cœcitate hac e febre petechiali fuisse mulctatos, præter primam postremamque puellam, quarum hæc a suppressis catameniis, illa ab ignota sibi causa, oculis captæ sunt: proinde in singulis, prima dempta, adfuisse intarctum vasorum a materia lenta viscida immeabili, qualem febres petechiales biliosæ post se in visceribus abdominis, ac præsertim hepate, nec non in vasis encephali debilitatis, relinquere solent, vel in qualem sanguis menstruorum suppressorum degenerare consuevit. 2^{do}) Rediturum visum prælagiunt dolores oculorum ac vicinorum ab remedio excitatos. Remedium hoc etiam a pluribus jam annis variis in morbis & ipsa quoque amaurosi solitus est præbere A. G. RICHTERUS (*m*), at in isthac impa-

(*m*) Chirurg. Biblioth. 2 B. 4 St. No 9. p. 83. sq.

ri plane cum successu: „ arnicam (inquit ille),
 „ quam tam mirabili & inaudito plane cum
 „ successu adhibuit Cel. COLLIN, ego sæ-
 „ pissime adhibui, ast sine ullo emolumen-
 „ to, quamvis magna satis dosi exhiberem
 „ illam, illiusque usum diu satis continua-
 „ rem. Bis illa iridi mobilitatem, oculo
 „ autem non sensibilitatem restituit „ (n).
 Perinde refert J. L. SCHMUCKER (o) in
 Regia Berolinensi invalidorum domo arnicæ
 juxta ac pulsatillæ nigric. tentamina sæpe ad-
 modum sine ullo fructu in amaurosi fuisse in-
 stituta, „ & nescio (subjicit), quisquamne
 „ uspiam, præterquam Vindobonæ, ullum
 „ ab his remediis effectum observaverit „?
 Imo vero! Eodem ipso anno 1779. quo
 SCHMUCKERUS incomparabiles suas de a-
 maurosi edidit observationes, prodiit simul
 Ill. E. G. BALDINGERI (p) observatio de
 arnicæ adversus amaurosin efficacia, nempe
 futoris uxor ad 58 annos nata, loturæ se-
 riceæ lineæque supellectilis operam locans,
 habitus cachectici, ultra 12 annos plicam

(n) Obs. chirurg. l. c. p. 86.

(o) l. c. p. 26.

(p) Neues Magazin für Aerzte 1 B. 3 St. p.
 203. fqq.

Polonicam (quam studiose celabat) capitis in latere antrorsum versus enatam gestavit, quam in primo suo exortu non illico observatam, exilemque adhuc, nescia quid rei esset, cum abscidisset, continuo cephalalgiam, vertiginem, aliaque symptomata experiri cœpit, & ubi plicam interea pristino illo loco denuo atque tantopere renatam, ut præ magnitudine infra capitis mitram omnis neqviret abdi (quippe quæ 3 circ. digitos crassa, & ultra sesqui ulnam longa, fuerit), iterum abscidisset, continuo in amaurosin incidit, visu ita pedetentim deficiente, ut non nisi majora corpora obscure discerneret. Caligo (quod mirum!), tertium licet plica loco priore succrescente, augebatur; jamque nova hæc plica $\frac{5}{4}$ ulnæ longa ac 2 digitos crassa erat, vehementem ac nauseosum, qualem sudoribus madentes capilli exhalant, foetorem spargens, capillis velut a crassa & fusca gelatina compactis, sine cuspidato in fasciculum definens crinium diremptu facilium, quos exsudans gelatina sibi mutuo sensim intricando plicam continenter efficiebat longiorem: simulque acrem se leucorrhœam pati ægra, cum opem rogaret, querebatur. Ex diæta ceterisque adjunctis probabilis erat conjectura, amaurosin a materia lenta ac viscida liberum fluidi nervei cerebrum inter

oculosque fluxum impediēte proficisci. Idcirco, præmissa catharsi, dedit Cl. Vir, quæ lentorem illum funderent, nempe pilulas e sale C.C. millepedib. sapone, gummi ammon., extr. taraxaci, &c. & his affinia: oculis extrinsecus adnota derivantia, puta cucurbitas scarificatas, hirudines, iterataque vesicantia. His vero nil proficientibus, Arnicæ, cui recens colligendæ tempus anni faverat, cujusque recentis cum sicca comparatæ vires sunt = 2:3, periculum fecit. Nimirum hauriebat ægra mane ac vesperti infusum e fl. Arnicæ rec. collector. ʒj. cui tria vascula theata fervidæ aquæ affundebantur. Inde nauseas primum, vehementes sanguinis motus, cephalalgiam, anxietates, &c. sensit; at brevi post facile toleratu evasit remedium, ut pro una deinceps infusione flor. recent. ultra ʒjss cum ʒj ficcatorum sumere liceret. Manifeste inde cæcitas imminui sensim cernebatur, atque ab ulteriore hujus remedii usu tantum oculis profecit, ut negotia sua rite peragere posset: quo obtento, cum plica inde nullatenus emendaretur, capta arnicæ tædio eidem valedixit. Cumque aliquo post tempore visum rursus obscurari sensisset, usu ejusdem remedii tolerabile sibi malum effecit. Atque hunc nobis casum Gottinga, non Vindobona, suppeditavit, spes-

que est fore, ut olim aliunde quoque commatis ejusdem historiæ ad nos perveniant. De Pulsatilla autem inferius (q) dicitur.

§. 80.

3. *Euphrasia*. Hanc ab omni retro ævo adversus vitia visus commendatam fuisse, inter omnes constat: „ tanta enim, inquit „ F. HILDANUS (r), euphrasiæ in imbecillitate visus vis est, atque efficacia, ut „ ejus usu septuagenarios quosdam propter „ vigiliis & studiis plurima amissum visum „ in decrepita ista ætate recuperasse obser- „ vaverim „. Ideo illam in pane potuque dabat; in potu recentem jubebat macerari, in pane vero daturus, euphrasiæ in umbra ficcatae pollinem cum pastæ fermento miscendum svasit, ut cum ea sic in panem excocta usurparetur. Perinde J. HOLLERIUS (s) „ dum effervescebat mustum (ait), euphrasia injicitur, vinum repurgatum affervatur „ singulari remedio. Ejusdem herbæ pulvis „ vis sorbili ovo inspergitur, aut inde sal

(q) Vide §. 84.

(r) Epist. 59. §. 2.

(s) De morb. intern. Cap. 20.

„ oxydorcicum paratur „. P. FORESTUS (t) puellæ decenni obscuritate visus laboranti continuum conservæ Euphrasiæ usum mire contulisse narrat. Magnam hæc ipsa planta partem constituit ophthalmicæ trageæ SCRE-TÆ, cujus formulam superius (u) videre est, atqve eadem tragea textori „ pauper-
 „ culo debilitate visus diu afflicto, sic ut
 „ nil vitii in oculis appareret, atqve adeo
 „ guttæ serenæ initium adesset, visus itidem
 „ restitutus „ teste R. LENTILIO (x). Multum quoque euphrasiæ virtuti tribuit L. HEISTERUS (y).

§. 81.

4. *Lignorum decoctum*, utpote valide incidens, attenuans, ac stimulus, perinde vaforum ophthalmicorum infarctum, ab humorum lentore ac debilitate solidorum oriundum, visum est interdum sustulisse, modo prius plenitudo vaforum fuerit, quoad oportet, imminuta. Sic „ a cœcitate ... li-

(t) l. c. L. 11. Obs. 35.

(u) Vide §. 60 No 6. d).

(x) Misc. med. pr. P. 1. p. 221.

(y) Med. chir. u. anat. Wahrnehm. 1 B. No 134.

„gni Indici decocto . . . vindicavimus J. A.
„COMITEM, cum aliquot mensibus parum
„aut nihil videret „ inquit H. CARDANUS (z). Præsertim vero decoctum hoc proficuum esse videtur in ea amaurosi tollenda, quæ ꝑ lem ptyalimum quandoque consequi solet, dum videlicet ptyalismi tempore humores ubertim ad caput ruentes ophthalmica vasa justo magis ampliando, tonumque eorum labefactando, sicque stases obtinendo, nervos opticos comprimunt. Usu tunc decocti lignorum vasa stimulantur, stagnantia loco moventur, &c. quemadmodum in R. LENTILII (a) casu liquido videre est, nempe viro ad 50 annos nato 15 ante annis vulnus a globo in dextram colli partem exploso, sedemque varie mutante, inflictum cum diu non coiret, illèque nullatenus educi, neque etiam citra obstipi capitis periculum excindi, posset, sibi demum relictum sponte coaluit, globo sensim ad imum colli nucham versus ita se se subducente, ut nec ab ægro sentiri nec digito tangi posset. Æger 13 annos nihil inde molestiæ tulit. At biennio abhinc cum Monaco domum tendens noctem

(z) Curat. admirand. 20.

(a) l. c. P. 3. p. 602. sqq.

facto in lecto transegisset, ex isto tempore immmani cephalæa cum totius corporis pruritu tentari cœpit, noctu in primis, cum lotio admodum tincto, at citra ullam sitim, pulsūqve febrilem, donec interdiu vel cessans vel mitior somnum admitteret. Dolor erat pungens, & a vertice in oculos tendens. Insequeunte A^o 1695 sub initium Februarii cephalæa reversa, alternis diebus usque ad Pentecosten dire vexabat, donec sponte iterum desinisset. Durante malo visus oculo dextro prorsus periit, circa IACOBI tamen festum postliminio plane reversus. Inde vespere diei 1^{mæ} Augusti homo domum redux in via repente in convulsiones horæ unius incidit, quæ post 20 hebdomades reversæ nonnisi $\frac{1}{4}$ horæ durarunt, ac 3^{io} post die mane hora 8^{va} repetentes octidui amentiam post se reliquere, & quamvis indies malum emendaretur, tamen post 14 dies atrocissima rursus ingruit cephalæa cum scotomia, amentia, ac plena denuo dextri oculi cœcitate, alternis quidem, ut ante, diebus repetens, at ea cum vehementia, ut ab occipite in encephalum irruendo oculos inflaret, viresque prosterneret, delirio continenter fere durante. Urina vinum Tyrolense æmulabatur, interdum profunde flava, crassa, ac jumentosa. Exactis ita 10 he-

bdomadis, visuque jam iterum oculo dextro aliquatenus reverso, cum post varia incassum tentata malum a lue venerea seu e fœdis lecti stragulis (seu forte ex impuro coitu) contracta profectum videretur, ad hydrargyrolin tandem est devenum, eaqve die 3^{tia} Aprilis 1696 administrata. Nimirum qvo vis mane dabatur ad magnitudinem castaneæ de sequenti Electuario;

R. Conf. Rosar. r. ℥jv.

℞ dulc. rite parat. ℥jv. M.

A meridie hora 3^{tia} fumebat gtt. xx TR^æ bezoard. in potus consveti cochl. j. Alternis vero diebus infricabatur sequentis unguenti genibus, carpis, ac spinæ dorsi, primum ℥℔, tum j. demum j℔:

R. ℞ viv. purif. ℥j.

Ungv. rosat. ℥iij.

°. lign. Rhod. ℥ij. M.

Nuchæ empl. de ranis VIGON. cum ℞^{io} applicatum. Potus ordinarius erat

R. Rad. Sarsap. ℥iij.

—— Chinæ ℥j.

Sem. Fœnic. ℥ij. conc. contus.

coq. in ∇^æ font. mens. vj ad

reman. mens. jv. D. U. Die 12^{ma} April. renuntiatur: cephalæam prima mox die ab usu electuarii ac TR^æ prorsus evanuisse, ptyalissimum vero non nisi post 3^{um} litum occer-

pisse, ac primum leniorem cum leni simul diarrhœa materiæ copiosæ olidissimæque, dein vero invaluisse eatenus, ut quovis nyct-
hemero ꝥ. jv sputorum alborum, foetidif-
simorumque cum integris quandoque muc-
massis contentis, rejicerentur: faciem gingi-
vasque mediocriter intumuisse; delirium sen-
sim decrevisse. Contra ea oculos sub ptya-
lismo, lævum præsertim, amblyopia affici,
auresque diu noctuque susurro molestari.
Idcirco die 16^{ta} April. omnibus in & exter-
nis remediis sepositis solum decoctum ante
dictum bibendum imperatum usque ad finem
ptyalismî: tum vero, ut decoctum sequens
prioris in locum ad ꝥꝥ quovis mane calide
hauriret in lecto, ad largum sudorem elici-
endum, quo per 14 dies factitato curæ finem
imponeret:

℞. Raf. lign. Gvajac. ℥jv.

— — — Sassafr. ℥j.

Cort. lign. Gvajac. ℥ij.

Rad. Sarsap. ℥ij.

— — — Chinæ ℥j.

℥ crudi, &

℥ viv. simul in pet. lig. ꝥꝥ.

Passul. min. ℥ij.

Sem. Fœnic. ℥ss. conc. con-
tus. affunde ∇^a font. mens. vj.

Coq. in olla nova, superlutato operculo,

igne digestionis ad consumpt. partis $\frac{1}{2}$ D.
Die 27^{ma} April. referebatur ptyalismus fini
esse proximus, eaqve propter sudori præ-
scripto aliquot jam dies vacatum esse eo cum
successu, ut æger & appeteret, & sic satis
valeret; at visum in dies usque adeo perire,
ut oculo lævo nihil prorsus, dextro vero
parum, ac in dies deterius æger videat, nec
sufurum aurium remittere. A biduo vero
ptyalismus non nihil reverti cum faucium
dolore ac raucedine insigni. Verum cum
e præscripto sudare pergeret æger, omnia
sensim evanuerunt, visu quoque in dies acutio-
re reddito, sic ut mense Junio pristina jam
sanitate gauderet, &c.

§. 82.

5. *Millepedes seu Aselli*, quorum effi-
cacia in malis oculorum HAENIUS (b) est
expertus, & J. L. SCHMUCKER (c) opta-
tissimo cum successu præbere consuevit per
aliquot hebdomades vacuo ventriculo mane
quovis succum ex 60 ad 80 milleped. cum vi-
ni Rhen. 3℥ contusis expressum cum juris vi-

(b) Vide §. 46.

(c) l. c. p. 18.

tulini calidi, insulsi, non pingvis, vasculis ij. hauriendum.

§. 83.

6. *Oleum Cajeput*, DIPPELII, & his affinia. „ Singularem efficaciam olei Cajeput nuper... expertus est D. D. TREW „ (d) in ægroto ex sævissima colica & cephalalgia subito cæco facta, usu vero interno hujus olei felicissime restituto „ Nempe (e) „ juvenis... 20 circ. annorum... „ corripiebatur... sub finem A. 1731 febris „ 3^{na}, quam more vulgi præter ordinem „ debitum & consilium debitum variis oppugnabat medicamentis, tandemque copioso electuarii cujusdam, sine dubio Peruviano cortice referti, usu supprimebat. „ Debilis adhuc patriam pedibus repetit; sed inclementia aeris pluviosi frigidique valde „ affectus colicæ tormina sentit; quæ in dies tantum cœperunt augmentum, ut huc „ ægre perveniens lecto statim affigeretur.

(d) *Commerc. Norimb.* T. 2. A. 1732. hebd. 2. No 3. p. 10.

(e) *Ibidem* T. 7. A. 1737. hebd. 24. §. 3. No 1. p. 187.

„ In consilium vocatus de morbo prægresso
 „ ejusque incongrua medicatione eqvidem
 „ cogitavi; sed morbi subsecuti vehemen-
 „ tia non permittebat, ut ejus rationem
 „ habere possem: dolores quippe ventris
 „ capitisque accedentes tantum sæviebant,
 „ ut miser altero statim die illico omnem
 „ visum perderet, ne lucem a tenebris am-
 „ plius dignoscere posset. Clysteribus &
 „ carminativis vulgo laudatis frustra adhibi-
 „ tis tandem ad oleum Cajeput confugio,
 „ cujus 4 vel 5 guttæ vix tertium cum fru-
 „ stulo sacchari exhibitæ tam stupendum e-
 „ debant effectum, ut non solum visus ple-
 „ narie rediret, sed etiam omnium dolorum
 „ sensus plane evanesceret. Adhibitis post-
 „ ea §^{bus} ex absorbentibus, nitro, atque
 „ cinnabarii §ⁱⁱ compositis, interpositisque
 „ leniter evacuantibus, valetudo eousque
 „ roborata fuit, ut hunc usque in diem pa-
 „ tiens salvus vegetusque supersit,, F.
 HOFFMANNI (f) „ puella 9 annor. ca-
 „ tarrhalibus defluxionibus, achoribus, tu-
 „ moribusque glandularum colli per totam
 „ vexata vitam, naribus aliquando præter
 „ morem siccis existentibus, corripitur ver-

„ tigne, & doloribus dorſi ac hypochon-
„ driorum tantis, ut accedente vomitu &
„ cephalalgia lectum petere cogeretur. Poſt
„ aliquot dies melius pauliſper habens libe-
„ ro ſe rurfus exponit aeri, qui tum erat
„ gelidiſſimus; ſed redux gravi vertigine,
„ tumore vultus, febricula, & purpura, mox
„ iterum retrocedente, afficitur. Haud mul-
„ to poſt gravi mentis commotione agitata
„ incidit in affectum epilepticum, ſub quo
„ dentes valide commordebat, oculi rige-
„ bant hiantes, ſenſus omnes erant aboliti,
„ & pulſus ferebatur vehemens & inæqua-
„ lis. Elapſa hora ab hoc paroxyſmo ad ſe
„ rediens, priuſ cœca erat, & inter ve-
„ hementes capitis dolores multum bilioſæ
„ ſaburræ vomitu reddebat. Inuſo clyſma-
„ te, atqve datis remediis antiſpaſmodicis
„ præcipitantibus, ac diapnoicis remitte-
„ bant & vomitus & dolores capitis, ſed
„ cœcitas eadem perſiſtebat per 4 dies,
„ quorum ſingulo ſupra citatus paroxyſmus
„ epilepticus revertebatur. Quum urgerent
„ inſuper continuæ vigiliæ, & dolores ve-
„ hementer recrudeſcerent, dabantur veſpe-
„ ri aliquot grana pilularum de cynogloſſa:
„ unde nox quiſetior ſecuta; & quum altero
„ mane ex inuſo theiformi olei Cajeputi
„ tantillum ſumeret, largo per totum cor-

pus perfundebatur sudore, & cum hoc subito recuperabat visum. Sed elapsa hora & redeunte cephalalgia cœcitas plenaria recurrebat; & altero demum die remittentibus cunctis doloribus & spasmis iterum redibat cum tam felici successu, ut ægra post 16 dies inter continuos sudores & visionem & sanitatem perfectam recuperaret.

§. 84.

7. *Pulsatilla nigricans* nunc ordine consideranda venit. Cl. J. de WELL, narrante Ill. A. de STÖRCK (g), sumpsit... plantam totam cum floribus, abjecta tamen radice, conscissam imposuit cucurbitæ vitreæ, & adfudit 8 partes ∇ æ fontanæ, & apposito capitello, adjunctoque excipulo ad balneum arenæ medietatem abstractit, hocque abstractum asservavit sub nomine ∇ æ destillatæ *Pulsat. nigricantis*: reliquum adhuc paulisper decoxit, herbam aliquantulum expressit, percolavit, & colaturam ad extracti mollioris consistentiam lenissimo calore fecit evaporari...

(g) Lib. de usu med. *Pulsatillæ nigric.* p. 9. sqq.

„ Confeci ex hoc extracto binos Æ es, pri-
 „ mum, qui leviozem extracti dosim conti-
 „ net, nominavi Æ^{em} A, secundum vero
 „ Æ^{em} B, qui duplam extracti dosim recipit.

„ R. Extr. Pulsat. nigr. gr. vij.

Sacch. albi 3j. M. F. Æ tenuissimus
 „ diu terendo in mortario marmoreo.

„ R. Extr. Pulsat. nigr. gr. xjv.

Sacch. albi 3j. M. F. Æ tenuissimus
 „ diu terendo in mortario marmoreo „. Ho-
 „ rum Æ^{um} usu Ill. Auctor. amaurosin sexies vi-
 „ dit curatam. Nempe „ puella 14 annor.
 „ amaurosi laborat in utroque oculo, &
 „ præter lumen confusum nil videt, pupil-
 „ læ sunt dilatatae, immobiles. Dantur ter
 „ quotidie gr. 15 Æ^{ris} A: (b) unde sensit in
 „ oculis validos dolores; 14^{to} die jam quæ-
 „ dam videre potuit, & pupillæ erant mo-
 „ biliore. Spatio binorum fere mensium
 „ visus integer rediit, pupillæ factæ sunt na-
 „ turales & optime mobiles. Hæc puella
 „ primis 3 septimanis ex usu hujus Æ^{ris} quo-
 „ tidie bis terve purgata fuit, nec tamen se
 „ debilem inde sensit; ceteroquin de nulla
 „ re conquerebatur „. Deinde (i) „ femina

(b) Ibid. Experim. 18. p. 36 sq.

(i) Ibid. Experim. 20. p. 38.

39 annor. a 14 annis amaurosi laboravit in oculo dextro, & sinister oculus eodem malo afficiebatur a sesquianno. Misera nil potuit videre, nec diem a nocte discernere, nec sola ambulare. Postquam multa adhibuisset remedia sine omni effectu, sumpsit tandem §^{em} A. Dolores validissimi dilacerantes, perterebrantes, & lancinantes in oculis a principio orti sunt, & cœperunt oculi vehementer plorare. Post 3 septimanas proruperunt menses copiosi, qui jam ab aliquot annis retinebantur. Post 6 circ. septimanas cœpit lumen clare distingvere, & pupillæ in utroque oculo fiebant mobiles. Qvinque nunc menses finiti sunt, quibus utitur hoc §^e, & oculo sinistro objecta videt, colores distingvit, & sola per plateas ambulat, dexter autem oculus male se habet, licet pupilla sit mobilior, & luminis sensus penetret; nullus autem color discernitur, nec figura objecti. Ulteriori autem usu hujus Pulv. speramus hunc quoque oculum bonum futurum, cum jam quædam in melius mutatio observetur. Ægra autem est quam contentissima, quoniam uno oculo videt, & sola ambulare potest. Menstruorum fluxus ipsi omni 3^a septimana redit; reliquæ corporis a-

„ etiones sunt quam sanissimæ „. Perinde (k)
„ femina 33 annor. primis diebus puerperii
„ summis in mamma dextra doloribus affi-
„ citur, mamma tumet, dura est, rubet.
„ Applicatis remediis dolor mammæ cessat,
„ rubedo disparet, durities emollitur, sed
„ mox vehementissimus dolor occupat au-
„ rem utramque, & altero die pus effluit
„ ex utroque meatu auditorio, & dolor re-
„ mittit. Hic puris fluxus durat per 5 dies,
„ & tunc sponte sistitur. Triduo post con-
„ queritur ægra de tensione in oculis; di-
„ cit se se objecta non rite videre: tandem
„ perit totus visus, & oritur amaurosis in
„ utroque oculo. Applicata vesicantia ad
„ nucham & post aures, data remedia pur-
„ gantia, aliaque derivantia, solventia, dis-
„ cutientia &c. nil levaminis adferunt, &
„ malum durat per 7 annos. Nunc sumit
„ per 3½ menses Pulv. A, & jam sola am-
„ bulat, & incipit objecta etiam minora
„ discernere. In principio magnos in ocu-
„ lis dolores ex usu hujus remedii passa est.
„ Menstruorum fluxus semper bonus & re-
„ gularis fuit „. Porro (l) „, mulier 43 an-

(k) Ibid. Experim. 21. p. 40.

(l) Ibid. Experim. 23. p. 42.

„ nor. ex partu difficili afficitur amaurosi
„ utriusque oculi, & jam a binis fere an-
„ nis nil videt. Exhibetur ei § A, qui in
„ principio ingentes in oculis dolores pro-
„ duxit; spatio autem 7 septimanarum tan-
„ tum boni præstitit, ut ægra jam rite per-
„ agat labores domesticos, & sola possit
„ per plateas incedere „. Alia (m) „ femina
„ 50 annor. ab aliquot annis laborat in oculo
„ dextro amaurosi, & in sinistro habet
„ cataractam. Nunc in 3^{um} mensem utitur
„ Pulv. A, & iris in oculo dextro fit mo-
„ bilis, & cataracta jam videtur multo te-
„ nuior, sed ægra nullam adhuc lucem per-
„ cipit „. Denique (n) „ vir 40 annor. ex
„ morbo acuto gravi admodum visum in
„ utroque oculo sensim amisit; in dextro
„ orta est amaurosis, & in sinistro glauco-
„ ma. Per aliquot annos utebatur variis
„ remediis, sed a nullo sensit in oculis le-
„ vamen. Per binos menses nunc sumit
„ Pulv. A, & glaucoma minuitur, iris in
„ oculo amaurotico mobilis fit, & æger
„ candelam vespertino tempore lucentem
„ distingvit „. Hactenus STÖRCK. Ve-

(m) Ibid. Experim. 32. p. 48.

(n) Ibid. Experim. 33. p. 48.

rum enim vero „ Pulsatillam a Cel. STÖR-
 „ CKIO adeo laudatam qvater inertem in-
 „ venit „ A. G. RICHTERUS (o)? Tan-
 tum abest, ut fidem Cl. Viri dictis non ha-
 beamus, ut multo potius credamus, pulsa-
 tillam haud fecius, ac alia qvævis adver-
 sus amaurosin commendata præsidia sæpenu-
 mero sine ullo successu præberi; id quod ne-
 ipse quidem Ill. STÖRCKIUS in paulo ante
 allato feminæ 50 annor. casu dissimulandum
 voluit. Interea tamen probe animadverten-
 dum est, pulsatillam in seqviore præsertim
 sexu, ac vel maxime amaurosi a mensium
 anomaliis vel proficiscente vel diuturnitatem
 nacta, proficuum esse, ut qvæ sæpius capto
 a nobis experimento summe emenagoga sit
 observata. Motis proinde catameniis (p)
 multum momenti ad curationem amauroseos
 haud raro obtinetur. Id ipsum sua in pulsa-
 tillâ ipse etiam oculatus observator STÖRCK
 (q) detexerat „ qvibusdam feminis (inqui-
 „ ens) fluxum menstruum præternaturaliter
 „ suppressum Pulsatilla nigricans iterum ex-
 „ citat, & redigit in ordinem „: quando-

(o) l. c. p. 86.

(p) Vide §. 70.

(q) l. c. Coroll. II. p. 56.

quidem observavit sub usu hujus remedii menses non suppressos tempore periodi solito uberius manasse (*r*), aliis vero a pluribus jam annis suppressos auspicato reversiones fuisse (*s*). Non ubique ergo pulsatilla suas exserit vires, sed ea tantum in amaurosi, cui infarctus humorum lentorum ad ophthalmica vasa incuneatorum post febres, aut catamenia suppressa, vel alium casum, originem præbuit; hujusmodi certe in casibus pulsatilla virtute sua potenter incidente lentorem, fibrasque atonas stimulante (modo nervis opticis non omne prorsus robur sit extinctum) optimam sanationis spem pollicetur.

§. 85.

8. *Sulphur* ☉ ꝑ ii, *Cinnabaris.* „ Quando „ malum valde est inveteratum, ait F. HOFF- „ MANNUS (*t*), & a lymphæ pertinaci in „ vasis nervos opticos cingentibus stagna- „ tione sustentatur; præmissis iis, quæ pro- „ posuimus, unica spes in validioribus dif- „ cutientibus, iisque potissimum internis,

(*r*) Ibid. Experim. 1. 3. 12. 20.

(*s*) Ibid. Experim. 20. 22.

(*t*) l. c. thes. therap. §. 5.

„ est sita. Qvo nomine bina præsertim re-
 „ media reliquis palmam præripiunt, qvo-
 „ rum unum est *Sulphur* & ii pro nostra me-
 „ thodo correctum, alterum *Cinnabaris*. Con-
 „ fici ex his potest seqvens pulvillus:

R. Cinnab. nativæ pptæ.

Lap. 69.

Succini ppti. aa 3ij.

Sal. volat. succini

———— C. C. aa gr. x. M. F.

„ Pulv. dividendus in xij partes, quarum
 „ singulæ 3 vel 4 Sulph. & ii grana addi
 „ possunt. Exhibetur pulvillus talis quavis
 „ vespera; hauritur sequenti mane infusum,
 „ quod ex herba melissæ, semine fœniculi,
 „ & radice Valerianæ conficitur. Interponi
 „ etiam debent laxantia, jungi victus tenuis
 „ & exsiccans, & subjungi balsamica „

§. 86.

9. *Valerianæ* filv. radix ad amaurosin a
 spasmus, quos terror, vermes, &c. concit-
 tant, oriundam eximie prorsus est efficaciam.
 „ Puero 4 annor. qui intra 4 dies visum,
 „ integrum ante, amiserat, purgante ant-
 „ helmintico (abdomine scilicet tumido, si-
 „ gnisque vermium abdominalium simul la-
 „ borabat), quod magnam lumbricorum co-

„piam expulit, exhibito, & usu radicis
 „Valerianæ per 8 dies continuato visum re-
 „stituit „A. G. RICHTERUS (u). „Femi-
 „na quædam (narrat idem) 4^{ta} puerperii fe-
 „licis hebdomade aspectu filioli e mensa in
 „terram prolabentis, fracturaque ossis hu-
 „meri affecti, subito perterrefacta intra pau-
 „cos dies visum penitus perdidit. Post 3
 „hebdomades me adiit, auxilium petens.
 „Post remedium purgans exhibui ter de die
 „scrupulum radicis Valerianæ, cujus ope
 „intra 8 dies penitus convaluit „(x).

§. 87.

10. *Vinum*. Hujus quoque insignem effi-
 cacious in se ipso olim L. S. GRASSIUS (y)
 est expertus. Qui cum præceps ex eqvo
 concitato lapsus omnium sensuum expers ali-
 quamdium exstitisset, sibi demum redditus o-
 culum dextrum clausum immobilemque ob-
 servavit: levata manu palpebra pupilla tri-
 plo erat major, objectaque velut per spissis-
 simam nebulam confusa apparebant. His ver-

(u) l. c. p. 74.

(x) Ibidem p. 78.

(y) Misc. nat. cur. dec. 1, ann. 1, obs. 71.

tigo simul ac proclivitas in somnum, præsertim si clauso oculo sano solus affectus ad videndum adhibebatur, & dolor crotaphitis dextri, jungebantur. Quæ tamen universa sensim desiere, præter paralyfin palpebræ & amaurosin ad omnia rebellem, usque dum post 7 circ. hebdomades hausto primum liberalius vino, ac dein curru vectus, dormitandoque agitatus, somno demum excusso palpebræ paralyfin observasset imminutam, quæ paucis post diebus prorsus demum evanuit, superstite adhuc oculi immobilitate, cujus pupilla versus canthum externum erat sita. Objecta quæque apparebant duplicia, ita ut, si quid rite visu foret dignoscendum, alter oculus manu claudendus fuerit, alioquin aut pes aut manus a proposito scopo aberrabat, nisi visibilia dextrorsum constituta essent, ut pupilla sana sequeretur immobilem. Tandem tamen paucis post hebdomadis istud etiam vitium sensim abiit, relicta solum post se aliqua pupillæ dextræ amplitudine cum visu, qui acutissimus ante fuit, obscuriore, ut ad minutiora objecta, ad nocturnæ præsertim lampadis lumen, usurpanda conspiciillis opus fuerit; dissita vero objecta, quo remotiora, eo promptius perfectiusque hoc oculo conspiciebantur, ut ne acutissimo quidem visui clariora apparerent.

§ 88.

Præter huc usque recensita complura etiam alia ex amplissima cardiacorum stimulantium classe aliis se se probarunt, ut moschus & oleum animale DIPPÉLII (z), &c. & quæ suis in ægris proficua viderunt CHOMÉL (a), CLAUDERUS (b), GOCKELIUS (c), PANAROLUS (d), RIEDLINUS (e), WINCLERUS (f), &c.

C A P U T IX.

R O B O R A N T I A.

§. 89.

ROBORANTIA denique supersunt memoranda. Horum in amauroseos curatione

(z) WARNER, a descript. on the humain Eye.
LIEUTAUD synopsis. univ. prax. med. P. I
L. 2. S. 2. p. m. 351.

(a) Vide §. 36. c).

(b) Vide §. 57. No 1.

(c) Vide §. 40.

(d) Vide §. 39. h).

(e) Ibidem b).

(f) Vide §. 68.

multifaria est cum necessitas tum etiam utilitas. Etenim ubi laxitas vasorum, præsertim ophthalmicorum, præsto est (g), infarctum a lentis in primis humoribus ex facili admittens vel fovens, usu roborantium erit emendanda. Idem est de vera solidorum debilitate, ab humorum bonorum jactura aut aliunde profecta. „ Amaurosim ex nimia „ venere, generatam tardiori spirituum fluxu vel eorum defectu, aliquoties curavit GORTERUS (h) roborantibus internis, & nasalibus cephalicis, leniter stimulantibus externis, ut major spirituum fluxus fiat versus nervos opticos,, Tum etiam roborantium usum maximopere exposcit nimia hysteriarum & hypochondriacorum vi mobilissimi sui systematis nervosi ad spasmos, a quævis sæpenumero amaurosis (i) inducitur, proclivitas. Ac denique omnes nervorum morbi amaurosin facile post se trahentes, v. g. febres intermittentes, epilepsia, paralytis, colica, &c. usum horum remediorum exigunt. Ex omni autem roborantium penu spectatissimæ virtutis dictum

(g) Vide §. 27. No 3.

(h) De perspirat. insens. p. 514. sq.

(i) Vide §. 27 No 5. & §. 40.

in finem bina præsertim se se hic remedia commendant, nempe

§. 90.

Cortex Peruvianus & Mars. RICHTERUS (k) quidem „ fontes martiales Pyrmon-
„ tanos, ad quos confugiunt plurimi ægro-
„ torum, plerumque nocuisse observavit „;
sed hæc Cl. Viri dicta a nemine perperam
sunt accipienda; nam obesse has aquas sæ-
penumero posse in confesso est, si contra,
quam oportet, usurpentur, v. g. mox ini-
tio morbi, infarctu vasorum non dum subla-
to, &c. Legitimum autem martialium in pau-
lo ante memoratis indicationibus usum haud
raro spei ægrotorum respondere, observa-
tiones arguunt. V. RIEDLINI (l) vir-
go nubilis desiderio viri in febrem chloroti-
cam mensiumque suppressionem lapsa est cum
tanta dextri oculi obscuratione, ut aliquot
dies nihil pene illo videret, maculasque in
eodem pateretur. His unguento illito dif-
cussis, cæcitas nullis cedebat remediis;
donec, post præmissum martis usum ac de-

(k) l. c. p. 87.

(l) Curar. med. millenar. No 852.

mum catharticum, Væ Sc in pede facta re-
 versi paulo post menses oculo dextro visum
 pristinum reddidere. At neglecto ulteriore
 usu remediorum paucis post hebdomadis,
 subsistentibus denuo catameniis, non modo
 dextro oculo visus, ut ante, periit, sed sini-
 stro quoque minui cœpit: promotis vero mar-
 tialium usu mensibus utrique oculo videndi
 facultas est restituta. M. A. WEIKARD (m)
 narrat virum post morbum acutum omnibus ar-
 tubus per quam debilitatum, sensuumque im-
 becillitatem haud exiguum præ se ferentem vi-
 su insuper usque adeo fuisse destitutum, ut cum
 uno oculo nil prorsus videret, altero aliquid
 tantum lucis persenserit. Qui tamen tantum
 ab aquæ Brückenaviensis usu profecit, ut opifi-
 cio suo aliquantisper vacare potuerit. Qan-
 ta porro cum utilitate martialia cortici Peru-
 viano juncta similibus in occasionibus præ-
 beantur, docet sequens A. HALLERI (n)
 casus: „vir... sexagenarius dudum variis
 „ægrimoniis conflictatus, rheumatismo, tu-

(m) Neuere Nachricht von dem bey Brückenau
 im Fuldischen gelegenen Gesundbrunnen §. 89.
 p. 128.

(n) Opusc. pathol. Obs. 76. p. 197.

moribus artuum, & hydropis indiciis, sanguine, ut videbatur, dissoluto, post usum feri lactis, quod vehementer alvum moverat, subito oculi dextri usum amisit, ut neque alba neque rubra videret, neque ullius corporis figuram perciperet, lucis tamen & umbræ sensum retineret, & aliquem perobscurum sensum objectorum. Advocatus reperi urinam turbidam, subviridem, feri lactis non dissimilem, pulsum lentissimum, digestionem ciborum malam, plurimos flatus, hinc turbatum somnum, oculum, qualem dixi, ut tamen motus iridis superesset, rheumatismum, vesicatorio furis admoto circumjectos circulos sublividos. Acrimoniam humorum priores Medici accusabant: inde alvum ducentibus, refrigerantibus, edulcorantibus medicamentis fere utebantur. Mihi visum est, radicem morbi esse in debilitata ciborum coctione, vique vitali diminuta. Vesicatorium continuo rejeci, alia ad aures admovi, ne in corpore cacochyimo cruris ulcera in periculum ducerent. Corticem Peruvianum & martis limaturam præscripsi, diætam bonam facilisque coctionis svasi. His simplicissimis remediis paulatim oculus restitutus est, ut cum ope convexi vitri Vir Ill. legat;

„ fed etiam vires corporis & coctio ciborum
„ ita redierunt, ut dudum non integrior ei
„ fuerit valetudo, pulsusque non paucos
„ in quoque horæ minuto recuperaret. Rheu-
„ matismus & ipse paulatim evanuit, & mens
„ ad melancholiam & desponsionem procli-
„ vis ad priorem lætitiā rediit. Notabile
„ est, diu virum neque albi coloris neque
„ rubri sensum habuisse, cum haberet viri-
„ dis aut cœrulei „. Insignis quoque effi-
caciæ est Cortex in debellanda amaurosi post
febres putridas a debilitate vasorum oph-
thalmicorum infarctum superare haud valen-
tium oborta, quam N. RIGLER (o) „ post
„ morbum putridum debellatum vidit in...
„ milite 30 annor. cholericæ temperamenti,
„ qui in nosocomio Grodjicensi morbo hoc
„ putrido decubuerat sine exanthematibus.
„ Hic morbi die 21^{mo} diarrhœa perfecte ju-
„ dicatus est, ita ut 28^{vo} die ablegaretur
„ ad reconvaléscentium cubile: redibant
„ sensim vires, accessit bulimus, cui tamen
„ viriliter obstitit, noctu bene dormiit, al-
„ vum quotidie consistentem pultaceam de-
„ posuit, non febricitabat, ipseque bene
„ se valere dicens exitum ex nosocomio

(o) Constit. epidem. A. 1775, sqq. §. 65. p. 117. sq.

„ postulavit. Verum die 34^{to}, a quo in
„ nosocomio erat, conquerebatur de debi-
„ litate ac caligine oculi dextri, de sensu
„ telæ aranæ circa oculum obvolitantis, &
„ ante omnia objecta expansæ. Oculus
„ examini subiectus nullum exhibebat vi-
„ tium, pupilla erat naturalis amplitudinis,
„ immobilis, sanæ similis, bene colorata;
„ die 37^{mo} nihil se cum oculo videre la-
„ chrymans conquiritur: nullum denuo vi-
„ tium in oculo deprehenditur; pupilla vi-
„ vidæ luci exposita se se non constringe-
„ bat... Præmisso... purgante antiphlogi-
„ stico, vasis relaxatis robur amissum resti-
„ tuere annisus est. Ea propter interne cor-
„ ticem Peruv. cum rad. Valerian. silv. ex-
„ hibuit, pro potu vero aquam fontanam
„ cum pauxillo vini, externe lintea octies
„ complicata omni horæ $\frac{1}{4}$ renovata fronti
„ & temporibus apposuit. Sic, quo magis
„ æger ad sanitatem rediit, quoque plures
„ recuperavit vires, eo magis imminueba-
„ tur amaurosis, ita ut his solis usus reme-
„ diis binos post menses æque valentem ha-
„ beret hunc oculum ac sinistrum,,. Porro
in amblyopia & amaurosi hypochondriaco-
rum hystericarumque a debilitate systematis
nervei oriunda perinde auspiciato præbetur

cortex Peruvianus. M. I. MARXII (p) „ li-
 „ teratus hypochondriacus consistentis æta-
 „ tis, diu noctuque legens ac scribens, cœ-
 „ na plenior sine exercitio corporis ute-
 „ batur. Hic myops redditus vitra conca-
 „ va in usum trahit, sed de die in diem
 „ se minus per vitra videre percipit; vera
 „ dein cœcitas accedebat. Medicus qui-
 „ dem Væ Sem, purgantia, vesicatoria, o-
 „ mnisque generis revellentia præscripsit,
 „ sed incassum omnia: tandem febris inter-
 „ mittente superveniente largiter utebatur
 „ cortice Peruviano aliisque roborantibus.
 „ Visus restitutus est. Altero anno cœci-
 „ tas redibat, quæ iterum cortice Peruvia-
 „ no, roborantibusque aliis, atque exerci-
 „ tio corporis, tollebatur „. In primis ve-
 ro cortex Peruvianus ad febrem intermit-
 tentem, cui tempore paroxysmi amaurosis se
 jungit, vel quæ sub amauroseos larva deli-
 tescit, profligandam valet. „ Erat, referen-
 „ te Ill. A. STÖRCK (q), in nosocomio vir,
 „ qui quotidie hora 4^{ta} pomeridiana visum
 „ subito, absque ullo præcedente signo aut
 „ dolore, amisit, & perfecta amaurosi affe-

(p) Obs. med. P. I. p. 115. sq.

(q) Ann. med. I. p. 75. sq.

ctus est; ceteroquin sanus fuit, nec unquam pulsum naturali celeriore habuit: post binas horas demum visus iterum subito rediit. Postquam igitur per octiduum determinata hora accedere, & abire amaurosin observavi, tunc omni trihorio 3j corticis Peruviani exhibui, & hac ratione intra 24 horas æger perfecte curatus est,,. Porro BERTRANDI (r) virginem 18 annor. die 23^a Febr. 1758 cum fluxu mensium solito tempore revertente 3^{ua} simul corripuit: catamenia parcius, quam alias, manarunt, diebusque apyretis ægra minus recte valebat, paroxysmorum vehementia semper incrementum. Idcirco die 3^{tio} paroxysmico ob cephalalgiam, imminutosque menses, Væ So in pede facta, ac post noctem quietam postero mane, uti & ejus diei vespere ob durum adhuc plenumque pulsum iterata; diætâ curatissima præscripta, tenui tantum carniû jure ac decocto humectante leviterque aperiente concesso; porro 3^{tia} quavis hora injectum enema. Frigus 4^{ta} invasionis 3 horas duravit, calore secuto mitiore, quam qui 3^{tio} in paroxysmo adfuit. Obrepsit demum somnus per $\frac{1}{4}$ horæ, quo ex-

(r) VANDERMONDE Journ. de Medec. &c. T. 9.

cusso ægra ita se cœcam animadvertit, ut cum cerei accensi oculisque prope admoti calorem sentiret, lumen nullatenus senserit. Pupilla admodum fuit diffusa, insigniter tamen mobilis; pulsus vero ob visus amissi terrorem hystericarum more valde contractus, qui tamen concepta visus recuperandi spe de novo evolutus est, febre inde vehementius, quam unquam antea, emicante, quæ ubi 6^{ta} demum vespertina conquievit, visus pedetentim revertebatur. Enemata noctu multum operata sunt. Mane diei apyreti data binis in aquæ vasculis \square ri emet. gr. jv quinquies aut sexies vomitum causerunt, quo sopito datæ mannæ ζ ij alvum copiose subduxere, nocte tranquilla consecuta. Ab his 5^{ta} invasio fuit mitior, cum exigua & non diuturna visus imminutione. Postero die cortex Peruv. cum rheo dari cœptus, eo cum successu, ut febris 6^{tæ} accessionis levissima fuerit, virgoque ejus sub usu 6^{to} post die domo prodierit. Demum ut superata febre viribusque resectis imminuti nunc menses postliminio rite prodirent, cortici & rheo aliquid e limatura σ additum, quo remedio ad proximam usque lunarem periodum usurpato menses 23^{ta} Martii erupere, virgoque viribus recuperatis sana abhinc vixit. Alteriusne indolis fuit amaurosis periodica, ad

corticis Peruv. usum deterior, cujus „ me-
„ morabile ... exemplum ... RICHTERO
„ (s) occurrit? Vir 50 annor. procerus,
„ obesus, strenuus potator, vitæ sedentariæ
„ addictus, alternis diebus oculorum hebe-
„ tudine corripitur. Mane hora 7^{ma} circ.
„ nebula sensim ante oculos coit, sensim-
„ que tam crassa fit, ut omnia objecta invol-
„ vat quasi, parumque æger distingvat. Per
„ totum diem noctemque nebula hæc affli-
„ git, altero mane, dum expergiscitur æger,
„ abest, jamque per totum diem bene satis
„ & distincte æger videt. Tertio die mane
„ eadem fere hora eodemque modo nebula
„ iterum ingruit, idemque tempus durat,
„ 4^{to} dein die mane evanescens. Periodi-
„ co hoc morbo æger, dum me adiit, jam
„ per annum fere laborat, ita tamen, ut
„ incretceret sensim morbus adeo, ut jam
„ jam diebus malis penitus fere cæcus esset.
„ Nil vitii in oculo detexi, purissima erat
„ pupilla, mobilisque absente æque ac præ-
„ sente nebula. Rigor tamen, obtutus
„ fixus, & difficultas movendi bulbum ocu-
„ li, dum nebula aderat, observabatur. Be-
„ ne valebat æger eodem modo quovis die.

„ Id vero quilibet morbi paroxysmus singu-
„ lare habebat, ut increfceret fenfim, de-
„ crefceretqve fubinde nebula, donec fini-
„ to paroxysmo penitus evanefceret, quod
„ quidem aliquando fubito factum eft, ita
„ ut æger prandens e. g. difficulter cibos
„ prehenderet, parumqve videret, fubito
„ & uno quafi momento vifum recuperaret.
„ Salia folventia leniterqve laxantia per 14
„ dies fumenda præfcripti, quo quidem tem-
„ pore morbus ne minimum quidem muta-
„ tus eft. Tandem ad corticem Peruvia-
„ num confugiendum effe duxi, qui quidem
„ adeo pejorem morbum reddidit, ut jam
„ quivis paroxysmus 2 dies duraret, 3^{us}
„ tantum quilibet dies a morbo liber effet.
„ Abftinui itaqve, & oleum Cajeput, ani-
„ male DIPPELII, aliaqve fimilia tentavi,
„ aft peffimo cum effectû; morbus enim lu-
„ culenter pejor inde factus, æger foporo-
„ fus; obliviofus, ftupidus evalit, ut ha-
„ berem, cur apoplexiam metuerem. Ver-
„ bo, quidquid tentavi, nil profuit, in-
„ crevit morbus fenfim, nullusqve dubito
„ fore, ut tandem vera amaurofis oriatur,,.
Habent hic Pathologi eximium profecto ca-
fum, in quo fua fatigent ingenia.

S E C T I O II.

CHIRURGICA REMEDIA.

C A P U T I.

S A N G V I N I S M I S S I O.

§. 91.

SANGVINIS *missio*, ubi vasorum ophthalmicorum infarctus, vel humorum in encephalo congestio, amaurosin produxit, debite instituta tanti saepe est effectus, ut citra omnia alia remedia morbum vel prorsus vel certe magna ejus parte tollere sit observata. Sic novit GUERIN (t) rusticum, quolibet vere amaurosin pati solitum, quam una alterave phlebotomia semper profligabat. Perinde RICHTERI (u) pistori secta in pede vena continuo visus aliquatenus rediit. Ut autem remedium tam efficax rite administretur, operæ pretium erit nonnulla circa illud planius & enucleatius in gratiam tironum pertractare, ut sunt 1^{mo} Indicantia, 2^{do})

(t) l. c. p. 241.

(u) Vide §. 68.

Contraindicantia, 3^{tio}) Quantitas sanguinis detrahendi, 4^{to}) Selectus vasorum tundendorum, modusque sanguinem educendi.

§. 92.

1. *Indicant* missionem sanguinis omnia ea, quæ plenitudinem & infarctum vasorum adesse arguunt, & quæ revellendos esse a capite humores svadent. Proinde si causæ, quæ humores versus encephalon congerere solent, præcessere, si plethoræ adsunt indicia, si turgentis humoribus encephali signa habentur (ut vertigo, aurium tinnitus, rubor faciei vel oculorum, pulsatio, æstus, sopor, inflatio vasorum, &c.), satis liquet, sanguini demendo locum esse.

§. 93.

2. *Vetant* e contrario pauca admodum remedii hujus usum, eaque fere sunt vel subjecta hysterica aut hypochondriaca, in quæis nullum ferme prius dictorum indicantium reperitur, & quæ omne evacuationis genus lædere consuevit, vel causæ procatacticæ prægressæ nullatenus missionem sanguinis poscentes (ut nervus opticus durus, extenuatus, &c. narcotica assumpta, ver-

mes, & his affinia), aut plane inde augenda, ut est præsertim defectus humoris boni post longos morbos, inediam, vigiliis, venerationem immoderatam. Verum tamen haud omnis evacuatio humoris sani amaurosin causans missioni sanguinis refragatur, ut quæ sæpenumero humorum versus caput congestionem, indeque amaurosin producere observetur, id quod ipsis sanguinis missionibus præsertim solenne esse vidimus (x): atque hocce in casu mittere sanguinem oportet, quemadmodum FONTANI (y) in ægro utiliter est factum. Eodem prorsus modo altera istum Væ So a morbo, quem prior facta causarat, liberavit, quemadmodum Religioso MAYERI (z) a cathartico ꝯ li occæcato id ipsum remedium denuo datum visum pristinum restituit.

§. 94.

3. *Selectus* porro *venarum* in amaurosi præprimis ultra, quam credi potest, ab experientia commendatur. Utilis quippe ob-

(x) Vide §. 39. a).

(y) Ibidem.

(z) Vide §. 63.

fervata est phlebotomia aut scarificatio frequentium præsertim locorum:

a) *Frontis*. Etenim „ ego (inquit A. „ SPIGELIUS (a), nonnunquam, nec si- „ ne fructu, in ea cœcitatis specie, quam „ Barbari guttam ferenam appellant, me- „ diam frontis venam pertundo, ex qua „ sangvinem eo usque deduco, donec sua „ sponte fluere cessaverit,,. SPIGELIUM „ haud dubie imitatus „ Judæus Medicus Bur- „ digale plures sanabat secta vena frontis, „ & effluxum sanguinis permittendo, usque „ quo sponte sisteretur,, teste SAUVAGES (b). Phlebotomiæ huic multum tribuit F. HOFFMANNUS (c) dicens: „ si a sanguinis „ stagnatione ortum sit malum, uti fit in „ plethoricis florida & rubicunda facie pul- „ suque magno præditis, & excretionum „ sangvinearum retentione laborantibus, ... „ a sanguinis... missione inchoanda mede- „ la. Utilis hoc sine est Væ So in pede; „ sed longe utilior incisio venarum frontis „ aut arteriarum temporalium. Et hoc qui- „ dem præsidium ipsa docuisse videtur natu-

(a) l. c.

(b) l. c. No. 4. p. m. 291.

(c) l. c. thes. therap. §. 3.

„ ra; siquidem exemplis confirmatum habemus, cœcos ex vulnere fronti inflicto, & hinc sequuta larga hæmorrhagia, visum recuperasse,, (d). Quorsum forte CNEULINI etiam apud J. SCHENCKIUM (e) observatio pertinet: „ sæpius audivi (ait ille) „ a D. ANDERNACO, se habuisse famulum Parisiis cataracta laborantem. Ille „ cum vehementius in D. OMPHALINUM „ & STURMIUM ... atque D. SYMPHACINUM ... inveheretur, alter ex illis „ gladio districto vulnus ei super frontem inflixit, ex quo statim visum recepit... integrum,,. Veri autem est similis, e tam cita curatione, hominem non cataracta sed amaurosi laborasse. Neque vero quisquam se se, quod BONETI (f) rusticus inde visum amiserit, ab administranda hac phlebotomia absterri patiatur; secus & ab emeticis, catharticis, ipsaque brachii phlebotomia abstinendum foret, a quævis singulis perinde amaurosis nasci aliquando est observata (g).

(d) Vide §. 110.

(e) Obs. med. L. 1. f. m. 159.

(f) Vide §. 39. a).

(g) Vide ibidem a) b) c).

b) *Narium*. „ Neque alienum est...
 „ inquit F. HOFFMANNUS (b) , si sup-
 „ pressa fuerit narium hæmorrhagia , has in-
 „ truso stilo pertundere , ut cita & efficax
 „ fiat sanguinis ventilatio „. Alluserit pro-
 cul dubio isthic Cl. Auctor ad observationem
 in G. H. VELSCHIO (i) repertam in hæc
 verba: „ virum ex ophthalmia cæcum red-
 „ ditum curatum vidit ab empyrico SLEGÉ-
 „ LIUS Væ Se in summis narium radicibus,
 „ juxta oculi canthum , parvo instrumento
 „ naribus indito , administrata , & sanguine
 „ ad 4 uncias extracto , quatrinduo integro
 „ fasciis obvestiendo „. Et vero si errhina
 mucum e naribus uberius prolicientia , qua-
 tenus proxima sic depletur vasa , in amau-
 rosi proficua sunt (k) , quid ni & ipsa vena-
 rum intra nares reclusio ?

c) *Juguli*. Sectioni venarum jugularium,
 quod & parti affectæ sint vicinæ , & pleno
 ex iis alveo celeri cum depletione vasorum
 ophthalmicorum sanguis educi queat , ma-
 ximopere confidit J. L. SCHMUCKER (l).

(b) l. c.

(i) Obs. med. epigram. 18.

(k) Vide §. 101.

(l) Vide §. 66. No 1.

d) *Brachii*. Qværi hic posset, basilicamne præ cephalica vena tundere sit præstabilius? Superius (m) allatæ observationes legenti dubii quid injicere possent; quandoquidem RUMLERI civi, ac viro FONTANI vena cephalica incisa amaurosin conscivit, quam tusa posteriori ægro basilica denovo profligavit. Sed nolim ego e binis tantummodo his casibus quidquam arguere, posterorumque attentioni id totum relinquo. Interea tamen „apud nos, inquit P. ROM-
 „ MELIUS (n) communis opinio (non au-
 „ deo dicere error) viget, a sectione venæ
 „ cephalicæ dictæ, quæ inter pollicem &
 „ indicem manus est, visum diminui, cœ-
 „ citatemque induci posse, plures etiam ju-
 „ rato affirmantes audivi, post missionem
 „ sanguinis ex hac vena, visum illorum ma-
 „ xime imminutum & obtusiores redditum
 „ esse, idque non semel se observasse, sed
 „ toties, quoties scilicet hanc venam incidi
 „ curassent, accidisse „.

e) *Pedis* denique phlebotomia perinde-
 haud exigui in amaurosi curanda est usus,
 tum quod a capite humores ad remotissimas

(m) Vide §. 39. a).

(n) Misc. nat. cur. dec. 2. ann. 5. obs. 144.

derivet partes, tum præsertim, quod catameniiis lochiisqve imminutis aut suppressis, a quævis haud raro morbus hic enascitur, revocandis sit longe efficacissima, velut id servæ PECHLINI (o) ac RIEDLINI (p) virginis, BECHERELII quæ (q) puellæ exempla abunde testantur, quævis tertium a F. MAURICEAU (r) relatum adjungimus: femina robusta ac plethorica mense ante partum convulsiones aliquoties passa, tandem post felicem partum, parcius justo manantibus lochiis, intra 12 horas visum prorsus amisit, vehementiqve cephalalgia vexabatur. At secta in pede vena visum altero mox die recuperavit. Post 13 inde menses iterum utero gerenti ter in graviditate, & quartum in puerperio vena tusa convulsiones & amaurosin antevertit, felicemqve partum præstitit. Ex his ergo patet, non vanum esse venarum in amaurosi curanda tundendarum delectum. Præsertim vero danda est opera, ut ex illis vel maxime vasis arte educatur sanguis, e quibus ante morbum emitti vel sponte fluere solebat, & morbus ab ipsa hac

(o) Vide §. 60 No 4. f).

(p) Vide §. 90.

(q) Vide §. 96.

(r) Obs. Cent. 5. Obs. 568.

evacuatione deinde non eveniente occepisse videtur. Sic si ab hæmorrhoidibus suppressis enatus videtur, hæmorrhoidalia vasa aperire convenit. Idem est de aliis locis, si ad ea accessus medentibus patuerit.

§. 95.

4. *Modi porro & instrumenta*, quæ ad sanguinem eliciendum isthic utimur, sunt in primis

a) *Phlebotomia*, vel ferri loco

b) *Hirudines*. Has ano admovent, si hæmorrhoidibus suppressis perit visus, jubent F. HOFFMANNUS (s) & SCHMUCKERUS (t). Istæ vulvæ quoque labiis utilissime easdem applicari testatur ad catamenia suppressa revocanda: neque minus in iisdem ad tempora collumque admotis præsidii in amaurosi curanda est expertus; etenim „ morbo a plethora vel insigni humorum ad „ caput congestione oborto necessum est, in „ qvit (u), phlebotomo sanguinis 3 x. xij. „ emittere, ad massam sanguinis toto cor-

(s) l. c.

(t) l. c. p. 17.

(u) Ibidem p. 15.

„ pore minuendam ; qvo factò temporibus
 „ & collo hirudines 10. 12ve applicari pos-
 „ sunt ad stagnantem e minoribus vasis san-
 „ gvinem eliciendum : quæ operatio ter,
 „ quater, & sæpius, pro re nata iterari
 „ potest „.

c) *Cucurbitæ scarificatæ.* „ Cucurbitula,
 „ inquit L. RIVERIUS (x), occipitio cum
 „ scarificatione admota tanta efficacia hu-
 „ mores a partibus anterioribus & nervo-
 „ rum principio detrahit, ut nonnulli post
 „ illius applicationem quasi momento visum
 „ recuperaverint,,. Id ipsum iisdem pene
 „ verbis J. HOLLERIUS (y) habet, ac L.
 „ DURETUS (z) adjecta confirmat historia : „ ex
 „ casu... repente quondam (inquiens) ex-
 „ cœcata est filia Ill. Cancellarii DE L'
 „ HOSPITAL nuper defuncti ; sed subito
 „ visum recuperavit, simul atqve iussimus
 „ admoveri cucurbitulam ejus occipiti „.
 „ Præsentaneam quoque opem a nucha verti-
 „ ceque capitis scarificatis studiosus HOFF-
 „ MANNI (a) est expertus.

(x) Prax. méd. L. 2. C. 1.

(y) De morb. intern. Cap. 20.

(z) Ibidem in scholio p. m. 152.

(a) Vide histor. 1.

§. 96.

5. *Quantitas* denique sanguinis tanta detrahenda est, ut vasa corporis majora universa insigniter vacua evadant; quo fit, ut sanguis e minoribus vasis in illa confluens, loca, ubi stagnando visus organum lædebat, deferat. Et „ si signa plethoræ adsint (inquit „ BOERHAAVIUS (b), Vx So ad animi „ deliquium usque instituenda est. Id enim „ deliquium non oritur, nisi sanguis ita im- „ minuatur, ut cerebrum a sanguine nunc „ distendi non possit, neque animales spiri- „ tus sufficiente quantitate secernantur: er- „ go necessario etiam in oculo vasa eva- „ cuantur, & fit revulsio causæ prementis „ & distendentis „. Quam salubre consi- „ lium isthoc sit, docemur observatione T. SPROEGELII (c): „ juvenis literatus 23 „ annor. plures in diæta errores admittens, „ diuturnam aliquando pedum in aqua geli- „ da refrigerationem perpeffus, dolore ca- „ pitis corripitur, mox visum sentit tenebri- „ cosum & obscuriorem, paulo post vero

(b) l. c. §. 90.

(c) *Commenc. Norimb. T. 15, A. 1745. hebdom. 43. p. 340.*

„ hoc plane orbatur , juncta simul aliqua
„ aphonia. Applicatis statim vesicatoriis,
„ nec non Væ Se, quam antea nunquam ex-
„ pertus fuerat , in pede instituta , sectis
„ dein altera die raninis, aphonia quidem
„ cessat, visus tamen non redit. Ægrotus
„ de omni desperans auxilio , renuente ac
„ inscio Medico, 4 insuper vicibus largas
„ sibi jubet fieri sanguinis missiones ad ani-
„ mi deliquium usque durantes; ultima vice
„ incidit in lipothymiam convulsivam , ex
„ qua post bihorium sibi redditus optime ac
„ perfecte visum recuperatum sentit, eo-
„ demque perfecte, ut & reliqua sanitate
„ incolumis, sine ullo defectu vel incommo-
„ do, utroque oculo, 18 abhinc annis ela-
„ psis, utitur. Præcipua autem annotatio-
„ ne dignum est, ipsum hunc juvenem bre-
„ vi ante illud tempus, quo visum perdide-
„ rat, immoderatissimo potu decocti fabarum
„ Caffæ delectatum fuisse ita, ut per 6.
„ 7ve menses quotidie 4 ad 6 uncias harum
„ fabarum ustarum, in binis vel 3 aquæ mo-
„ diis coctarum cum copioso lacte consum-
„ pserit, a tempore autem visus recuperati
„ potum istum, quem unicam mali causam
„ accusabat, plane abhorruisse, & cum po-
„ tu aquosiori commutasse „. Ita & BECHE-

RELII (*d*) puellæ 35 annor. admodum sanguineæ cum lintea 6^{ta} Maji in fluvio eluenti catamenia fluentia ab aquæ frigore substitissent ocyus, succedente palpitatione cordis, suffocationibus, intolerabili cephalalgia, &c. demumque etiam convulsionibus, quæ bi-duo inde post excepit cœcitas absque ullo conspicuo in oculis vitio: facta ter intra bi-duum larga Væ Se in pede, 10^{ma} Maji catamenia reversa sunt, omniaque symptomata intra octiduum sensim decessere, pristina succedente sanitate.

C A P U T II.

E N E M A T A.

§. 97.

ENEMATA quoque ad amaurosin, e colicis (*e*) præsertim doloribus ortam, solvendam valere cum ratio ipsa suadet, tum experientia quoque confirmat. Nam si colicis doloribus primarum viarum saburra ansam præbuit, alvo simul (ut fieri amat) obstructa;

(*d*) ROUX l. c. T 43 Janvier p. 31. fq.

(*e*) Vide §. 41. b).

clarum est, alvum enemate esse referendam, ut faburræ exitus concilietur. Majoris autem efficaciam his in casibus enemata esse, quam quæ ore præbentur cathartica, dudum experientia nos edocuit. Quo fit, ut alvo satis mota & colicus dolor conquiescat, & amaurosis vel continuo desinat, vel cito facileque aliis deinceps cedat remediis. RONDELETIUS (f) vidit puellam repente cæcam factam, cui enema injectum illico visum restituit. Perinde J. HELLWIGI (g) „ Pri-
„ or quidam in cœnobio Pr. complexionis
„ phlegmaticæ, corporis obesi, vitæ desidiosa,
„ bibaculus, hypochondriorum dolore ac ventris
„ constipatione sæpius laborans, inciderat in cæcitatem
„ subitanam, ita ut etiam apertis oculis neminem cognosceret,
„ nec lucem & tenebras discernere posset; sed post
„ usum clysmatis carminativi atque cathartici brevi visum
„ recuperavit. Simile quoque L. SCHROECKIUS (b) „
„ guttæ serenæ exemplum . . . observavit in . . . viro
„ 30 circ. annos nato, . . . qui cum & antea & in itinere, quod

(f) Meth. cur. C. 58.

(g) Obs. phys. med. 33. p. 79.

(b) Misc. nat. cur. dec. 2. ann. 5. obs. 247.

„ ex Palatinatu inferiore in patriam susce-
 „ perat, inordinata diæta admodum peccas-
 „ set, in gravia ventris tormina cum perti-
 „ naci alvi obstructione & visus deperditio-
 „ ne incidit, frustra a pharmacopola cly-
 „ steres aliaque interne & externe adhiben-
 „ te medicamenta auxilium sperans. Cui,
 „ cum post aliquot dierum perpeffa tormen-
 „ ta... alvi in primis solutionem anxie ex-
 „ petiisset, potiunculam ex resinæ Jalapp.
 „ gr. vj. ♂ CORNACH. gr. xij. & infus. la-
 „ xat. D. MANNAG. ℥j præscripsit, abdo-
 „ minique tenso pariter unguento emollien-
 „ te prospexit: unde bihorio post copiosis-
 „ simam materiæ scetidissimæ excretionem
 „ obtinuit; quam tamen confestim lipothy-
 „ mia, & aliquot post horis gravissimus in-
 „ sultus epilepticus, post adhibita tamen
 „ convenientia remedia brevi cessantes, nec
 „ postea amplius invadentes, exceperunt;
 „ cum interim oculi pristinis tenebris tor-
 „ querentur, nulla tamen extrinsecus labe
 „ in iis comparente, nisi quod pupilla ni-
 „ grior & solito amplior videretur. Cum
 „ vero flatus abdomini molesti essent, alte-
 „ ro die enemate iisdem obviam ire, calo-
 „ ri gliscenti resistere, aliisque remediis
 „ morbo prospicere instituit, nec sine opta-
 „ to successu, die 3^{uo} vesperi oculis ali-

„ qvali luce redeunte, & die 5^{to} cum inte-
 „ gra fanitate omnimoda etiam visus restitu-
 „ tione subsecuta „. Haud secius D. NE-
 BELII (i) „ centurio ob intemperantiam fre-
 „ qventioribus colicis doloribus obnoxius,
 „ cum... in hybernis commoraretur, sum-
 „ mis aliquando cruciatibus abdominis affi-
 „ ciebatur cum pertinaci alvi obstructione,
 „ cui chirurgus castrensis illico drasticum
 „ purgans opposuit, quo tamen alvus mini-
 „ me soluta, quin potius tormina insigniter
 „ aucta fuerunt; quare laudanum opiatum
 „ ad aliquot grana sub vesperam exhibuit,
 „ sicque dolores paululum mitigavit, donec
 „ illi appropinquante die solita vehementia
 „ recurrerent... Præscribo statim enema
 „ emolliens & carminativum cum aliquot
 „ olei lini unciiis commixtum, quod sine
 „ successu applicatum, & circa vesperam de-
 „ nuo admittendum erat; propinato interea
 „ per haustus calido decocto passularum mi-
 „ norum, cui folia fennæ prius infusa erant.
 „ Vesperæ accedens audio ægrum omnem
 „ amisisse visum adeo, ut ne quidem admo-
 „ tam candelam cernere posset. Adspicio
 „ oculos, & præter ampliorem pupillam ni-

(i) Ibidem dec. 3. ann. 3. obs. 81.

„ hil in illis insoliti deprehendo.... Ope-
 „ ram ergo dedi, ut duo adhuc alia enema-
 „ ta emollientia, oleis copiose admixtis,
 „ pararentur, quorum unum post alterum
 „ adhibitum intra horæ spatium alvum egre-
 „ gie subduxit, magna vitiosorum humorum
 „ saburra sic feliciter educta, quo ipso pa-
 „ tiens visum sensim recuperavit integrum
 „ cum doloris remissione... Injunxi, ut
 „ sequenti die horis matutinis reliquum in-
 „ fusi sennati per haustus assumeret: unde
 „ factum, ut iteratis dejectionibus, quid-
 „ quid restitit excrementorum, omnimode
 „ eliminatum fuerit, pristina sanitate sic sub-
 „ secuta „. Hinc recte HOFFMANNUS (k)
 „ nec contemnendi clysteres (ait) paulo effi-
 „ caciores, quorum virtus illustris est, si
 „ imi ventris stricturæ concurrant „.

C A P U T III.

B A L N E A.

§. 98.

BALNEA hocce in morbo duplicis ge-
 neris usurpari solent, videlicet

(k) l. c. thes. therap. §. 4.

1. *Calida*, eaqve vel *pediluvia* vel *semicupia*, ope quorum inferiores corporis partes ita laxantur, ut vasa earum calore fluidi ambientis ampliora reddita majorem humorum copiam in se recipiundo eosdem a capite oculisque, ubi congesti infarctum causando cœcitatem induxerunt, derivant, infarctumque, ac proinde cœcitatis causam, imminuunt. Idcirco hocce in morbo „con-
 „ venire etiam balnea pedum, ut major
 „ fiat derivatio a capite, monet H. BOER-
 HAAVIUS (l). Præprimis vero hic minera-
 lium aquarum infessus est, proficuum. „ Gut-
 „ ta serena, inquit J. D. GOHLIUS (m),
 „ habetur ubique pro affectione oculorum
 „ incurabili; nihilominus bina mihi nota
 „ sunt exempla hic ad fontem (Freyenwal-
 „ densen) per usum aquarum & infessuum
 „ visui restitutarum puellarum. Altera...
 „ fontem accedebat visu penitus destituta,
 „ nisi quod serenitatem lucis perciperet:
 „ præcesserunt graves capitis, præsertim ra-
 „ dici frontis incumbentes, dolores ad an-
 „ num spatium; inde muscoli genarum stu-
 „ pore erant affecti; in cristallino nec ma-

(l) l. c.

(m) l. c. No 6. p. 27. sqq.

„ cula nec opacitas observabatur, ipsa men-
 „ tis hebetudo, quæ conjuncta erat, ali-
 „ quid paralytodes & ad amaurosin perti-
 „ nens, subesse subministrabat: visum tamen
 „ ... recuperavit. Altera... puella 11 au-
 „ nor. ... utroque oculo visu penitus desti-
 „ tuta accessit ad fontem... Talis visus ab-
 „ olitio ipsi ante 7 obtigerat septimanas si-
 „ mul & semel in schola. Ante tempus se-
 „ mestre achoribus cum phthiriasi affecta cri-
 „ nium pati debuit abscissionem... Et hinc
 „ ... non ... oculi saltem, sed & aures
 „ pathematum inevitabilium fuere partici-
 „ pes; quippe lancinationes dolorosæ cum
 „ susurris & strepitibus perpetuo in auribus
 „ toleratæ, tandem post applicationem te-
 „ pidam olei lumbr. terrestr. laurini cum
 „ ungv. dialth. remixti rupto abscessu cessa-
 „ runt in manationem aurium, quæ nullam
 „ visui creavit clarificationem, quamquam
 „ de cetero evacuantia & lympham corri-
 „ gentia non fuerint neglecta. Oculos...
 „ offendi... ex corporis consensuali reliquo
 „ habitu nigros, ejusque iridem luci obver-
 „ sam admodum ampliatam. ... Hæc ipsa
 „ puella... intra octiduum, post usum a-
 „ quarum intrinsecum, & inesseuum, præ-
 „ mittendis laxantibus non omissis, vesica-
 „ toriis etiam interpositis, visum recupera-

„ vit in ambobus oculis „ Bina quoque cœcitat̃is eodem remedio curatæ exempla memorat J. REYDT (n), viri unum, q̃vi usu balnei aqvæ piperinæ, oculisq̃ve eadem elutis visum amissum recepit; alterum viduæ, qvæ e mœrore ob maritum occisum magna parte visum auditumq̃ve amissum aqṽis piperinis in aures instillatis iterum utrumq̃ve recuperavit.

2. *Frigida* porro balnea iis vel maxime salutaria sunt, qṽeis immoderatus ac profusus veneris usus nervosum systema universum labefactavit, & corpus exsolvendo visum quoque exstinxit. Qvam in rem luculentum exemplum præbet C. F. BOERNERUS (o) de juvene 18 annor. cui post diu ante toleratum in oculis palpebrisq̃ve dolorem mane quodam ita omnia circum se obscura, velut si nox esset, videbantur. Errore demum cognito quid fact̃o opus esset, animi dubius, biduum ita mansit; at oculis interea magis caligantibus accedenteq̃ve capitis dolore medicum chirurgumq̃ve accersit.

(n) Hydrophylac. I. Th. 10 Cap. p. 106. & 12 Cap. p. 190.

(o) Pract. Werk von der Onanie 2 Th. 12 Cap. p. 222. sqq.

Amplum dorso vesicans admotum, secta vena, ac postero die catharticum datum, fevera simul imperata diæta. Verum cunctis licet rite observatis, vesicantisque plaga intra 12 dies tam copiose madente, ut quotidie aliquoties deliganda esset; tantum tamen abfuit, ut malum remitteret, ut multo potius omnis pene visus interiret. Comperito demum, ægrum jam inde a 10mo anno onaniæ esse deditum, quæ etiam pristinum juvenis vigorem pedetentim hucusque immi-
nuerat, consilium datum, ut confanata vesicantis plaga, relictisque cathartics, æger analeptics ac pediluviiis frigidis uteretur, sæpiusque per diem linteis aqua frigida imbutis cervicem foveret. His circ. 9 dies fatigatis claritas oculis, roburque juveni reverti cœpit. Tum vero ad analeptica & humectantia etiam roborantia addita, ac præter frigidos illos fatus oculis quoque collyrium ex ∇^a vegeto-minerali frigida, dorso vero in dies aliquoties frustum glaciei adhibitum. Intra 6. 8ve hebdomades æger ab his pristinum recuperavit visum, pollicitus & ulteriorem frigidorum balneorum cum accurata diæta usum, & sceleris in consuetudinem recepti seriam in posterum evitacionem. Similem quoque casum narrat s.

WESZPREMI (*p*), nimirum pistori 30 annor. toto corpore emaciato a sexennio ita ealigabant oculi, sine conspicuo vitio, ut objecta quasi per densissimam nebulam cerne-
ret. Crura quoque usque adeo erant invalida, ut vix ultra horæ minutum, nisi suffultus, eodem loco potuerit consistere, quin continuo omnibus tremere artubus, & scotomia ingrueret. Omnis etiam spinalis medullæ tractus quandoque turbabatur, maxime dum corpore flexo quidpiam exsequendum erat. Ad hæc & memoria ad stupiditatem usque defecerat, omniaque inveteratæ tabis dorsalis indicia adfuerunt. Incassum tentatus ptyalismus & lis, aliaque remedia. Tandem severo sub examine cum rubore confessus est, onaniæ se esse deditum. Idcirco præter pediluvia, frictiones, & 40 dierum diætam lacteam, aliaque remedia, per 3 hebdomades alternis diebus hora 8^{va} matutina jejuno stomacho balnea frigida imperabantur. Hacque methodo intra bimestre ita vires visumque recuperavit, ut ad opificium suum rursus tractandum satis se valentem senserit.

(*p*) Observ. med. 7. apud A. HALLER. disp. ad morbor. hist. & curat. facient. Tom. 6. No 226. p. 811.

C A P U T IV.

APOPHLEGMATISMI, ERRHINA.

§. 99.

Posteaquam humorum in corpore massa universa pro eo, ac par est, varie imminuta est, nimirum institutis sanguinis missionibus, emesi, catharsi, &c. tum vero perquam proficuum observatum est, muci quoque e vasis capitis, affecto loco vicinis, vacuationes suscipere, ut lentior nempe illa massæ humorum pars a vasis loci affecti avertatur, minuaturque, & non nisi fluidior sanguinis pars ad loca affecta appellat, quæ stagnantia reddere meabiliora queat. Binis autem viis muci e capite vacuatio institui solet, videlicet per os ac nares. Remedia itaque ad id idonea sunt

§. 100.

1. *Apopblegmatismi*, i. e. remedia pituitam e capite per os evocantia (q), cujusmodi sunt collutoria, masticatoria, fumo-

(q) GALEN. de sanit. tuend. C. 10.

rum fuctiones , &c. Vidimus enim superius (r) ptyalismo spontaneo solutam fuisse amaurofin. Qvantæ autem id genus remedia in amauroseos curatione efficacix interdum sint, seqventes docebunt historiæ. I. B. LAMZWEEERDE (s) civis. cujusdam meminit , qvix
 „ ex diuturno morbo & cephalæa subito pri-
 „ vatus est visu... utriusqve oculi... sic ut
 „ nec solem splendentem vel candelam ar-
 „ dentem a tenebris discernere posset. Ab
 „ hac cœcitate intra octiduum seqventibus
 „ eum liberavimus (inqvit) remediis: præ-
 „ misso clystere , & vesicatorio nuchæ ap-
 „ plicato , cucupham præscripsimus ex ce-
 „ phalicis ; hunc Pulv. per fistulam loco ta-
 „ baci sugendum imperavimus:

R. Herbæ Salviæ .

———— Rosmarin.

———— Majoran.

———— Betonic.

———— Lavend. aa. M. s̄

Sem. Anis. ʒ ij. F. Pul. grossus.

„ Tribus fistulis utebatur qvotidie , post
 „ qvorum usum hunc Pulv. masticebat:

R. Herb. Majoran

———— Serpill.

(r) Vide §. 60. No 5. c).

(s) J. SCULTETI armam. chir. append. P. 2. Obs. 74.

Flor. Euphrag. aa. M. ſ.

Sem. Fœnic. ʒv.

Gum. Maſtich. elect.

Oliban. Mac. aa ʒjſ.

Cinnam. ʒſ.

Cardam. ʒj.

Sacch. alb. parum. M.F. ‡ groſſus.

, Alternis veſperis has deglutiebat pilulas:

R̄. MP. Luc. ʒj

—— Aur.

—— Coch. aa ʒſ. F. pil. No xij.

, Qvibus remediis tam brevi a malo, alias
, tam pertinaci, liberatus eſt,,. Eundem
in finem ſola interdum fumi Nicotianæ ſuctio
ſuffecit. A. W. KELLNERUS (t) phthiſicum
curandum habuit, cui aliquot ante annis cre-
brior narium hæmorrhagia linteis aqua frigi-
da humectatis nuchæ inopinato impoſitis ſup-
preſſa continuo cœcitatem utriusque oculi
acceſſivit; a qua nullo alio remedio, quam
diligenti uſu fumi Tabaci, intra aliquot
hebdomades liberatum ſe fuiſſe aſſeverabat.
Hoc ipſum remedium tanto etiam certio-
rem habet ſucceſſum, ſi poſt longam ejus fumi
uſurpationem repente qvis conſuetudini huic

(t) Annal. Vrati l. Tent. 36. A. 1726. April. Cl. 4.
art. 20. p. 503. nota (c).

valedicens in amaurosim incidat: quæ immi-
 nutæ utiqve salivæ muciqve oris, a fumo ta-
 baci prius uberius evacuari solitis, vacuatio-
 ni ob vasorum vicinitatem tribuenda est, &
 quæ per fumi suctionem resumptam denuo pro-
 vocata spes est fore, ut amaurosis discutia-
 tur. Facit huc observatio J. FRANCI (u):
 „ miles nostras (refert ille) ob rubedinem
 „ & inflammationem oculorum contumacissi-
 „ mam & dolorificam me conveniebat; ab
 „ olfactu vero tabaco-bibulum esse judicavi:
 „ hinc quot fistulas per diem noctemqve
 „ efumet, quærenti mihi, 30 vel 40 sence-
 „ re respondebat. Eu! dixi, sequentibus
 „ diligentissime utere, & sanaberis, modo
 „ cessabis ab ejus usu, alias amittes brevi
 „ ambos oculos:

R. ∇^x Consol. reg.

—— Euphrag.

—— Ros. alb.

—— Cyan. aa ʒss

Vitrioli albi gr. ij.

Camphor. gr. j. M.D. ad Vitrum

„ S. aqua ophthalm. pro eluendis m. & v.
 „ oculis.

• (u) Misc. nat. cur. dec. 2. ann. 5. obs. 236.

R. Ungv. de ceruff. c. camph. ʒſs.

Sacch. Saturn.

Tutiæ ppt. aa ʒ ſs.

Olei nymph. q. ſ. M. D. ad fiſt.

„ S. Ungv. ophthalm. refrigerans ſub noctem
 „ imponendum. Bene ſe ſe ostendebat; aſt
 „ exactis diebus 4 incidit in plenariam cœ-
 „ citatem. Vocor! Re altius pēſitata ſva-
 „ ſi, ut ſuffitu illo pergeret. Quid fit?
 „ Horis 12 poſt, totidemqve fiſtulis abſolu-
 „ tis, videre iterum cœpit: deinde rite ap-
 „ plicatis remediis recuperavit ſanitatem.
 „ O miram tabacomaniā! „

§. 101.

2. *Errhina*, quæ naribus indita uberio-
 rem muci ex iisdem profluxum creant: quan-
 doqvidem ſpontaneus id genus muci e nari-
 bus uberior proventus amauroticis magno-
 pere profuiſſe eſt obſervatus (x). Interea ta-
 men multi ab eorum uſu abhorrent, quod,
 cum irritantia eſſe illa oporteat, ſternutatio-
 nem facile excitent, qua infarctus vaſorum
 encephali, proindeqve ipſe morbus, auge-
 ri poſſet; quandoqvidem non dum præſentem

(x) Vide §. 60. No. 5. b).

amaurosim induxisse sunt observata (y). Idcirco F. HILDANUS (z) illa prorsus rejicit. Secus vero de iisdem F. HOFFMANNUS (a) sentit, id unum admonens, prius „ ut „ corpus tam a sanguinis & humorum nimia „ mole, quam ab eorum impuritate, & „ primæ viæ ab omni saburra, liberentur. „ Qvo scopo præmittendæ sunt sanguinis „ missiones, blanda laxantia, & medicami- „ na sanguinem diluentia & depurantia... „ Ne scilicet, antequam corpus & caput „ iusta purgatione levatum fuit, adhibean- „ tur; quoniam alias humorum vehementi- „ orem ad caput affluxum causantur. Ve- „ rum eadem corpore rite præparato inter „ morbi initia desideratissimam ferunt o- „ pem „ dum videlicet universum vasorum „ systema concutiendo inter sternutandum sta- „ gnantes circum organa visus humores loco „ movent, motosque ad vicina in naribus co- „ latoria alliciunt. Unde „ illustrem, inquit „ idem (b), discutiendi facultatem possident „ sternutatoria, & cum primis sal volatile

(y) Vide §. 42.

(z) Obs. med. chir. Cent. 1. Obs. 24.

(a) l. c. Cautel. pract. §. 1.

(b) Ibidem thes. therap. §. 6.

„ ammoniaci ficcum, & cum oleo salviæ,
 „ majoranæ, balsamoque Peruviano marita-
 „ tum, naribusque attractum, vel longe
 „ adhuc efficacius extractum ligni Gvajaci
 „ resiniforme, quod ab evaporatione de-
 „ cocti ex hoc ligno remanet, & a me in-
 „ ventum est, cujus 1 vel 2 grana naribus
 „ suscepta vehementer cum sternutamento
 „ pituitam ex intimis capitis eliciunt,,. Ho-
 rum veritatem confirmat observatio J. G.
 SEGELITZII (c) de fabro ferrario, qui 3^{na}
 vernæ, vehementis recidivam fugaturus cum
 sub noctem nescio quem Æm insigni sumpsis-
 set dosi, noctu tanto horrore febrili est ex-
 agitatus, ut lecto licet cubans in altum ja-
 ctaretur. Postero mane debilitatem visus
 questus est, quæ, febre non amplius rever-
 sa, in dies usque adeo increvit, ut æger nil
 amplius discernens, ad omnem laborem in-
 habilis, vix de loco in locum transire va-
 luerit. Cum in oculis nihil vitii conspici
 posset, data digestiva, laxantia, & deco-
 ctum ex herb. Betonic. Meliss. Euphras. sem.
 Fœnic. tum etiam sal quoddam volat. oleo-
 sum, & aliquoties sudorifera, externe vero

(c) BÜCHNER miscell. phys. med. A. 1728. Maji
 Cl. 4 art 8. p. 1067.

collyrium ex aqv. Euphras. Rosar. flor. Cyan. Calcatripp. Borrag. croco metallor. & essent. castorei, perinde interdum aliquid ex bals. vitæ TEICHMEYERI, una cum ♂^e sternutatorio e fl. Lil. convall. Lavend. herb. Majoran. & Beton. id efficere, ut æger non modo recte ambulare sed etiam utcumque minutum characterem legere qviverit. Nihil tamen hic errhinum in scopum efficacius est ♀^{rio}; nam teste BOERHAAVIO (*d*), bo-
 „ no aliquando... eventu sanavit morbum
 „ vehemens salivatio, & ♀^{us} naribus at-
 „ tractus,, cujus ope cataractam qvoqve cu-
 „ ratam vidit BOYLE (*e*), qvemqve BOER-
 „ HAAVIUS (*f*) ,, sequenti modo... ex-
 „ hibere consuevit:

R. Sacch. Cand. gr. x.

♀^o dulc. gr. j. M. exacte pro ♂^e
 „ sternutatorio, qvi in 10 doses dividen-
 „ dus est, & omni mane post emunctionem
 „ mucī naribus una dosis hauriatur. Nimius
 „ impetus, qvi inde excitari potest, lacte
 „ temperatur tepido per nares hausto,,.
 „ ♀^{lia} hæc errhina tum vel maxime sunt pro-

(*d*) l. c. §. 109.

(*e*) De utilit. philos. experim. Exerc. 5. C. 19. p. m.
 346.

(*f*) l. c. §. 138.

ficua in amaurosi solvenda , dum obstru-
ctio sinuum frontaliū & insolita narium
siccitas simul adest , seu ut symptoma , seu ut
causa : cujusmodi bini ægri J. L. SCHMUC-
KERO (g) obtigere , qvi ut erqvecura-
tus est usu cum internorum remediorum i-
doneorum , tum in primis ꝑis errhini ex
æthiope saccharato (i. e. ꝑrio vivo cum tri-
plo sacch. Canar. in ꝑem contrito) cum
pauillo rad. Valerianæ & flor. Lil. con-
vall. Siccitas narium evanuit , nativus mu-
cus renascebatur , & pro ratione humescen-
tium narium cœcitas qvoqve abibat , ambo-
qve ægri aliquo post tempore iterum rite vi-
derunt. Deniqve non inutilia qvoqve sunt
errhina cardiaca langventes nervos in ex-
haustis vel paralyticis excitantia , qvæ GOR-
TERUS (b) in exhaustis a nimia venere cum
fructu adhibuit.

(g) l. c. p. 8. sq.

(b) Vide §. 89.

CAPUT V.

TOPICA.

§. 102.

Postquam copia humorum vasa distendentium variis vacuationibus eousque est imminuta, ut liquida e minoribus vasis in maiora jam recipi queant, minoribus vasis ab stasi humorum infarctis extrinsecus talia TOPICA continenter admoveere oportet, quæ contractilem eorum vim augendo, stagnansque in illis fluidum resolvendo, istud in majores vasorum ramos repellere (i. e. infarctum vasorum, & ab isto pressionem nervorum opticornum profectam tollere), simulque debilitatis nervis pristinum reddere tonum queant. Horum autem topicorum alia ipsis oculis, alia huic vel illi capitis regioni, applicari solent: hæc *cephalica*, illa *ophthalmica* audiunt.

§. 103.

I. *Ophthalmica* vero cum innumera sint, quæis laudem annales medici impertiuntur,

ego non alia, nisi quæ experientia probavit, hic sum in medium allaturus, eaque

A. *Simplicia*, ac sæpe euporista, ut est

1. *Fel piscium* quorundam, seu e cystide seu hepate elicitedum. „Ex jecore cujusdam piscis, ait P. FORESTUS (i), vulgari lingua a nostris dicti *Aelpuyck*, liquor quor quidam defluit, experimento certo obscuritati visus admodum commodus & utilis. Capitur autem hic piscis in aquis Veenlandiæ prope Delphensem urbem. Est vero hic piscis mollis, & valde limosus, subnigriusculus, & aliquantulum laticior angvilla, cujus jecur, quod valde album est ac pingve, tegulæ alligatur cyatho subjecto vel vitro in sole, ut ab eo pingvedo olei instar destillet. Vel jecur tegulæ filo alligetur, vitro capaci imponatur, & supra hoc aliud vitrum magis capax instar galeæ seu capitelli superponatur, & soli exponatur: exhibit autem liquor albus & clarissimus, ad modum olei puri destillantis, & usui reservetur. Hoc liquore cilia tantum inungantur; & lacrimæ ab oculis exhibunt, & is, qui visum obscurum tenebrosumque habet, miraculi

(i) l. c. Obs. 35.

„ instar illico lucidum & luminosum recu-
 „ perabit. Oportet autem minime hunc
 „ liqvorem in oculum stillare, verum satis
 „ est, si cilia & palpebræ superiores eo in-
 „ ungantur; qvo remedio ... mulier satis
 „ lumine or̄bata visum recuperavit, ita ut
 „ hoc arcano felicissime in aliis multis usus
 „ fuerim „. Mulier dicta e qvinqvenni
 femoris dolore male tractato 9 fistulosa ul-
 cera maligna in eodem & crure nacta est,
 qvæ inveterata jam cum FORESTUS sanas-
 set, cœcitas oculum unum sine ullo ejus
 conspicuo vitio invasit, præcedente capitis
 dolore, a qva frustra variis per 4 menses
 tentatis demum usu ante dicti olei est libe-
 rata (k). Perinde J. C. CLAUDINUS (l)
 ad visum læsum oleum fluviatilis mustelæ ex
 jecore methodo FORESTI-eductum impense
 commendat. Remedium hoc sane vasis in-
 halantibus resorptum, & ad infarcta oculi
 loca delatum, stagnantes humores lentos
 potentissime liqvāt; qvandoqvidem & ad
 cornæ maculas (m), farcoses (n), qvin

(k) Ibidem.

(l) Empyr. rat. L. 3. S. 2. P. 1. C. 18.

(m) TOBIAE C. 11.

(n) GALEN. de simpl. med. fac. L. 10. C.

ipsam quoque cataractam (o), dissipandas efficax est visum.

2. *Oleum empyreumaticum*, e pannis lineis super acie ferreae securis combustis collectum, oculoque illitum, nigra illa spectra oculis obversantia certo experimento muliercularum in Dania dispellere ait OL. BORRICHIUS (p). Leve id omnino videri posse remedium non inficior; at memini dicere olim HAENIUM Præceptorem, ad varices hæmorrhoidum dolentissimas nihil se efficacius fuisse expertum oleo ferrato: quod si ita est, cur non perinde oleum e pannis lineis accensis super securi, a qua etiam illud ferro imbui BORRICHIUS arbitratur, ad retinæ varices, a quibus nigra illa spectra oriuntur, valeat?

3. *Chelidonii succus*. F. O. GREMBS (q)
 „ novit quendam virum incipienti cœcitate
 „ laborantem, qui post varia adhibita re-
 „ media hoc unicum medicamen præ aliis
 „ juvisse, deprædicare præ satis non pote-
 „ rat, & est succus Chelidonie inter duos
 „ lapides expressus, & oculo ter in die in-

(o) Misc. nat. cur. dec. 1. ann. 2. obs. 126.

(p) Act. med. Hafn. Vol. 5. Obs. 63.

(q) Arb. integr. & rurs. hom. L. 2. C. 1. §. 11.
 No 18. p. 191.

„ stillatus. Aliqui tale collyrium com-
 „ mendant :

R. Mellis

Succi chelidoniæ aa ʒjv.

—— fœnic. ʒij

Vini albi ʒj. Coq. in cinerib. adde

Fell. perdicis ʒij „.

4. *Ÿ vapor* s. YVESII (r) Ecclesiastico
 cœcitatibus reliquias egregie fustulit.

5. *Lumbricorum liquor*, e lumbricis vi-
 tro & massæ panis fermentatæ inclusis, &
 in clibano per deliquium solutis, trans lin-
 teum crassum colatis, paratus, addito tan-
 tillo camphoræ, oculis blandissime illitus a
 M. ETTMÜLLERO (s) laudatur.

6. *Sanguis Galli* melle subactus num ad
 amaurosin quid valeat, contendere nolim.
 ÆSCULAPII in æde, quam insula Tiberina
 habuit, J. GRUTERO (t) teste sequens ta-
 bella reperta esse dicitur : „ VALERIO
 „ APRO militi cœco oraculum reddidit
 „ Deus, veniret, & acciperet sanguinem
 „ ex gallo albo, admiscens mel, & colly-
 „ rium conficeret, & 3 diebus uteretur su-

(r) Vide §. 63.

(s) l. c. p. 732.

(t) Corp. inscript. T. I. p. 71.

„ pra oculos; & vidit, & venit, & gratias
 „ egit publice Deo „. Sed hæc forte ve-
 rustatem sapiunt magis, quam veritatem.

7. *Aqua frigida* in amaurosi a nigris illis
 idolis (u) occipiente, si mox usurpetur, haud
 raro idola dicta vel prorsus dissipat, vel in-
 signiter minuit, ulteriusque impedit augmen-
 tum. „ In æstu solis summo (de se BOËR-
 „ HAAVIUS (x) narrat) ante aliquot an-
 „ nos mihi eqvitant per loca arenosa subito
 „ enascitur macula palmæ latitudine in fun-
 „ do oculi. Cogitanti succurrit mihi, me-
 „ dicamentum optimum fore aquam frigidis-
 „ simam, qua singulis noctibus applicata
 „ maculam ad grani hordei magnitudinem
 „ redegi, ita ut nunc vix noceat, vel in-
 „ commodum inferat. Inflammatio ergo
 „ procul dubio erat in fundo oculi, & sæpe
 „ etiam fit in tali casu: hinc optimum re-
 „ medium est, quod subito retropellendo
 „ omnia vasa constringit, ut aqua frigida.
 „ ARCHIGENES medicus celeberrimus, qui
 „ tempore AUGUSTI floruit, hoc reme-
 „ dium commendavit; & siquidem statim
 „ non omnino reddatur æqvale vas obstru-

(u) Vide §. 16. b).

(x) l. c. §. 89.

„ ctum, multum tamen proficimus „. HEI-
 „ STERUS (y) perinde tribus in ægris effica-
 „ ciam hujus remedii est expertus, quorum
 „ unus id genus maculas ab itinere ardente cœ-
 „ lo facta, alter ex aspectu nivis, tertia mu-
 „ lier a monetarum fulgore oculos crebrius
 „ percellente, contraxerunt. Porro „ si a-
 „ maurosin, ait J. L. SCHMUCKERUS (z),
 „ aut cerebri commotio, aut fissura, fractu-
 „ ra, depressiove cranii, aut extravasata
 „ fluida, induxerunt; hisce prius percura-
 „ tis visus plerumque sponte deinde rever-
 „ titur; nihilominus utile est, aquam frigi-
 „ dam oculis, roborandi gratia, applicare „.
 Denique A. G. RICHTERUS (a) remedium
 hoc in omni sanguinis ad caput congestione
 amaurosin creante, modo indicatæ aliæ etiam
 vacuationes instituantur, commendat „ lo-
 „ cum hic in primis habet (inquiens), &
 „ insigai cum successu a me quoque aliquan-
 „ do adhibitus est, usus aquæ frigidæ exter-
 „ nus, quem Cel. BLOCH (b) in paralyfi
 „ aliisque morbis ex congestione humorum

(y) l. c. I Band. No 121. 400. Vide histor. 3.

(z) l. c. p. 12.

(a) l. c. p. 76. sq.

(b) l. c. No 6 7. p. 42. sqq.

„ ad caput ortis , jure adeo extollit. Sple-
 „ nia crassa , aqua frigidissima madida in
 „ tali casu oculo temporibus frontique ali-
 „ quoties per diem imponi jussi , & hoc
 „ quidem remedio incipientem amaurosin
 „ aliquoties discussisse mihi videor „. De-
 niqve etiam

8. *Magnes* artificialis ante 13 abhinc an-
 nos ad emendandam visus imminutionem a
 mortalibus in usum vocari cœpit. Bina id
 genus exempla c. WEBER (c) publici juris
 fecit: nempe (d) femina annosior, acri sem-
 per visu pollens , vehementi febre catar-
 rhali cum insigni capitis dolore & utriusque
 oculi obscuratione correpta est. Priore malo
 citra ulla remedia conquiescente posterius
 mansit; & quamvis nullum in oculis vitium
 esset conspicuum , ægra tamen de continen-
 ti eorum dolore admodum sensibili quereba-
 tur, lucidiorum objectorum erat impatiens,
 omniaque velut intra nigram nubem nimis
 imperfecte usurpabat, atque meras sibi scin-
 tillas ex oculis erumpere referebat. Post
 multa incassum tentata, demum artificiali ma-

(c) Die Wirkung des künstl. Magnets in einen
 seltenen Augenfehler, 8vo Hannoveræ 1767.

(d) Ibidem 3 Geschichte p. 23. sq.

gnete oculis crebrius applicato, intra aliquot hebdomades pristinum recuperavit visum. Primis applicationibus dolor in oculis aliquis est perceptus; sed visus quoque inde continuo clarescere cœpit, donec prorsus tandem fuisset restitutus. Cumque semestri inde post ejusdem mali recidivam ægra pateretur, ipso hoc solo iterum remedio, sed non nisi post trimestrem fere usurpationem, plane convaluit. Perinde (e) sexagenarius temperamentum phlegmatici, crebris catarrhis obnoxius, magnosque, ac prominentes oculos habens, jam a 20 annis tantam in oculo dextro imbecillitatem observavit, nihil ut pene illo videre qviret. Magnetis tandem vires cœpit experiri. Die 1^{mo} magnetis ad affectum oculum applicito per $\frac{1}{4}$ horæ nil sensit; at paulo post ardor occepit, oculus rubuit, lacrimisque est impletus. Altera applicatio tensionem in palpebris, lacrimasque in oculo causavit. Eadem tertio tentamine acciderunt. Die 2^{do} vesperi applicatus magnes nil sensationis induxit; sed ubi remotus est, tensio palpebrarum uberisque lacrimæ in oculo, succedere. Die 3^{to} prima magnetis applicatio tinnitum in aure

(e) Ibidem 4 Geschichte p. 25. sqq.

dextra, ac mox deinceps tensionem in mala læva, puncturasque in sinistro oculo, sed quæ non erant diuturna, excitavit: sub 2^{da} vero ac 3^{tia} bulbus affectus vehementer movebatur, ac multum aquæ in utroque colligebatur oculo. Die 4^{to} in palpebris oculi tensio, & illacrimatio in utroque oculo; quod ipsum die 5^{to} cum frigore in ambobus oculis perceptum. Sub meridiem scripturo brevi aliquo tempore velut rete oculis prætenfum videbatur. A meridie rursus admotum magnetem ardor utrumque oculum invadens, dein tensio in lateris lævi mala ac maxilla deponere coegerunt. Non multo post iteratum tentamen ex utraque nare aquæ fluxum elicuit; bulbi magnopere movebantur, & simul somnolentia ingruit. Vespero sub eodem tentamine fornicatio inter utrumque oculum oborta, moxque postea lenes puncturæ in lævi oculi cantho ac mala læva perceptæ. Die 6^{to} uterque oculus rubuit cum ardore ac lachrymatione; eodemque tempore tensio maxillam ac femur lateris dextri tenuit, ac in maxilla amoto jam magnete aliquot adhuc minuta superfuit: simul etiam somnolentia cum aliquot oscitationibus supervenit. Die 7^{mo} ambo oculi valde madebant cum tanto supra dextrum pruritu, ut ad scabendum vehementer coge-

ret. Tensio lævæ malæ & utriusque genu admodum sensibilis etiam seposito magnete aliquot minutis duravit. Die 8^{vo} rubor canthum internum oculi dextri insidens applicato magnete ad medium illius migravit; ambo oculi multum plorarunt; ardor erat lenis; dextrumque femur iterum tensionem perpeffum est. Die 9^{na} oculus affectus jam eatenus profecit, ut eodem remotiora objecta æque rite ac lævo discerneret, ac sclopi malæ appressi tuberculum collimatorium, antea oculo non observandum, nunc prompte ac distincte videret. Interdum etiam æger magnetis loco clavim applicuit, sed nullam ab illa in sano oculo sensationem, in affecto vero lene tantum frigus & aliquid aquæ, est expertus. Continuatus itaque magnetis usus in dies effectus jam dictos exferere pergebat, illatis sæpe simul brachiorum crurumque doloribus cum anxietate, usque dum oculo affecto visus rediisset pristinus. Ad hæc D. NOOTNAGEL (*f*) „ vim (ait) magneti-
„ cam non plane inertem in amaurosi tol-
„ lenda esse patet ex observatione, quam
„ mihi P. R. HELL... benignissime commu-
„ nicavit, e qua constat, puerum gutta

(*f*) l. c. §. 22 sub finem.

„ serena perfectissima laborantem, cui jam
 „ efficacissima remedia frustra propinata
 „ erant, intra 3 dies, magnete cervici in-
 „ tra scapulas applicato, præter omnium,
 „ qui aderant, spem videndi facultatem re-
 „ cuperaſſe: quamquam in aliis, qui amauro-
 „ ſi perfecta correpti erant, eandem fru-
 „ ſtra tentavit Cel. MESMER,,. Sed ſu-
 „ periore jam ſeculo remedium hoc ab J. G.
 „ VOLCKAMERO (g) in viſu debili tentatum
 „ eſt. „ Opificis ... (ait ille) conjugii ...
 „ acies oculorum hebeſcere cœpit, oculis
 „ iſtis in ſuo fulgore ... ab omni labe im-
 „ munibus ... Melioris proinde notæ cala-
 „ mitam tranſverſo digito latam in eo, qvo
 „ ferrum trahit, latere nuchæ alligari, & 2
 „ minores ſacculos ramentis ferri repletos
 „ binis imponi oculis nocturno præcipue tem-
 „ pore curavi, ſpe radiorum ex magnete ad
 „ ferrum oculis impoſitum directorum talem
 „ obſtructionis cauſam fore retroactam. Mul-
 „ tum ſe femina illa adjutam illius lapidis
 „ ope credidit; cum per multos annos ta-
 „ men, quibus ſupervixit, debiliore viſu
 „ fuerit prædita,,.

(g) Miſc. nat. cur. dec. 2, ann. 5. ſchol. ad obſ.

B. *Composita*, ut ∇^x , Ω , unguenta, &c. sic

I. *Aqua* J. HOLLERII (b),, quam scri-
,, bunt (inquit ille) restituiffe visum cæco
,, 9 annorum:

,, R. Succi Apii

—— Fœniculi

—— Verbenæ

—— Chamædryos

—— Pimpinellæ

—— Caryophyllatæ

—— Salviæ

—— Chelidoniæ

—— Rutæ

—— Centinodiæ

—— Morsus gallinæ

Caryophyllorum

Farinæ volatilis aa. \mathfrak{z} j.

Piperis crassiuscule triti

Nucis Mosch.

Ligni Alöes aa. \mathfrak{z} iiij. Omnia

,, mergantur in urina pueri incorrupti &

,, sexta parte vini Malvatici, bulliant brevi

,, tempore; tum exprime & percola; repo-

,, ne vase vitreo bene obturato. Hora so-

,, mni singulas guttas singulis oculis instilla,,

Simile quoque collyrium H. REUSNERUS

(i) habet, quo decennalem cæcitatem curatam refert.

2. *Aqua ophthalmica QVERCETANI* (k):

R. Croci metall. 3j. ij. infunde in

∇^a Euphrag. (vel similis) 3 v. vj.

Miræ esse virtutis contra amblyopiam, amaurosin, ac suffusionem refertur.

3. *Spir. ophthalmicus SCHMUCKERI* (l):

R. Ω Lilior. convall.

Lavend.

Anthos

⊙* l. aa. 3j.

Bals. vit. HOFFM. 36. M.

Manibus affusus oculis aliquoties per diem, citra eorundem contactum, admovetur.

4. *Balsama varia*, ciliis palpebrisve illita, ut in KALTSCHMIEDII (m) ac SIGELII (n) ægris, curationem sæpenumero accelerant.

5. *Ungventum BRENDÉLII* (o), quo Vratislaviæ femina 14 annos altero oculo cæca visum recepit, quodque impense mul-

(i) Obs. med. 36. apud. G. H. VELSCH l. c.

(k) Pharmac. restit.

(l) l. c. p. 18. sq.

(m) Vide §. 70.

(n) Vide §. 106.

(o) Contil. 55.

ti ad amplyopiam cœcitatēqve , teste M. ETTMÜLLERO (p), commendant. Paratur:

R. ♂ Caryophyll.

— Zingiber.

Sal. commun.

Mell. anthosat. aa. ℥℞. M. F. Ungv.

de quo quantitate sem. sinapi oculo indatur, qui inde primo vellicatur, at brevi id desinit, humor ex oculis profluit. Continuatur usus, donec optatus addit effectus. Simile huic est, quod a binis in Dania mulierculis feliciter tentatum fuisse refert O. BORRICHIIUS (q): „ capiunt frustulum electi Zingiberis, derafoque cortice tamdiu affricant coti (qua acuuntur scalpella), admissa portione ∇^a Rosaceæ, donec in fundum vasculi ex attritu crassamentum quoddam deponatur; hinc leni inclinatione vasis rosacea tenuior effunditur, quod autem spissius, palpebris clauso oculo mane & vespere allinitur, ibique quiete relinquitur, donec æger agnoscat evidentem in oculo calorem; tum digito inunctum magna abstergitur; & labor idem, quoties requirit necessitas, ingeminatur.

(p) l. c.

(q) l. c.

§. 104.

II. *Cephalica* vero sunt cerata, litus, fottus, &c. ad caput, nucham, tempora, frontemve applicari solita. Quantæ autem hæcce remedia nonnunquam sint efficaciam, complures testantur observationes. Sic „ tres „ habuit P. S A L M U T H U S (r) 'sub cura mulieris, quibus post partum visus intercep- ptus est, oculis omnino sanis existentibus, quarum duæ pristinae sanitati restitutæ fuerunt per revellentia, derivantia universaliter, & localiter vacuantia, vesicatoria quoque ad verticem applicata, & tandem *panem calidum e clibano extractum* & dicto vertici admotum : tertia vero, quod tardius auxilia petisset, frustra iisdem usa est; nisi forsan postea aliis usurpatis convaluerit „. Hoc ipsum remedium aromate acuaturn & alias profuit, nempe „ mulier nobilis colica passione graviter laborans visu per triduum fuit privata; purgato autem corpore, & pane calido sem. fœnic. consperso, ∇^a ros. & fœnic. madafacto, cervicique imposito, visum recepit, & convaluit „ teste J. F. HILDE-

(r) l. c. Cent- 1. Obs. 75.

sio (s). Ita & M. I. MARXII (t) „ puer
 „ procax & vegetus currum plus quam ho-
 „ ram infectatus, domum rediens de visus
 „ obscuritate cum dolore intolerabili fere in
 „ oculo congverebatur, atqve visum mox
 „ penitus perdebat. Væ Se, regimine an-
 „ tiphlogistico, atqve vesicatoriis frustra
 „ præscriptis, solis antirheumaticis, *empla-*
 „ *stro stimulante* dein temporibus applicato
 „ visum recuperavit,,. Bina vero hic præ
 ceteris F. HOFFMANNUS (u) commendat,
 suum nempe Balsamum vitæ, alterum vero
 epithema sequens:

R. Rad. Angelicæ

—— Imperat.

—— Valerian. aa. ʒij.

Herb. Chærefol.

—— Arnicæ

Flor. Sambuc.

—— Lavend.

—— Rosar. aa. pug. iij.

Sem. Fœnic.

—— Anethi aa. ʒjss. C. C. F.

Species decoquendæ in æquis partibus ∇ æ
 rosar. & sclopetariæ (l'eau d'arquebuse)

(s) Apud J. SCHENCK l. c. fol. m. 159.

(t) l. c. p. 116.

(u) l. c. cautel. pract. §. 2. 3.

dictæ). De priore autem „ ex roborantibus
 „ discutiente simul virtute præditis balsamum
 „ vitæ meum (inqvit) excellenti contra gut-
 „ tam serenam pollet efficacia , cum primis
 „ si ea a decubitu serofi humoris ad nervos
 „ opticos in subjectis pituitosis ac phlegma-
 „ ticus originem traxerit : qvo in casu no-
 „ vi balsamum illud inter initia capiti fron-
 „ tiqve cum linteis admotum omnino sustu-
 „ lisse cœcitatem. Eo autem cautius uten-
 „ dum in corporibus sanguine plenis, ubi
 „ sanguinis copia & congestio malum indu-
 „ xit : tum enim temperantia potius atqve
 „ tam molem humorum imminuentia , quam
 „ ejus orgasmum componentia sunt profi-
 „ cua „. Postea exemplum ipsum ita re-
 „ fert (x) : „ puer 12 annor. ante aliquot
 „ jam annos catarrhis, coryzæ, tussi obno-
 „ xius, ingruente tempestate valde humida
 „ & aqvilonia corripitur iterum catarrhali
 „ febre, quam 9^{no} die acerbus capitis &
 „ oculorum dolor excipiebat, & tandem
 „ plenaria seqvebatur cœcitas. In oculis ni-
 „ hil apparebat vitii, nisi qvod pupilla ad-
 „ huc se contrahebat, & puer lucem a te-
 „ nebris distingvere poterat : ceterum vero

(x) Ibidem Obs. 5.

„ & appetebat bene, & egerebat rite. Post-
„ quam igitur per integrum semestre frustra
„ usurpatis varii generis medicaminibus hoc
„ affectu laboravit, & nostræ curæ traditus
„ fuit, nihil adhibuimus, quam pilulas no-
„ stras balsamicas quavis semel hebdoma-
„ de adsumendas, & externe linteum bal-
„ samo vitæ nostro madidum bis de die fron-
„ ti & temporibus adplicari curavimus: un-
„ de... factum est, ut intra paucas hebdo-
„ mades omnem recuperaverit visum,„

C A P U T VI.

CONCUTIENTIA NERVOS, VASA.

§. 105.

Quantum sæpenumero sola vis mechaui-
ca, corpori animali applicata, ad stagnantes
humores in motum ciendos, langventesque
fibras excitandas valeat, complures id mor-
bi testatum faciunt, qui adhibita illa vel
prorsus percurantur, vel certe curatioris
initium, a nullo alio remedio expectandum,
faciunt, quæ postmodo ulterioribus remediis
usurpatis facile absolvitur. Haud enim de-
sunt exempla surditatis ex ictu capitis vel

duro ligonis exercitio, aphoniæ ex vestitione in rheda, atrophie fustigatione, ascitis lapsu in abdomen, &c. sanatorum. Quid igitur mirum est, amaurosin quoque ab ejusmodi vi mechanica seu fortuito seu studio applicata interdum fuisse profligatam? Et vero apud J. MEEK'REN (y) existat historia viri, qui „ gutta serena jam per aliquot annos laboraverat; ad hujus curam varia usurpata fuerant medicamenta, at sine ullo successu. Obambulanti aliquo tempore occurrebat bajulus aliquis ebrius, trabem humeris gestans, hic incerto gradu procedens trabe hac caput cæci hominis percutiebat adeo, ut in humum prociderit. Surgens ex cerebri commotione visum restitutum animadvertit „. Atque hinc conjici potest, quid ab arte factis id genus concussionibus nervorum vasorumque commodi in amaurosi curanda sit expectandum. Sunt autem tres sere modi ad id institendum, nempe

§. 106.

I. ELECTRICITAS, cujus efficacia in plurimis aliis nervorum affectionibus curan-

(y) Obs. med. chir. Cap. 30. p. 131.

dis in vulgus jam nota est, & cui plurimum alii, alii nihil fere, tribuendum voluerunt. Non omnes utique amauroses hoc remedio sanantur, imo multæ non sanantur; A. G. RICHTERUS (z) utique „electricitatem, jam „statum illud contra pertinacissimos morbos „remedium, iterum iterumque adhibuit, & „ne semel quidem tantillum boni effectus „præstitisse observavit „. I. L. SCHMUCKER (a) eandem, probatissimis licet methodis adhibitam, numerosis in casibus citra ullam prorsus utilitatem instituit. Nihil etiam commodi ex illa retulerunt cum HAENII (b) æger, tum alius apud J. SAUNDERS (c) 15 annis amauroticus, cui ter quaterque incassum electricitas fuit administrata. Perinde „in duobus „ægris, inquit C. LINNAEUS (d) „frustra scintillas ex oculorum viciniis educas „fuisse, frustra quoque commotionem „adhibitam vidimus electricam, ut vix ali-

(z) l. c. p. 86.

(a) l. c. p. 25.

(b) Vide §. 46.

(c) Med. Comment. von Edinburgh 3 Th. 4 St. 2 Abschn. 8. Fall. p. 437.

(d) Confectaria electr. med. Resp. r. ZETZELI apud HALLER. disp. ad morb. hist. & cur. facient. Tom. I. No 4. p. 59.

„ quid hoc in morbo de electricitate spera-
 „ re liceat „. Hæc ut ut sint „ nihilo ta-
 „ men minus negari, inquit SCHMUCKER
 „ (e), nequit, amaurosin electricitate fuisse
 „ sanatam: forsitan quædam tantum illius
 „ species est, quæ ut propius determinetur,
 „ magnopere foret optandum „. Mihi sa-
 ne historias morbi hujus undiqve conqvi-
 renti, plurimæ occurrere observationes a-
 mauroseos electricitate aut prorsus aut ali-
 quatenus saltem sublata, quas hic Lectori
 ex ordine promam, ut ex iis suo ipse judi-
 cio electricitatis hocce in morbo pretium me-
 tiatur. C. F. SIGEL (f) „ vir 36 annor. (ait)
 „ temperamenti sanguineo-cholerici, alias
 „ firmæ valetudinis & robusti corporis, per
 „ paucos modo dies rheumatico brachii fini-
 „ stri dolore vexabatur. Dolorem, cum le-
 „ vis effet, non tanti momenti esse existi-
 „ mavit, quin nundinas oppiduli haud pro-
 „ cul . . . distantis . . . frequentare posset.
 „ Iter itaqve aggressus est, tempestate licet
 „ quam maxime turbida nivaliqve ac vento
 „ vehementissimo per omnem viam versus
 „ faciem ipsius sæviente. Vix vero dimi-

(e) l. c.

(f) Nov. act. nat. cur. Tom. 6. Obs. 13.

„ dium viæ stadium attigit, cum ipsi caput
„ gravari, oculorum acies, qva antea gau-
„ debat, diminui, sensim obnubilari, tan-
„ demqve omnis visus prorsus evanescere
„ inciperet. Miserrimus cœcus neqvicqvam
„ vel solis vel flammæ luminis percipiens,
„ nunc redux factus . . . auxilium . . . implo-
„ rabat. . . (Medicus) igitur ad primas re-
„ purgandas vias ante omnia emeticum ex
„ rad. ipecac. ʒj. ☐ emet. gr. j. postea ve-
„ sicatorium magnum nuchæ applicandum,
„ & ʒem laxantem e rad. Jalappæ, resina
„ ejusdem, & ʒrio dulci paratum, svasit;
„ singula vero in irritum effectum: etenim
„ capitis gravativus dolor, densissimaqve
„ caligo, continuarunt. Væ Ses itaqve in
„ brachio & in fronte, nec non Pulv. leni-
„ ter laxantes e conchis citratis, ☐ Vitriol.
„ & Pulv. rad. Jalappæ 4 diebus sumendos
„ præcepit; deinde pilulas de succino CRA-
„ TON. resina Jalappæ & ʒrio dulci auctas,
„ una cum infuso theiformi ex rad. saponaria,
„ sarsaparillæ, fœniculi, herba salviæ,
„ rosmarini, sem. fœniculi, ac essentia ex
„ essent. succini alcalisata, TRa ʒ ii acri,
„ Ωu Θ* anisato composita per 2 septimanas
„ præscripsit usurpandas. Vesicatorium in-
„ super & brachio imponebatur, scarifica-
„ tiones in brachiis & tergo instituebantur,

„ Pulv. errhinus ex helleboro albo naribus
 „ admittebatur. Sed incassum omnia ...
 „ Ego ... oculos ejus aspiciens pupillas se-
 „ renas, fulgidas, nimis vero dilatatas, iri-
 „ disque circulum maxime attenuatum a-
 „ nimadverti. Vesicatoriorum stigmata erant
 „ sanata, cœcitas vero summa, dolor capi-
 „ tis noctesque infomnes hucusque conti-
 „ nuaverunt, neque aliud oculis esse obje-
 „ ctum, quam densissimum alborem parietis
 „ iustar dealbati cœcus asseverabat. Igitur
 „ præsentibus Physico aliisque testibus cœ-
 „ cum per horæ $\frac{1}{4}$ placentæ ceræ satis am-
 „ plæ insistere, catenamque electricam ma-
 „ nu tenere jussi, & ego per hujus tempo-
 „ ris spatium continue, mox digiti mox fer-
 „ reæ clavis acumine, scintillos e fronte
 „ palpebrisque superioribus ejus clausis eli-
 „ cui. His peractis, fellæ ut insideret, ca-
 „ tenulamque electricam arctissime manu te-
 „ neret, monui. Quo facto ad methodum
 „ MUSCHENBROECKIANAM eum con-
 „ cutere cœpi. Apparatus erat 1^{mo} Glo-
 „ bus vitreus 10 pollic. in diametro; 2^{do}
 „ Rota lignea, qua cum agitabatur globus;
 „ 3^{tio} Tubus ex lamina ferrea stannò obdu-
 „ ctus 4 pedes longus. 4^{to} Catenula lagenam
 „ vitream aqua repletam ambiens, cujus ex-
 „ tremitati globulus metallicus affixus erat.

„ 5^{to} Baculus ferreus a tubo in aquam lage-
„ næ dependens. 6^{to} Lagena patinæ stannæ
„ aqua repletæ imposita. Frictio globi vo-
„ la nuda, non pulvinari, facta est. Glo-
„ bulus catenulæ affixus fili sericei ope,
„ quod ei alligatum erat, fronti, præsertim
„ vero regioni nervum ophthalmicum con-
„ denti ac palpebris superioribus ipsis equi-
„ dem clausis admovebatur, hoc saltem dis-
„ crimine, quod prior frontis pars fortissi-
„ mis concuteretur electricis ictibus, poste-
„ rior vero palpebrarum iisdem levissimis
„ feriretur. Utriusque generis ictuum æger
„ prima vice ultra 20 expertus est. Effe-
„ ctus erat plane nullus. Nox insomnis,
„ caputque gravatum, ut antea. Secunda
„ electrificatio eodem modo peracta somnum
„ per aliquot horas conciliabat: 3^{tia} somnum
„ non promovebat, sed rheumaticum bra-
„ chii dolorem resuscitabat: 4^{ta} dolorem
„ brachii augebat: 5^{ta} electrificatione vix per-
„ acta cæcus candelæ flammam, obscure li-
„ cet, primo iterum videbat; somnus per
„ aliquot horas tranquillus erat: 6^{ta} 7^{ma} 8^{va}
„ præter auctum brachii dolorem nullam ex-
„ hibebant mutationem: 9^{am} apostema ru-
„ bens ad metacarpum sinistrum secutum est,
„ causa forsan proxima doloris brachii: 10^{ma}
„ capitis gravitatem sustulit. Visus huc uf-

qve cohibitus interdiu noctuqve præter
candelæ flammam nil sentiens nunc meli-
orem induit statum, ut mane sequenti
qvævis objecta per nebulam qvasi densam
observaret æger. Eodem die apostema
ruptum pus emisit. Ab 11^{ma} usqve ad
18^{am} electrificationem nebula densa, qvæ
hucusqve oculis obversabatur, post sin-
gulas electrificationes extenuari, visus ma-
gis clarescere cœpit; objectorum vero
mensuram veram, licet clarius videre
nunc contenderet, plane ignorabat, nec
cavum a pleno, plenum ab eminente,
ne dum colores vere discernere poterat.
Conditio visus hæc plane singularis inci-
tabat me, ut attentius iterum intuerer
oculorum constitutionem. Observavi pu-
pillas plus justo adhuc majores, ac ali-
quam quidem, sed vix conspicuam mobi-
litem earumdem... Igitur balsamum se-
quens quid valeat, continuatis electrifi-
cationibus, periclitari mecum constitui.
Balsamum, quod ex olei nucistæ expressi
3ij, olei cajeput, anthos, lavendulæ,
succini albi aa gtt. 5 compositum erat,
mane & ante cubitum pisi magnitudine
palpebris superioribus clausis illini jube-
bam. Effectus voto respondebat; electri-
fationes enim porro vices iteratas, bal-

„ famiqve usum 14 diebus continuatum con-
„ strictio pupillarum naturalis seqvebatur,
„ visusqve in pristinum redibat statum, per
„ 16 nunc annos, ac in hunc usqve diem
„ minime mutatum „. Hocce in primo ca-
su liqvet, electricitatis ope, post vacuatio-
nes præmissas, stagnantes circa nervos opti-
cos humores ita fuisse loco motos, ut ad
brachium, unde frigoris vi ad caput com-
pulti fuerant, denuo remearent, visumqve
etli non ex toto, tantopere tamen fuisse re-
stitutum, ut balsami demum applicatione
reddito vasis nervisque tono pristinus recu-
peraretur. Eodem fere cum successu electri-
citatem adhibuit W. HEY (g) pluribus a-
mauroticis: horum prima (b) erat matrona
mediæ ætatis, quæ post cruentam sincipitis
contusionem brevi facileqve sanatam cœpit
sentire, quasi sanguis e loco ante vulnera-
to intra cranium deorsum stillaret, quod
tamdiu duravit, quoad usqve post 6 fere
hebdomades a vulnere accepto oborta am-
blyopia intra 4 dies in perfectam adolevisset
amaurosin, quo facto sensatio illa stillicidii

(g) Med. Bemerk. u. Unters. von Aerzt. in Lon-
don 6 B. No 1.

(b) Ibidem 1 Fall.

defuit. Inducta vulnere cicatrice haud prius capite doluit, quam invadente cœcitate, quæ leni cum dolore recta supra orbitas fœviente occēpit. Altero amblyopiæ die sanguinis ꝑviiij e brachio detractæ, totidemque die 4^{to} demptis vesicans inter scapulas admotum, ac nervina exhibita. Die 10^{mo} inspecta pupilla ampla est reperta. Hoc in statibus quotidie super fella vitreis prædita pedibus locatæ ex oculis partibusque bulbos ambientibus, præsertim quæ rami quinti paris supra infraque orbitam decurrunt, electricæ scintillæ eliciebantur circ. per $\frac{1}{2}$ horam. Postea ictus æquali tempore ad partes affectas appliciti, qui subinde ab uno tempore transversim per caput ad alterum determinabantur, præprimis vero a foraminibus supra & infra orbitalibus versus occiput. Quotidie simul sub noctem dabatur bolus:

R. Calomel. pp.

Camphor. aa. gr. iiij.

Conserv. Cynosb. q. f.

Unde semper alvus bis terve mota. Sed cum inde die 14^{to} molimina ptyalismni orta essent, misso ꝑrio cathartica data ptyalismum brevi repressere. Primis 3 hebdomadis quotidie clauso curru foras vehebatur. Post aliquot a cœpta curatione dies visus redibat, ut lapsa hebdomade homines jam in conclavi

præsentes numeraret : post 6. 7. hebdomades epistolam legit , nondumque finito trimestri pristinum recepit visum. Sub initium hujus revertentis lucem non nisi ab oblique incidentibus in pupillam radiis percipiebat, quo tempore omnia ei apparebant cœrulea ; universimque objecta ad latera sita jam discernebat, antequam ea , quæ recta ex adverso sita erant, videre posset. Alter (i) puer erat novennis , cui sine manifesta causa visus sensim usque adeo hebescebat , ut legere nequiret ; initiales tamen literas unciales , notosque sibi homines vicinissimos clara in luce discernebat adhuc. Post bimestre eadem ipsi medela adhibebatur , data nempe quotidie camph. gr. ij. cum Calom. gr. j. usque dum ptyalifinus occepit, simulque ad electricam machinam est admotus. Prima inde mox hebdomade visus emendabatur , & post 14 hebdomades sanus discessit, ea utriusque oculi acie pollens, ut uno æque ac altero oculo minutissimum typum legeret citra ullum discrimen. Tertius (k) fuit futor 27 annor. robustus , qui cum obortum Novembri mense nuchæ & occipitis

(i) Ibidem 2. Fall. p. 4.

(k) Ibidem 3. Fall. p. 6.

dolorem posito inter scapulas vesicante vix profligasset, minui continenter visum sensit, usque dum amauroticus evasisset, ut nempe ne maximi quidem typi literas, nec familiares suos, nisi e solo vestium colore, discerneret, neque objecta e directo sita æque rite ac lateraliter videret: sine duce tamen adhuc incedere potuit. Anno insequente die 26^{ta} Martii, præmissis ob levem adnatam inflammationem hirudinibus ad tempora, eadem illi medela fieri cœpta: bolus ante somnum semper sumendus constabat e Calomel. gr. ij. & opii gr. ss. cujus usus mox suspendebatur, ut primum vel gingivæ vel caput inflabatur. Interdum dabatur catharticum, & 2^{da} (Aprilis?) cœpit bis quotidie sumere Cort. Peruv. ʒj. continuato simul ꝯ li bolo, donec 6^{ta} Junii multum emendatus discessit. Per annum pene electricitatem expertus initio nil inde profecit; postea tamen sensim emendabatur, donec oculo lævo pristinus rediisset visus: dexter autem, qui principio morbi maxime fuit affectus, non nisi mediocriter profecit, ac post relictum nosocomium iterum sensim amauroticus evasit; lævi tamen oculi visus tanto evasit acrior, ut & labori suo homo vacare, & minutissimum typum legere quiverit, eo solo superstito vitio, quod a vehementi labore vel

* multo potu identidem parumper minui observaverit. Porro (1) vir 34 annor. boni habitus, mense Februario peregre profectus, inter deambulandum sub dio subito percepit dolorem recta supra supercilia cum insigni memoriæ læsione, tantaque diminutione visus, ut objecta proxima non nisi obscure, remotiora vero nullatenus discerneret. Amicum cominus adstantem accedere volens ita ab eo aberravit, ut in sepes impegerit: quapropter aliena opera ad amici domum perductus, attracto ibi naribus sacchari Ω u, comestoque pauco sinapi, non modo levamen in syncipite momento sensit, sed visus quoque ejus eatenus inde est emendatus, ut iter suum prosequi posset; sed ob labefactam memoriam re infecta domum redire coactus est. Dolor syncipitis non ultra 1 diem durans, post se ingratam in eo loco dierum aliquot sensationem reliquit. In itinere usum Ω us sacchari sæpius iteravit, sed non eodem amplius, ac prima vice, cum successu. Die morbi 4to domum reversum Væ So, cathartica, vesicans inter scapulas, aliaque exhibita nihil levarunt. In oculis inspectis præter pupillas admodum dilatatas nil vitii

(1) Ibidem 7 Fall. p. 19. sqq.

visebatur. Oculo dextro æger cum difficultate legebat, sinistro horologium agnovit, non item indices ejus numerosque discrevit: visioque hæc optima erat, objecto parumper deorsum ab axe pupillæ versus internum latus locato; e directo enim positum minus distincte cernebat, extrorsum vero ab axe situm nullatenus. Omnia clara objecta maculam obscuram habere ipsi videbantur. Altera vice perfusus electricitate jam multo melius vidit, spatioque mensis fere prorsus convaluit; continuavit nihilominus 10 adhuc menses electricitatis usum, sicque pristinum recepit visum, cum quo paribus incrementis redibat memoriæ vigor, qui tamen non ante trimestre ex toto est recuperatus. Primis curationis 14 diebus sumpsit 8 bolos, singulos e Calomel. gr. iij & Camph. gr. jv. sed electricitati eodem hoc tempore non poterat quotidie, uti postea, ob negotia vacare. Haud secius (m) puella 13 annos nata a 5 aut 6 mensibus dolorem syncipitis, præsertim vero in tempore dextro & supra dextrum oculum, quæsta simul intra hoc tempus visum imminui sensit: sex vero hebdomadis ante receptionem in nosocomi-

(m) Ibidem 5 Fall. p. 9.

um ab aquæ in urna gestatione incidit in colli ac nuchæ dolorem & rigiditatem in latere sinistro secundum trapezii musculi longitudinem, dum vel minimum convertere caput conabatur. Rigiditas hæc a voluntaria muscutorum contractione, ad caput firmiter tenendum immobile, & a dolore ex motu tuendum, orta videbatur: cum autem vis horum muscutorum sola non sufficeret ad firmum ita tenendum caput, cogebatur illud ægra manu una occipiti altera mento subdita sustentare, sicque sibi ambulationem effecit tolerabilem, ac jacens utcunque commode habebat. Verum colli dolor hebetudoque visus adeo celeriter increvere, ut A. 1770 die 7^{mo} Septembr. in curam nosocomii receptæ oculus dexter perfecta jam laboraret amaurosi, cum pupilla ad omne subitum clarumque lumen prorsus immobili, ac sine ullo lucis sensu: in oculo sinistro levis mobilitas pupillæ superfuit, illoque colores vividissimos discernebat, ac objecta debite sita, obscure licet, videbat. Ceterum adfuit appetentia, somnus, &c. Hocce ergo in statu præbebatur bolus:

R. Calomel. gr. j.

Camph. gr. iij.

Conf. q. s. S. quoties citra pyralissimum fieri potest; simulque collum quoti-

die bis terve unguento volatili perfricabatur, & ad electrificandum sæpissime illi accedendum erat, quod plerumque ter per hebdomadam factum. Sub prima electrificatione, postquam fere per $\frac{1}{4}$ horæ scintillæ, citra omnem adhuc ictum illatum, sunt elicite, jam oculi dextri pupilla fiebat mobilis, & ægra lucem eodem percipiebat; ac intra paucas hebdomadas omnia symptomata admodum sunt imminuta, ut ægra jam incedere potuerit, quin occipiti manum subderet, mentum tamen adhuc manu semper firmiter tenendum fuit vel pollice eidem appresso vel complicato strophio supposito. Interea aere in Octobri admodum pluvio existente cum se refrigerasset ægra, deterior evasit: idcirco, quod 5 milliaria ab urbe abesset, vetita est redire, usque dum 16^{ta} Novembr. in nosocomium est recepta. Collo capiteque deterius tunc, quam initio Octobr. habuit; sed oculis magis pollebat, nam sinistro prorsus vidit, dextro vero nonnulla objecta sensibilia (v. g. ligna transversa in listis fenestrarum), si ita sita erant, ut ab iis radii oblique ad retinam venirent, etiam cognoscebat. Rursus ergo tentata est electricitas, at non pristino cum successu; quippe quæ cephalalgiam semper causerit, ut nec simplicem electrificationem ægra ferre potuerit. Impræsentiarum

dextrum capitis latus & collum admodum doluit, quod malum e variis remediis iterata vesicantia ac pediluvia calida plurimum levabant; posteriora tamen ad tempus tantum profuere, dum vesicantia constanter essent utilia. Alvus ad segnitiam prona Nitr. cathartico cum TR^a sacra aperta servabatur. Tandem principio Januarii 1771 accessit anorexia, debilitasque cum pulsu solito debiliore ac celeriore. Datum cum fructu decoctum Corticis cum elix. Vitriol. Abhinc debilis manlit, jam obambulans, jam multos dies lecto affixa. Februarii 24^{ta} alium in locum translata post 14 dies obortis colli capitisque doloribus lecto affixa vomere omnia ingesta coepit, ac sensim manibus primum, dein pedibus capta est, paralyfi lateris primum lævi, dein dextri brachium cum crure invadente. Ultimis 14 vitæ diebus nec lotium nec alvum retinuit, & uno alterove ante obitum die sensu omni privata est, visu tamen in postremum descripto statu ad finem usque perseverante: Postremis 6. 7. hebdomadis ægra ne minimum quidem capitis motum citra summos dolores pati quivit; ultimoque trimestri pulsus nunquam lentus est observatus, vibrationum numero ultra 100 semper edito. In cadavere cerebrum sanum est repertum, at ventriculi anteriores

humore distenti erant claro, ad ignem non coagulabili, cujus quantitas in omnibus 4 ventriculis ad 3jv æstimabatur. In thalamis nervorum opticorum nihil erat discriminis; at optici nervi inde a concursu ad foramina usque optica dispari fuerunt habitu, sinister quoad omnia sanorum instar, dexter vero cum firmior multo tenuiorque, tum per omnia cinereus, quod inciso utroque præsertim videre fuit. In collo processus dentiformis toto ambitu cariem exhibuit, cartilagineum ejus tegumentum cum ligamento illum ossi occipitis jungente prorsus erat perfundatum; perinde nexus ejusdem cum imo atlantis arcu erat vitiatus, ut capite antrosum flexo spinalis medulla per hunc processum comprimeretur admodum. Circa hunc locum cariosum pus nullum erat, nec inter colli musculos. Exscissis autem 4 supremis vertebrae una cum eas jungentibus musculis, & excoctis tandem, donec omnia mollia ab ossibus facili opera secessere, præter cartilagineas inter vertebrarum corpora, superficiebus vertebrae 3^{tae} & 4^{tae} firmiter adhuc coherentes, insignis tum primum caries apparuit; siquidem vertebrae 4^{tae} corpus lævusque processus transversalis aliquatenus, plus vero vertebrae 3^{tae} transversalis lævus cum obliquo superiore, erosi erant; ima ve-

ro ac 2^{da} vertebra usque adeo fuerunt erosæ, ut 2^{dæ} processus transversus sinister prorsus, & fere etiam obliqui ambo hujus lateris fuerint destructi; ex arcu etiam atlantis tota anterior pars ac multum e postica lævo in latere desuit, ac maxima etiam processus obliqui sinistri pars periit, ut condylus lævus occipitalis sulcro seu basi caruerit. Neqvis vero in hæcenus allatis casibus 8^{rio} præ electricitate plus tribuendum esse arbitretur, producendi sunt casus amauroseos sola electricitate aut prorsus aut magna ex parte sanata. Binus ipse etiam HEY suppeditat, videlicet (n) lithanthracum fossori 20 annor. ante 9 fere menses sub ipsa ambulatione subito visus adeo minuebatur, ut ægre viam domum repererit. Nullos colores, nec homines, qui umbrarum instar apparebant, discretevit. Nullus aderat seu capitis seu oculorum dolor. At die 3^{tio} post ita denuo vidit, ut lineamenta vicinorum hominum discerneret; legere tamen haud potuit. Trimestri sic exacto in fossa carbonaria laborans subito iterum, deteriusque, quam ante, visum amisit, simulque vertiginem & obtusum capitis dolorem nactus est, oculosque

(n) Ibidem 6 Fall p. 16.

adeo sensibiles , ut lumen citra molestiam non ferrent. Post 3. 4ve menses cessantibus vertigine & cephalæa visus pro aliquot hebdomadis aliquatenus emendatus est ; abhinc vero ad primi insultus statum fere de novo recidit , nisi quod nunc oculo dextro objecta vicina clari coloris discernebat , vultus tamen humanos nullatenus ; & objecta e latere semper intuebatur ante , quam , quid sint , eadem determinaret : sinistro autem oculo nil nisi lucis quidpiam sentiebat. Ambo oculi inspecti amaurosin exhibuere ; nisi quod subitam ad lucem pupilla dextra manifeste contraheretur , dum lævæ diffusæ iris vix mobilis esset. Datis ad speciem pilulis e mica panis , quæis olei essentialis ope odor conciliatus , electricitati subiectus est , cujus a prima adhibitione lævi oculi visus ita emendabatur , ut matrem suam , si ad lævam ejus stabat , videret , pupilla etiam sensibilibiter se se contrahente. Intra quatrimum solus jam urbem ex intervallo 2 milliarium accedere potuit. Post 3 septimanas , quæis fere quotidie veniebat , emanfit , aliisque remediis usus iterum evasit deterior , accedente etiam inflammatione ; renuit nihilominus ulterius electricitatem , quod non eosdem effectus , quos initio , porro inde experire-

tur. Alter (o) pannifex fuit 38 annor. qvi A. 1768 mense Novembri a vestibus pluvia madidissimis non exutis incidit in cephalalgiam præsertim syncipitis cum sensatione frigoris & aliquali stupore. Paucis post diebus supervenit amblyopia oculi dextri, sensim increfciens, usque dum illo legere nequivit. Vere insequenti desiit sensatio frigoris, stuporqve, superstita visu hebeti. Et cum prægresso Decembri in nives cecidisset, male inde primum habuit, nullo licet postea seu capitis seu alius partis dolore fixo inde relicto, ac post horam sinistri quoque oculi visus minui cœpit, posteroque die ita fiebat deterior, ut perpetuo densa præ oculis nebula versaretur. Frustra Væ Se, nonnullisque aliis remediis adhibitis, circiter 1ma post lapsum in nives hebdomade, cum jam utrumque oculum amaurosis teneret, electricitatem sine ullis aliis remediis experiri cœpit, a qua visus aliquot post dies emendabatur, & fere post trimestre pristinus oculo sinistro rediit, sic ut ejus adminiculo & pannum texuerit, & commode legerit; dextro autem eatenus tantum est redditus, ut majores typi literas vix discerneret, objectaque opti-

(o) Ibidem 4 Fall p. 8.

me dignosceret, dum parumper sinistrorsum locarentur. Hocce in statu mansit usque ad A. 1772 finem Februarii (p); principio autem Martii, cum ambulando incaluisset, ac postea funus comitatus sub dio stetit, obtusum capitis dolorem cum sensatione frigoris denuo percipere coepit, ac post unum inde alterumque diem visus iterum fiebat sensim deterior, ut demum nec legere, nec familiares, nisi vicinissimos ac certo sub situ, discernere quiret. Idcirco post 14 inde dies electricitate, ut ante, uti coepit, sub qua fere post hebdomadem capitis dolor minuebatur, visus autem emendatio non nisi post 3 hebdomades emendari coepit, intra quod tempus interea dolor & frigus capitis penitus desierunt; lævo tum oculo sensim redibat visus, ac post trimestre abhinc dexter quoque pedetentim ita recuperavit aciem, ut demum illo mediocris magnitudinis typum, *Cicero* typographis dictum, legeret, atque objecta e directo posita multo, quam anno ante, melius distingueret, quæ tanto etiam clariùs cernebat, si ad lævam parumper locabantur. Continuabat porro etiam electricitatem citra ulla alia remedia, nisi

(p) Ibidem p. 24. sqq.

quod ob dolorem quemdam lateris, qui paucis post septimanis ab amauroseos recidiva invalit, bis parum sanguinis miserit, qua evacuatione facta ille desit. Binas quoque id genus observationes jam multo ante literis mandavit S. T. QVELMALZ (q), nempe „ cum fusor typorum æneorum me adiret „ (ait), eamque oculorum, in primis sinistri, infirmitatem maximam accusaret, ... „ organum propterea hoc probe introspexi, „ obque dilatationem immobilitatemque pupillæ concurrentem, seu mydriasin, lentisqueve transparentiam, amaurosin... subesse indicavi... Applico vires electri factis temperatas, aut sufficientes (quas sic affecti oculi per experientiam longe melius perferunt, atque integro usu gaudentes), oculo firmiter clauso ad foramen præcise supraorbitale dictum, per quod nervus ophthalmicus WILLISII per palpebram vicinasque partes dispersus penetrat, quandoque ad inferiorem temporalis regionis partem angulo oculi propinquam mutata facie eas determino. Qua

(q) Progr. de virib. electr. med. apud A. HALLER.
Disput. ad morb. hist. & curat. facient. Tom.
1. No 3. p. 54.

„ per quartam horæ partem continuata ope-
 „ ratione , frictione levi palpebræ præmissa,
 „ apertoque postmodum oculo , ego mobi-
 „ litatem quamdam iridi inductam , ipse ve-
 „ ro claritatem majorem observat. Effluxo
 „ dierum quorundam spatio eadem ratione
 „ opus administro , effectus majores in po-
 „ sterum expectaturus. Hebdomade una &
 „ dimidia præterita ipse æger de majori vi-
 „ sus acie non sine gaudio me certio-
 „ reddit , precibusque instat , ut semel atque
 „ iterum remedii indigenti ipsum participem
 „ reddam . . . Juvenis 18 annor. ante hos
 „ 12 annos variolis laborans tempore infe-
 „ quenti visus amittit aciem , demumque,
 „ pupilla semper dilatata existente , sic in
 „ ipsam amaurosin incidit , ut dexter ocu-
 „ lus tantillum visionis exerceat , sinister
 „ omni potius destitutus sit. Mater atque
 „ propinqui urgentes auxilium anxie id obti-
 „ nent , ut miserum electricis effectibus com-
 „ mittam , quos , semel applicata opera , tam
 „ propitios invenit , ut non solum levitatem
 „ capitis ac totius corporis , sed visus quod-
 „ dam exercitium , quamvis valde exiguum,
 „ obtinuerit , repetitaque aliquoties actione
 „ sensim ipsius augmentum prædicet , spem-
 „ que mecum concipiat fore , ut successive
 „ ex voto increseat , ubi interstitio quodam

„intercurrente (quod hac in re omnino ob-
 „servandum commendandumque est) re-
 „petitio instituta fuerit „. L. SPEN-
 GLERO perinde duo id genus casus obtige-
 re amauroseos, in quibus utiliter adhibuit
 electricitatem, nimirum (r) feminæ a 5^{to} vel
 6^{to} ætatis anno amauroticæ, ac plures jam
 simul annos fluxum oculorum passæ simplex
 primum seu vulgaris electricisandi ratio est ad-
 hibita per 10 dies, quolibet vice ad $\frac{1}{2}$ ho-
 ram protracta, non sine emendationis indi-
 ciis: deinde vero alternis vicibus electrica
 vis per aquam reddebatur actuosior eo cum
 successu, ut 2^{imo} die cæca jam & colores
 discerneret, & sine duce ad machinam veni-
 ret, & fluxus oculorum esset expertus. Alter
 (s) tiro erat pannifex, qui 10 annis oculo
 sinistro amaurotico adeo vidit nihil, ut ad
 varia corpora incursum in isthunc oculum mi-
 nantia illo ne conniveret quidem; dextro
 vero tam exiguus etiam superfuit visus, ut
 nec maximum typum legere illo quiret. Va-
 lidis itaque commotionibus in oculis nucha-

(r) Briefe, welche einige Erfahrung. der electrisch.
 Wirkungen in Krankh. enthalten 2 Br. §. 7.
 p. 25.

(s) Ibidem 3 Brief. §. 3. p. 27. sq.

quæ excitatis postero die tiro oculo dextro minutum typum ad notabilem distantiam prompte jam legebat, sinistro autem illatum conclavi lumen cernebat, ac ter instituta electrificatione cum colores vestium tum monetas discernebat, donec post sextam electrificationem utrique oculo visus pristinus redisset. Sed maxime memorabilem casum suppeditat A. FLOYER (t) de infante ad 7 annos nato, qui citra ullam manifestam vel causam vel prophasin utroque repente oculo cæcus evasit cum pupillis adeo diffusis, ut iridis prorsus evanidæ color (quem parentes lucidum griseum esse ajebant) nullatenus detegi posset, totaque pellucida cornea velut una macula nigra esse videretur. Iris ad omnia consveta tentamina mansit immobilis, & æger nullum lucem inter ac tenebras discrimen perceperat. Die igitur morbi 4^{to} vel 5^{to} tentata electricitas, nempe filo ferreo uno, ad vitreum usque globum pertingente, cruri, alio vero capiti infantis connexo, ubi vitrum satis electrificatum erat, filum ferreum a crure veniens machinæ admovebatur, quod tam vehementem causavit ictum, ut infans præceps in-

(t) Journ. Britannique Fevr. 1752. p. 217.

genti cum clamore corruerit, vixque adduci potuerit ad operationem alterum sustinendam; tribus tamen inde adhuc toleratis ictibus lecto dein compositus usque ad sequentem diem in sudore insigni jacuit, maneque clamavit, fenestras ab se cerni. Iris tum jam tenuis annuli instar lucido-grisea in conspectum se dabat, infansque umbras a luce discernebat. Hoc ipso ergo die hesternæ operationes eo cum fructu sunt iteratæ, ut die insequente iris tota fere jam prodierit, parumper simul mobilis facta. Die 3^{to} infans objecta jam, die 4^{to} etiam colores discernebat, pupilla jam usque adeo facta mobili, ut die 5^{to} omnia in oculo essent secundum naturam, visusque adesset pristinus. Pridie cœptæ electricitatis vesicans ad nucham applicatum, brevi postea, nulla nempe ejus habita ratione & cura, consanato sponte loco, utrum ad curationem quidquam contulerit, dici nequit. Præter hosce ægros electricitate vel aliquatenus vel plane curatos alii quoque supersunt 17 numero a JANINO (u) peculiari sibi methodo electricitatem citra machinam electricam applicandi, quos inter matrona erat utroque oculo

(u) ROUX l. c. Tom. 39. Mai A. 1773. p. 441.

adeo

adeo amaurotica, ut radios solis ardentis clarissimos nullatenus perceperit: hæc metho-
do Cl. Viri non modo ita deinceps visum recuperavit, ut minutissima quæque objecta (v. g. capillum 6 pedes ab oculo distantem) cerneret, sed etiam ab anorexia, vigiliis, corporisque debilitate, quæis cum amaurosis juncta erat, est vindicata. Sed ut efficax hocce ad amaurosin remedium rite ac sine ullo, ut aliquando est observatum, discrimine adhibeatur, operæ pretium erit isthic nonnulla subjicere, quorum ope scopuli omnes in electricitatis usu vitari queant. Enimvero

§. 107.

Cautelæ aliquæ hic usque adeo sunt necessariæ, ut iis neglectis electricitas aut frustra aut cum detrimento etiam ægrorum adhibeatur. Nempe

I. *Recens sit morbus*; secus in morbo vetusto raro successus habet. „ Nunquam
„ vidi, ait W. HEY (x), eam in morbo,
„ si ultra biennium duravit, vel tantillum
„ profuisse, licet multis hujusmodi in casi-

(x) l. c. p. 22,

„ bus a me tentatam „. Profuit nihilominus ejus pannifici triennium jam amaurotico, & QVELMALZII juveni, binisque SPENGLERI ægris, multo etiam diuturniorem amaurosin passis: ut proinde ne in vetusto quidem etiam morbo electricitas negligenda esse videatur.

2. *Evacuationes* sanguinis, alvi, &c. præmittendas esse ego quidem censeo, tum ad pericula quæque vitanda, tum ipsam quoque curationem facilitandam.

3. *Diuturna* sit electricitatis ac sedula administratio; quandoquidem in HEYI pannifice non nisi post trimestrem ejus continuum usum emendari visus occepit. Hæc forte etiam est ratio, cur frustra dicatur electricitas in nonnullis fuisse tentata, quod non illico, velut in SAUNDERI (y) casu, profuerit. Accidit etiam, ut non pauci, quævis principio electricitas visum celeri incremento emendabat, postea vero non perinde, vel tædio moræ, vel quod penitus curari haud desiderent, velut mendicabula, ne stipem causa miserationis ablata perdant, vel alio quocunque casu, curationi huic valedicant. HEYI certe lithanthracum fossor tæ-

(y) V. de §. præcel.

dio moræ ad machinam tandem reverti renuit. Juvabit hic duos expertissimi Medici Vindobonensis C. MAYRI casus in medium adferre, quorum etsi curatio e paulo antedictis causis absoluta haud fuit, quod tamen & phænomenis quibusdam peculiaribus se se commendent, & electricitatem liquido ostendant haud supervacuum fuisse, e reliquarum consortio expungendæ non videbantur. Videlicet I. KÜHN (2) miles 47 annor. A. 1770 citra manifestam causam subita lævi oculi amaurosi correptus est; lapsso tamen aliquo post tempore lucis iterum tantillum percepit, nimirum post longam ac operosam oculi directionem observabat lumen magnitudine cuspidis acus capitatæ. Post triennium oculus dexter a febre acuta continua perinde ita debilis evasit, ut homines viciniore ægerrime, ad 10 vero vel 12 passus remotos nullatenus agnosceret. A. 1774 mense Januario ad Cl. MAYR venientis oculus lævus perfectam exhibuit amaurosin, dextro lucis adhuc aliquid usurpante. Ad machinam proinde electricam ducto Ja-

(2) Beytrage zu verschiedenen Wissenschaften von einigen Oesterreichischen Gelehrten I Bande p. 409. sqq.

nuarii 19^{no} die prima vice 30 admodum leves commotiones factæ, quæ ope exigui ad id destinati instrumenti nervum opticum lævi oculi tremulum in motum civere. Nocte insequente levem dolorem pungentem isthoc in oculo sensit, cetera nil mutationis observatum. Altera vice 50 commotiones factæ, a quæis lucem diurnam utcunque sensit, quam perceptionem 70 aliæ validiores commotiones auxere. Inde post bis datos 80 ictus annulum album præ oculis interdum observabat, ac post tertium illatos 80 ictus pupilla demum abhinc magis mobilis, dum æger oculum alternis vicibus claudere & aperire jubebatur, fieri cœpit. Quindecim deinceps consequentes electrificationes nihil mutationis fecere, at 16^{ta} eodem ictuum, ut ante, numero illato, absoluta quadrangularem lucis figuram in fenestra observavit. Postea cum 14 sequentes aliæ electrificationes nil denuo notatu dignum præstitissent, post 15^{am}, dum pristinatis ope solaris radius in 7 colores primigenios super conclavis pariete diremptus ei spectandus præberetur, nullum ex iis alium, præter solum violaceum, videre quivit, nec nisi post vicies ac semel iterum institutam electrificationem præter violaceum colorem flavum etiam atque aliquid e rubro conspicabatur. Inde rursus

quindecim vicibus machinæ admotus nil mutationis sensit; at 16^{ta} vice tentamine absoluto vesperi lumen candelæ sanorum instar vidit, & sub 34^{ta} electrificatione observavit pedes prætereuntium hominum moveri, ac vestes quoque eorundem parumper dignoscebat; spesque erat fore, ut æger continuato hocce labore tandem pristinum recuperet visum, qui post 92 vices ad machinam tam brevi tempore tantum lucratus est, licet morbus 4 jam annos durasset. Alter (a) C. AUDERER 52 annor. pyrobolarius invalidus A. 1773 a draſtico emetico sumpto oculis pedetentim deficere cœpit, donec visum ita omnem perdidit, ut nec adversi solis lucem ullatenus sentiret. A. 1774 die 27 April. inspecti oculi ambo reperti sunt amaurotici, præterea dimidiam oculi dextri corneam tenuis pellicula alba obduxit, amboque bulbi continuo erant in motu, velut si eodem tempore unum in latus traherentur. Væ Se facta, die 29 April. primum machinæ admotus est, 20 lenibus utriusque oculo illatis commotionibus. Altera vice sexagies commotio facta, idque ad sextam usque vicem: tum vero albam interdum lu-

(a) Ibidem p. 411. 699.

cem observabat. Tribus sequentibus vicibus electricitas eodem modo adhibita nil mutavit; at post 4^{am} cœpit obscuram lucem, veluti dum illucescit, sentire, & ubi duodecies machinæ vim sustinuit, corpus solem inter & oculos intercurrentes animadvertibat. A 13^{ta} vice ad 18^{am} nil mutationis obtentum: undevicesima autem vice tolerata electricitate pellicula oculi dextri plus pellucere, atque in exiguas hinc inde insulas fastiscere conspiciebatur, pupillis etiam paulisper factis mobilioribus. Operatio 23^{ia} sustulit motum, qui a spasmodicis musculorum bulborum proficisci videbatur. A 24^{ta} ad 38^{am} vicem nil mutatum. Post 39^{am} electrificationem ager motum digitorum oculo dextro obsectorum, non item figuram eorundem, observare potuit: idem quoque, at obscurius, oculo sinistro percipiebat. Postea intermissa 14 dies ob negotia electricitate visus iterum evasit obscurior. Eapropter ad machinam 40^{ma} jam vice revocatus eundem commotionum, ut ante, numerum sustinuit, & 42^{da} vice albidam iterum lucem sensit. Post 44^{am} vicem rursus digitorum ob oculos motum, sed haud ita clare, uti a 49^{na} electrificatione, percepit. Nihilominus post 46^{am} vicem ipsum hunc motum, digitosque, & eorum interstitia cernebat, donec a 66^{ta}

operatione hominum quoque præterentium figuras discerneret. In hoc quoque agro multum affulgebat spei, ut continuato ad machinam labore visus tandem prior revertatur. Hæc ubi legissem, exitum casus utriusque sciendi percupidus, ipsum Expert. Virum Vindobonæ conveni sciscitaturus, quis demum tentaminum horum fuisset successus? Candide ille, ac sine ambagibus reposuit: frustra suam se his miseris addixisse operam; quandoquidem alter eorum metu captus, ne recuperata videndi facultate e numero invalidorum expungeretur, comparere amplius ad machinam detrectaverit; altero autem quid post suum e nosocomio discessum factum demum fuerit, se prorsus ignorare. Et vero Budæ quoque hodie dum vivit mendicus utroque oculo amauroticus, qui a Cl. Viro G. de VEZA Facult. nostræ Directore ad machinam electricam stipite quotidiana (7 crucig.) conductus, ubi visum se inde recuperare observasset, adduci neutiquam potuit, ut ad ulteriora tentamina reverteretur, maluitque homo ob senium ad panem labore quærendum invalidus inutili carere visu, quam aliorum misericordia.

4. *Methodus electricisandi tutissima esto.*
Non possum ipsa hic mei olim in Physicis

venerandi Præceptoris ac Viri in electricis
experimentis veterani J. HERBERT (b)
verba dare: „ ut rerum electricarum (in-
„ quit ille), non item medicinæ, peritos
„ admonerem, & officii & charitatis in
„ omne genus humanum rationes deprecare
„ videbantur, ne scilicet rei electricæ gnari
„ nisi de Medicorum peritorum consilio cu-
„ rationibus electricis se ingerant, ne sus-
„ ceptas nisi his assistentibus continuent.
„ Transit electricitas per viventium nervos,
„ velut si per angustos horum canales mo-
„ dica quantitate transeat, obstructos refe-
„ rare potest, ita nimia copia deducta eos
„ extendere, rumpere, dilacerare etiam
„ potest. Inde potissimum factum est, mul-
„ ti ut sint, qui electricitate fortiori, quam
„ res posceret, adhibita machinam hodie
„ graviorum malorum, quam quæ ad hanc
„ attulere, causam detestentur. Quid quod
„ sub ipsas electricas curationes non infre-
„ quenter eveniat, ut malum electricis irri-
„ tationibus suo loco emotum uno sublato
„ alios morbos inducat, non jam sola ele-
„ ctricitatis, sed totius rei medicæ peritia

(b) Theor. phenom. electricit. Schol. 2. ad Prop.
5. p. 198.

„ sanandos, Quum centenis & amplius hu-
 „ juscemodi curationibus adfuerim, in ma-
 „ lis inveteratis præsertim, semper expertus
 „ sum, paralyfim similesque morbos sæpe
 „ in febres rheumaticas, sæpe in catarrhos,
 „ sæpe in diarrhœam non nisi a perito me-
 „ dico sanandam, degenerasse „. Hunc
 etiam in finem proponit machinulam usibus
 medicis citra omne ægrorum periculum ac-
 commodatam (c). Ac demum (d) „, quum
 „ de loco (ait), quo applicanda electrici-
 „ tas videatur, dubium est, id optimum ex
 „ experimentis, quibus assistebam, esse di-
 „ dici, si hæc ab uno partis læsæ extre-
 „ mo ad alterum traducatur, parti tam uni,
 „ quam alteri laminæ metallicæ, quibus ca-
 „ tenulæ cum armaturis communicantes affi-
 „ xæ sunt; tæniarum fericarum ope appli-
 „ centur. Nil hic attinet de nervorum fle-
 „ xibus situque in ictuum applicatione folli-
 „ citum esse, ipsa sibi electricitas, quacun-
 „ que demum parte illabatur, viam minimæ
 „ resistentiæ nervos deligit „. JANIN (e)
 quoque, ubi varia incommoda a machinis

(c) Ibidem. Schol. 3. p. 199.

(d) Ibidem. Schol. 4. p. 200.

(e) l. c.

electricis proficisci memorasset, addit, peculiarem ac tutam sibi esse methodum electricitatis in amauroseos curatione adhibendæ, quam se una cum observationibus publici juris facturum pollicetur.

§. 108.

II. EMBROCHE quoque ad concutien-
dos nervos ac vasa, ubi ab his infarctis illi
paralytici evasere, longe utilissima observa-
tur. Exemplum illustre hanc in rem apud
L. HEISTERUM (*f*) reperire est de juve-
ne 16 annor. qui post diuturnam cephalæ-
am, cophosin, obstructiones, &c. amauro-
si, omnem prorsus visum adimente, citra ul-
lum in oculis conspicuum vitium, correptus
est: contra quam cum nec interne crebrius
data purgantia, ac postmodo nervina hocce
in morbo efficacissima, nec extrinsecus ad-
hibita genuum tenus pediluvia, cucurbitæ
scarificatæ pone aures, ad occiput, latera
capitis, ac scapulas, vesicantia, collyria ac
fotus vaporesque ophthalmici, errhina,
fonticulus in pede ac brachio, ipsumque nu-

(*f*) Med. chir. u. anat. Wahrnehm. 2 Band. No

chæ fetaceum, quidquam effatu dignum præstitissent; nec plus a §rio interne externeque ad ptyalismum usque administrato fuisset effectum: tandem embrocatio hunc in modum tentata est:

R. Rad. Valerian. ʒj

Herb. Euphras.

—— Rosmarin.

—— Veronicæ

Summit. Hormini aa. M. j.

Baccar. Juniperi M. ij. Conc.

cont. D. species pro balneo coqvendæ in lebetes aquæ, e qua tam calida, quam ferri ab ægro potest, in vannum effundendum est tantum, ut æger indusio a tergo patulo indutus umbilico tenus in eadem sedere possit. Eadem etiam aqua aliud vas epistomio præditum replendum est, & supra ægrum verticaliter locandum, ex eoque, ubi aliquamdiu ille in vanno sedit, aqua aperto epistomio calida in ejus spinam dorsi infra fetaceum per $\frac{1}{2}$ horam aut diutius, modo id citra incommodum ægri fieri queat, est emittenda. Exactis ita 3 hebdomadis idem & deinceps labor continetur, at ita, ut in dorsum primum aqua aliquamdiu stillat, dein vero alternis vicibus jam in caput, prius ad palmi spatium rasum, jam iterum in spinam fluere sinatur, & quo tempore dorsum pul-

fat, complicatæ mappæ eadem aqua madidæ calide capiti applicentur, ac perpetui caloris, stases in vasis capitis discussuri, conservandi causa mappis his calida illa aqua sæpius affundatur. Quotidie autem epistomium aperiat largius, ut ita vis aquæ capiti dorsoque illapsuræ evadat major, donec rivi instar effluere sinatur. Post balneum calide siccatus æger, indusio calido, siccaque mitra capiti indita, lecto compositus tectusque quiescat, ac leni sudori vacet, haustis aliquot vasculis vel potus theati vel infusi ex Euphrasie M. ij. & Lign. Sassafr. ʒj, concessio etiam interdum uno alterove vasculo Caffee. Diæta sit idonea, ac sub pastu semper vini poculum unum alterumve hauriatur, cujus in mensura j. Rad. fœnic. ʒj. & Euphras. M. ij. sacculo indita suspenduntur, affundendo eidem vesperi tantundem semper, quantum interdiu est exhaustum. Hæc per 3 hebdomades quovis mane, & ultra, calido in conclavi facienda imperabantur, nec sine successu; nam visus inde juveni eatenus rediit, ut omnia majora objecta videret: sed querebatur simul videri sibi, quasi quid ob oculos oscillaret, hosce etiam lucis, ob dolores inde emergentes, esse impatientes, eam proinde admota illis fascia arceri hætenus debuisse. Fasciæ loco Cl. Auctor velum

sericeum aut viride aut nigrum e fronte pro oculis protegendis suspendendum fvasit; nec non collyrii fequentis ufum:

R. Rad. Valerian. ꝯss

Herb. Hyffopi p. j. M. F. ꝯ D. in nodulo e findone alba in vino coqvendus, qvo oculi aliquoties intra diem abluantur. Qvis tandem ulterior fuerit morbi eventus, literis mandatum non eft.

§. 109.

III. AGITATIO *nervi frontalis* crebrior ad hancce claffem perinde eft referenda, cui experimento non VALSALVA modo, fed MORGAGNIUS qvoqve plurimum tribuit, ea præfertim in amaurofi, quæ læfiones fuperciliorum palpebrarumve (g) confequi folet; concuffionis enim genus eft, quæ ad ipfum ufqve nervum opticum, eumqve ambientia vafa propagatur, ficqve ftagnantia movet, langventesqve fibras excitat, vitiofum nervi frontalis in læfionis perfanatione ad vicina nexum folvit, &c. Enim vero, noti cujusdam chirurgi uxor, inquit j.

(g) Vide §. 47. b).

„ VALSALVA (b), cum gallum Indicum
„ capere vellet, ab eo percussa est impacto
„ ungve in alterum oculum. Paucus e vul-
„ nere exstillavit sanguis, & visus illico a-
„ missus est. Varia adhibita sunt remedia,
„ incassum tamen omnia. Triduo post ad
„ me accedit mulier auxilium implorans.
„ Oculum diligenter inspicio, si forte aliqua
„ læsio deprehendi possit. Sed nec externæ
„ partes nec internæ quidquam indicant
„ læsi. Dum igitur mecum ipse meditor,
„ quidnam interius insensibiliter vitiatum
„ esset, unde visus amissio penderet; suspi-
„ cio incidit de annulo nervi optici mode-
„ ratore, qui a vulneris dolore convulsus
„ spirituum affluxu impedito malum istud in-
„ duxisset. Itaque animadvertens nervum
„ supra orbitam oculi erumpentem transire
„ prope annulum, ipsique propagines ner-
„ veas impertiri, illum, quæ ab orbita erum-
„ pit, valida pollicis compressione agitavi.
„ Vix hoc factum est, cum statim pristina
„ oculo visio restituta est,,. Hinc etiam
„ teste J. B. MORGAGNIO (i),,, felix illa
„ rami e 5^{to} nervorum pari ex orbita ad

(b) Dissert. anat. 2. §. 11.

(i) Epist. anat. 13. No 7.

„ frontem se reflectentis agitatio, per quam
 „ mulieri videndi facultas est a VALSAL-
 „ VA restituta, ab ipso postea tanti fiebat,
 „ ut in consilio pro nobili viro, qui inter
 „ venandum ex resiliente in oculum plum-
 „ beo globulo quam exiguo leve vulnuscu-
 „ lum & vix conjunctivam lacerans tunicam
 „ retulerat, & visum tamen, interiore nul-
 „ la apparente læsione, fere statim amise-
 „ rat, præ ceteris, quæ indicabat, reme-
 „ diis hoc ipsum commendaverit. Ejus qui-
 „ dem rami aptum motum & convenientem
 „ posse in ejuscemodi casibus aliquando o-
 „ pitulari, inde, opinor, licet intelligi,
 „ quod idem ramus contra læsus atque com-
 „ punctus effectum videtur contrarium
 „ edere „.

C A P U T VII.

U L C E R A A R T E F A C T A.

§. 110.

U L C E R A *artificialia* quantum in amaurosi curanda possideant efficaciam, vel ex eo liquet, quod nullum pene existet adversus huncce morbum remedium hætenus cognitum, cui tot curatæ amauroses deberentur,

qvot arte excitatis ulceribus profligatas historia medica exhibet. Fortuiti vero casus mortalibus, ut videtur, ad hæc præsidia amplectenda facem prætulērunt. Nam ALEX. BENEDICTUS (k) „vidit Hyaderæ supra „frontem vulneratum cœcitate & vulnere „liberatum senem visu hebetiore nonagenarium „. Et alibi (l) „Germanus quidam (ait) Hyaderæ octuagenarius, visu „hebetiore, eqvo abactus corrente in terram ex improvise, fere exanimatus, in „lapidem capite conjectus est, confregit „frontem: in ea curatione (id enim vidimus) visum recepit „. Similia apud CAMERARIUM (m) quoque legere est. Sane & sanguinis e frontis venis effluxus, qui hic accidit (n), & concussio encephali stagnantia in motum ciere valens (o), & demum ulcus ex vulnere natum, de quo hic sermo est, ejusmodi in casibus egregie opitulantur. Naturæ proinde vestigiis insistentes Medici arte vulnera ulceraque exci-

(k) De corp. morb. L. 3. in proem.

(l) Ibidem cap. 29.

(m) Memorab. Cent. 7. §. 4.

(n) Vide §. 94. a).

(o) Vide §. 105.

tare non sine succēssu in animum induxere, idque vel acribus remediis, ut sunt cantharides, ranunculus, lapis causticus; &c. vel vivo igne, vel ferro denique. Hujus ergo loci sunt

§. III.

I. *Vesicantia*, quæ GOHLII (p) puellæ, SCHMUCKERIQUE militi (q) æque ac puellæ (r), nec non WESTPHALI (s) puero, uti & feminis HANNEMANNI (t) ac TRE-COURTII (u), eximiam tulerunt opem. Apud G. W. WEDELIUM (x) „ a morbil-
 „ lis restitutus puer rustici sensit aliquando
 „ dolorem capitis, hinc, oculo ad speciem
 „ illæso, perfectam cœcitatem; purgante
 „ vesicatorioque restitutus, observante B.
 „ LUDOVICI „. Applicantur vero pro re
 nata ad femora vel brachia, nuchamve, aut

(p) Vide §. 28. No 1.

(q) Vide histor. 7.

(r) Vide §. 66. No 2.

(s) Vide §. 73.

(t) Vide §. 114.

(u) Vide §. 113.

(x) Diss. de amaurosi C. 3. p. 17.

pone aures, aut ad ipsum etiam caput.

„ In casu desperato, inquit L. RIVIERIUS

„ (y), postquam omnia remedia frustra usur-

„ pata sunt, vesicatorium toti capiti raso

„ instar cucuphæ admotum multum aliquan-

„ do profuit, etiam bis aut ter admotum,

„ ubi priores vesiculæ & excoriationes ex-

„ siccatae fuerint,,. Præprimis autem capiti

utiliter admovetur vesicans, ubi achores re-

tropulsi, amaurosin causantes, revocandi

sunt; quam in rem sequentem narrat histo-

riam J. M. MÜLLERUS (z) „ filiolus...

„ octennis ... post scabiei capitis subitam

„ exsiccationem etiam subito gutta corripi-

„ tur utriusque oculi serena. Antequam ad

„ ipsum accerserbar, cum internis sudorife-

„ ris vesicatorium nuchæ fuit applicatum.

„ Postea die 14^{ta} Dec. A. 1716. ego con-

„ sultus sequentia præscripsi:

R. MP. de succin. CRAT.

℞ dulc. 16ss ʒti aa ʒss.

Extr. Coloc. gr. j. F. pil. No xj.

„ pro una dosi. Sequenti die:

R. Rad. Valerian. ʒss.

—— Irid. Florent. ʒjss

(y) Prax. med. L. 2. C. §. ult.

(z) Nise. nat. cur. Cent. 8. Obs. 32.

Flor. Anthos
 ——— Salviæ aa ʒſ
 Herb. Euphras. ʒij.
 Sem. Fœnic.
 ——— Anifi
 ——— Siler. mont.
 ——— Rutæ
 Lign. Aloes
 Cubeb. aa. ʒj.
 Macis
 Nuc. mosch. aa. ʒij.
 Cinnamom.
 Cort. Culilab. aa. ʒjv.
 † Cinnabarin. ʒiij.
 Ambr. grif. gr. ij.

Sacch. ad p. o. De qua tragea
 „ hora i ante prandium & cœnam ac sub
 „ introitum in lectum cultell. cusp. 2 pro-
 „ pinand.

R̄. Raf. lign. sanct. ʒiij
 Cort. Culilab. ʒijſ
 Lign. Saffafr.
 Rad. Sarsapar.
 ——— Chelidon. maj.
 ——— Enul. aa. ʒſ.
 ——— Valerian. ʒj.
 Herb. Salv.
 ——— Beton.
 ——— Chamædr.

Herb. Rorismar. aa. M. ij.

—— Euphras. M. iij.

Flor. Scabios. M. jss.

Sem. Siler. mont.

—— Rutæ

Cinnam. ac. aa. ʒij.

Caryoph. ʒj ss. M. coq. in mens.

„ jss ∇^a font. ad $\frac{1}{3}$ part. conf. de quo de-
 „ cocto mane hora 7^{ma} & pom. h 3^{ta} un-
 „ cias iij bibendas, & intra scapulas rad.
 „ Valerian. rec. pendendam pro amuleto,
 „ id quod singulis 4 vel 6 diebus reiteran-
 „ dum, empl. item vesicatorium capiti, il-
 „ loque remoto, ad fluorem per aliquot
 „ dies sollicitandum, empl. Saturnin. cum
 „ $\frac{1}{3}$ parte empl. vesicatorii permixtum ap-
 „ ponendum præcepi, ac fonticulum intra
 „ 2 & 3 colli vertebam inurendum curavi.
 „ Præterea usum aeris temperati in hypo-
 „ causto temperate calido, ciborum conco-
 „ ctu facilius, bene coctorum, chylum lau-
 „ dabilem præbentium, svasi, non nimis ta-
 „ men pro una vice, idcirco etiam parum
 „ hor. i. post assumptum decoctum pro
 „ jentaculo & merenda concessi, quia ap-
 „ petitu, more ætatis istius, insigni gau-
 „ debat. Potus sit cerevisia bene defecata
 „ vel vinum dimidia ∇^a parte dilutum, &
 „ cubitus elato capite; oculi interdum & ves-

„ peri præſente candela velamento munian-
 „ tur: aerem vero frigidum, fumofum, hu-
 „ midum, hypocaustum nimis calidum, ali-
 „ menta frigida, falita, acida, fumo indu-
 „ rata, acria, aromatibus nimis condita, du-
 „ ra, viſcoſa, flatulenta, concoctu difficilia,
 „ lacticia, merum, vigilias motum nimium,
 „ iram, mœſtitiâ, fletum &c. fugienda di-
 „ xi. Patiens . . . morigerus in omnibus
 „ fuit, . . . ita . . . ut circa finem ejusdem
 „ Dec. proritata inde iterum capitis ſcabie
 „ admodum humida paulatim viſum denuo
 „ obtinuerit, ac literarum etiam minorum
 „ typum, ut anteqvâ corripereſſet cœci-
 „ tate, cognoſcere potuerit, . . . In amauroſi
 „ a ſpaſmibus & convulſionibus prægreſſis
 „ enata tollenda veſicantia capiti, nuchæ,
 „ artubusve applicata perinde opitulatur: ut
 „ vel hinc appareat, id genus amauroſes
 „ ab humorum verſus caput vi ſpaſmorum
 „ congeſtione eſſe repetendas. I. S. KNISE-
 „ LII (a) Pater 71 annorum catarrhis obno-
 „ xius poſt ſuperatam pleuritidem, in abſceſ-
 „ ſum pectoris abeuntem, huncqve ipſum etiam
 „ ſanatum, reſumptis viribus conſecto eqvita-

(a) Diff. ſiſt. hiſt. pleuritid. &c. 4to Tubing. 1690. Præf.

tione aliquot milliarius salebroso itinere domum redux incidit in colicam spasmodicam cum siti, anorexia, cardialgia, vomitu, alvo clausa, & comate agrypnose, a qua die 4^{to} arte vindicatus post vinum generosum largius potum recidivam sustinuit ad remedia contumaciorem, cujus mane diei 4^{ti} syncope accessit. Ab hac æger incongrua locutus, oculis fixis nil nisi ludibria vidit, scilicet toto ubique cubiculo florum elegantissimorum agmina. Sub vesperam reversa eadem debilitate plena ingruit amaurosis cum capite adeo turbato, ut nec, ubi sit, recordaretur æger. Verum usu antispasmodicorum interno, extusque naribus, vertici, temporibusque admotorum, injectis enematis, excitatisque in brachiis & cruribus vesicis, rursus demum convaleuit. Sic „ Co- „ mes... ex febre bene vel male curata „ nescio, inquit C. RAYGERUS (b), factus „ colicus, propter ingentes dolores & per- „ tinaces constipationes, a quodam pharma- „ cum sumpsit purgans, ac post illud duo „ vel tria sudorifera. Ecce derepente fit „ paræticus, nec multo post etiam visus sen- „ sit diminutionem, omniaque quasi per ne-

(b) Schol. ad P. SPINDLERI Obs. med. 3. p. 6.

„ bulam se cernere afferuit, tandem dum
 „ mecum loquitur, nec me nec alios nec
 „ quidquam aliud se videre exclamat, imo
 „ nescire diesne an nox sit, vegetis tamen
 „ nec quidquam turbatis oculis. Statim cu-
 „ ravi applicari vesicatorium cervici, exhi-
 „ bui caput corroborantia, antiepileptica,
 „ nec intermissis clysteriis convenientibus:
 „ sic intra 24 horas recuperavit visum, ac
 „ successive etiam membrorum rediit usus.
 „ Simili modo . . . circa medium Julii Com-
 „ missarius quidam bellicus gravissima colica
 „ vix liberatus, ob errorem in victu com-
 „ missum iterum recidivam passus, derepen-
 „ te, remittentibus prope omnibus ventris
 „ torminibus, prægressa solum vertiginosa
 „ capitis debilitate, mane hora 4^{ta} excœca-
 „ tur. Huic itidem ad verticem & pedes
 „ applicata vesicatoria cum clysteriis & con-
 „ fortantibus cephalicis visum circa 8^{am} ves-
 „ pertinam illius diei restituere,,. Neque
 minus proficua sunt in puerperarum amauro-
 si. J. P. ALBRECHTI (c) mulier post primam
 puerperii hebdomadem secunda valetudine
 transactam visu fatiscente repente ambobus
 oculis, citra conspicuum in iis vitium, cœ-

(c) Misc. nat. cur. dec. 2. ann. 9. obs. 81.

ca evasit. Præmissis universalibus data specifica volatilia, aperitiva, ac discutientia; extrinsecus vero ptarmica, cucuphæ, & vesicantia administrata visum post aliquot hebdomades revocarunt pristinum. Ne vero aut nervina interna aut enemata simul usurpata plus præ vesicantibus effecisse cuiquam videantur, subiectus N. TULPII (*d*) casus cavebit: ex epilepsia „ in... inscium par- „ tum (narrat ille) ... incidit ... affinis „ nostra ... sed privabatur hæc præterea „ visu; licet foris nec hebetudinem acies, „ nec aliud aliquod vitium ostenderet externa oculi tunica ... Excelluere ampla „ vesicatoria internis feminibus admota, „ quorum ope retrahebatur tam potenter „ sanguis sursum vergens, ut... evaserit „ feliciter... illam cœcitatem, quam plerique Medicorum iudicaverant habere „ certam desperationem „. Sed nihil de palpebris hætenus dictum est, ad quas etiam, si paralyticæ simul sunt, vesicantia admodum fructuose applicantur, cuiusmodi bina exempla suppeditat F. H. L. MUZZELL, nempe (*e*) musicum 39 annor. robustum,

(*d*) Obs. med. L. I. C. 10.

(*e*) l. c. Cas. 15. p. 94.

plethoricum, semper sanum, subito media nocte dolor vehementissimus capitis expergefecit, qvi illato lumine momento in oculum dextrum trajecit, palpebra superiore paralytica reddita, ut dimidium bulbum tegetet pendula, qva manu sublata pupilla amplissima ac parum admodum mobilis apparuit, dum contra pupilla læva effet & arcta & mobilis; liberrimus tamen erat bulbi dextri motus. Sano oculo ad illatum lumen clauso candelæ pro una binæ, eæque inversæ, & ab se qvasi ad $\frac{1}{2}$ milliare distitæ oculo affecto apparebant. Facta in pede Væ Se largissima, amploque inter scapulas vesicante posito, ac data potione ex aquis stillat. cum Nitro, sale Absinth. citrato & syrupo, postero die sumpsit Resinæ ppt. & ꝑ. dulc. aa. gr. viij. unde largissimæ dejectiones secutæ. Ab his omnis capitis dolor desuit. Cumque per aliquot dies m. & v. camph. gr. ij. cum Nitro usurpasset, nihilque præter oculum laboraret, sepositis remediis, vesicante vero uberrimo in fluxu conservato, oculo læso diu noctunque applicabantur sacculi herbar. aromaticarum quæ lil. convall. °° still. salviæ, &c. humectati; palpebræque illitum ungv. nervinum cum oleo still. mistum, quæ intra 14 dies motum & pupillæ utcunque, & palpebræ, ut pro dimidia par-

te elevari posset, reddiderunt. At singulare fuit, quod in emendatione morbi æger objecta inversa quidem adhuc ac duplicata videret, sed minus jam, quam ante, & non nisi ad 6 circ. pedes ab se distantia. Cum vero palpebra non ultra dimidiam altitudinem elevaretur, impositum fuit arcui superciliari vesicans in arcus formam excissum, 2. 3ve tantum horis ibidem relinquendum: quod cum æger ultra 6 horas non dempsisset, vesica insignis, emplastri magnitudinem æquans, enata est, quæ incisa multum laticis præbuit. Dolorificum hoc remedium intra aliquot dies visum ita emendavit, ut duplicata quidem adhuc objecta non nisi ad 2 jam pedes distare viderentur. Continuatibus vero aliquot adhuc hebdomades remediis, intercalatisque catharticiis, pristinum & palpebra motum & oculus visum, sine ulla ejus debilitate superstita, recuperarunt. Alter (f) vir 48 annor. admodum plethoricus, a vicesimo ætatis anno hæmorrhoidum fluxum, citra ullos tamen spinæ dorsi dolores aliave incommoda, sæpius passus, 40mo ætatis anno rheumaticos arthriticosque dolores crebrius experiri cœpit, qui demum

(f) Ibidem Cas. 16. p. 101. sqq.

post statas vernaes & autumnales Væ Ses ac
 therapiam idoneam in mitem regularemque
 podagram abiere, pollici pedis infidentem,
 lecti vero calore ac leni diaphoresi, debito-
 que regimine semper dissipandam, pristina
 sanitate revertente. Sed impatiens ejus æ-
 ger, Væ Sbus, qveis accersitam rebatur, ab-
 stinere plane constituit. Triennio ita sine
 paroxysmo transacto, tandem verno tempo-
 re in vertiginem incidit cum vehementi ce-
 phalalgia, insignique in occipite, præsertim
 dextrum in latus, frigoris sensu. Vertigo
 Væ Sni brachii cessit, at cephalæa cum fri-
 goris sensu crevit. Dato ꝑe temper. albo
 cum aliquot grauis camphoræ, admotoque
 nuchæ vesicante, post vehementem noctu
 a ꝑe sudorem mane mitius habuit. Impe-
 rata inde in lecto perspiratio. Cum autem
 deinceps æger dies aliquot remediis caruisset,
 capitis dolor enormiter crevit cum vasorum
 encephali, dum æger dextrum in latus cu-
 babat, tam vehementi pulsu, ut $\frac{1}{2}$ caput a
 fronte ad mandibulæ usque basin acerbissime
 dolens eum latus mutare cogeret. Tandem
 nullo in situ levius habens omni caruit so-
 mno: nam si quando parumper indormiit,
 capite vel antrosum vel in latus nutante
 doloris vehementia continuo illum cum pa-
 vore excitavit. Omnes venæ videbantur

esse arteriæ. Mane expergefactus fuique compos dextram palpebram paralyticam, ad $\frac{1}{2}$ bulbum oculi dependentem observavit, quâ manu in altum sublata pupilla non modo amplissima fuit, sed etiam ad bulbi frictionem vel parum vel nihil contrahebatur, id quod in comparatione cum oculo sano præsertim videre erat. Objecta quæque velut vitrea ipsi, ac tanquam trans prisina multiplicata apparebant. Bulbi quoque motus erat præter naturam, ut qui versus externum canthum non nisi aliquatenus, versus internum autem nullatenus, moveri potuerit. Idcirco ad materiam arthriticam a capite aliorsum ducendam amplum brachio dextro vesicans, oculo vero sacculi ex herbis aromaticis Ω^u nervino cum pauxillo Ω^us Θ^* vinosi irrorati admoti, pediluviaque imperata; sed quæ, tepida licet, quod ægrum excalfacerent, doloresque augerent, omitti debuerent. Interea eodem die $V^æ$ S^o in brachio dextro, ac postero die ob durum adhuc plenumque pulsus lævo in pede, ad $\frac{3}{4}$ semper, facta. Die insequenti datæ pilulæ resolventes e gummatibus cum rheo & extr. helleb. nigri. Unde capitis dolor omnino desit, sequente somno & levamine. At post 5. 6. dies cum rursus cephalalgia molimina ingruerent, iterata pedis $V^æ$ S^e , & data lo-

co ante dictarum pilularum, quod non sat alvum cierent, alternis diebus aqua amara cathartica, alvum probe solvente, iterum sunt discussa. Verum cum oculus ac palpebra nil emendarentur, ossi frontis supra palpebram admota puls e raso raphano rusticano cum aceto vini subacto, $\frac{1}{2}$ horam ibidem relinqvenda; verum ob intolerandum dolorem haud ultra 25 minuta ferri potuit. Omnis tamen inde dolor capitis oculique evanuit, superstitite nihilominus adhuc palpebræ paralyfi, neque ad sacculos 3. 4ve adhuc hebdomadis usurpatos emendata: visus etiam, ut ante, mansit, licet pupilla constringi jam inciperet. Eapropter quotidie illitum aliquoties orbiculari palpebræ musculo ungv. nervinum cum pauxillo ℥^e cantharidum admisto, sacculique priores continenter admoti. Ex horum usu paralyfis palpebræ post aliquot hebdomades est sublata, ac bulbi motus omnes in partes evasit liber citra vel molestiam vel impedimentum. Verbo: omnia secundum naturam facta. Non est prætereundum, ægro, ubi caput redditum liberum, per complures hebdomades fuisse datum m. & v. Ω c. c. rectif. a gtt. 40 ad 60 cum ∇^a ad bonam perspirationem conservandam ac materiam arthriticam e sanguine eliminandam. Unde etiam podagra mitis ocli-

dui successit, cujus insultu finito ægro quotidie ad horas aliquot exeundum fuit, oculo interea continuo adhuc velato, usque dum ita hic sensim convaluit, ut dum sanus clauderetur, ægro illo objecta sic satis discerneret, nisi quod cuncta ei pallida apparebant. Verum dum ambobus æger oculis objecta intuebatur, nil distincte videre quivit, oculis ita se se turbantibus; ut objectum intra oculum affectum altius, intra sanum humiliter repræsentaretur. Posteaquam vero oculo sano aliquamdiu clauso æger solo affecto utebatur, iste 3. 4ve post diebus ita invaluit, ut visu polleret pristino. Podagra deinceps ordinate redibat, Væ Sesque stasis iterum temporibus erant repetendæ; secus plerumque molimina cephalalgia se se insinuabant. Qui nervi frontalis eique comitis arteria hisce in locis ex orbita egressum, distributionemque secum reputaverit, utilitatem vesicantium ibidem applicandorum haud difficulter perspiciet. Sed quocunque demum loco illa applicare visum fuerit, nunquam non binæ simul tenendæ erunt

§. 112.

Cautelæ practicæ, nimirum

a) *Vacuationes* ut aliæ vesicantibus vel præmittantur vel eodem, quo applicantur, tempore instituantur, in primis vero phlebotomiæ, dein catharses vel emeses; quippe quæ curatio & facilior & celerior efficitur. Bina hanc in rem exempla dedisse suffecerit. Narrat FOURNIER (g) rusticam ad 23 annos natam ante 9. Iove menses labore fessam in agro altum trium horarum somnum cepisse, quo excusso tanta aderat cæcitas cum diffusis immobilibusque pupillis ut ne diurnam quidem lucem perciperet. Post innumera nequicquam tentata Cl. Vir tandem secta brachii vena bihorio post emeticum præbuit, ac pone utramque aurem admovit vesicans. Postero mane ægra jam tantillum lucis percepit, vespereque ejusdem diei claritatem ejusdem jam manifeste sensit. Vesicantium plagæ multum puris dabant. Mane 3^{tio} pristinus aderat visus. Porro „ femina, inquit A. STÖRCK (b), ex acuta febre convalescens perfectam ama-

(g) VANDERM. Journ. de Medecine &c. T. 5.

(b) Ann. med. 1. Febr. p. 56.

„ rofim in oculo finiftro habuit. In ali-
 „ quibus post morbum acutum observa-
 „ vi vifum admodum debilem aut leve
 „ delirium fine pulfus agitatione, viribus
 „ autem increfcentibus hæc mala fenfim
 „ disparuerunt: unde & in hac femina
 „ fimile quid futurum fperavi; at vero
 „ fpe deceptus fui. Etenim viribus jam
 „ integris amaurofis æqve pertinax manfit.
 „ Hinc illico nuchæ iterata veficantia appli-
 „ cari juffi, & alterno die purgans drafi-
 „ cum exhibui. Qvo factum eft, ut fpatio
 „ 10 dierum ægra utroque oculo optime
 „ objecta viderit, diftinxerit. Ægra qui-
 „ dem per hæc evacuantia vires fuas amifit;
 „ verum cortex Peruvianus & diætâ probe
 „ nutriens brevi optimam fanitatem reftitu-
 „ erunt „.

b) *Suppuratio* loci a veficante exulce-
 rati longiori tempore fovenda eft, vel certe
 aliis excitatis ulceribus compensanda. Huius
 loci eft hiftoria J. D. GOHLII (i): „
 „ puella 20 annorum (refert ille), alias rite
 „ menftruata, non ita pridem de placenta
 „ fervente ante clibanum fruftulum comede-
 „ rat, & abhinc de ventriculo ejufque tur-

(i) Act. nat. cur. Vol. 1. Obf. 25.

„ bato

„ bato appetitu conqvesta est. Quæsiuit
 „ sibi ipsa remedium ex officina, nempe
 „ purgans, cujus effectus cum patientem
 „ frustraretur, superingerit jus prunorum
 „ cum fenna decoctum; sed ne sic quidem
 „ laxantem obtinet effectum, sequitur po-
 „ tius vomitus. Huic in œconomia ani-
 „ mali evenienti tumultui supervenit alius
 „ externus, qui incendium totius domus,
 „ in qua mater vidua cum reliquis suis,
 „ liberis habitat, portendebat, nisi tempe-
 „ stiva hujus casus facta fuisset medela.
 „ Et cum maxime valetudinaria hæc puella
 „ omnem super hanc rem concitatum terro-
 „ rem in se sustinuerit . . . alto mane su-
 „ pervenere convulsiones hysterico - epi-
 „ lepticæ cum tanta vehementia, ut patiens
 „ extra lectum projecta fuerit . . . Ex pri-
 „ mo paroxysmo . . . puellam cæcam, ne-
 „ minem visu discernentem, anxie oppres-
 „ sam, nec etiam sibi satis constantem in-
 „ veni . . . Ordinando liq. C. C. succina-
 „ tum cum eff. Cast. . . . cum reviserem
 „ ægrotam . . . confitebantur mater & ad-
 „ stantes, quod quidem semel & iterum de
 „ meis ordinatis guttis dederint, sed paro-
 „ xysmus semper recruderit: ubi autem sau-
 „ gvinem catti nigri (ad 9 circ. gtt.) de-
 „ dere, rediit adhuc semel paroxysmus,

Rr

„ ut secunda vice 9 guttas denuo dare per-
 „ moti fuerint, sed tunc non rediit amplius.
 „ Ita quidem patiens . . . liberata esse vi-
 „ debatur, & ad sensum redierat, visum
 „ autem amiserat. Cum oculos accuratius
 „ inspicerem, vera & completa laborabat
 „ amaurosi. Nulla intro in pupilla apparebat
 „ neque nebula neque pellicula, clara po-
 „ tius erat, iride expansa Vesicato-
 „ rium ut ista statim vespera in nu-
 „ cha poneretur, curavi, & (mirum dictu!)
 „ insequente mane obscura saltem indicia
 „ dabat redituri visus, qui, quo magis icho-
 „ ris affluxus & effluxus per locum excoria-
 „ tum sequebatur, eo magis visus repara-
 „ batur, ita ut hactenus . . . in plenum re-
 „ stituta optime valeat „. Iisdem etiam,
 „ quas modo de vesicantibus attulimus, cum
 „ cautelis applicatur

§. 113.

2. *Lapis causticus* aliudve erodens me-
 dicamentum ad cutem pone aures exulce-
 randam. Multum hisce ulceribus C. WINT-
 TRINGHAM (k) tribuit „ mihi (inquiens)

(k) Notat. & observ. in R. MEAD Monita &
 Præcepta medica ad Sect. I. Cap. 10. p.
 156. sq.

„ in usu fuit, ut locis pone aures maxime
 „ commodis caustico medicamento iniuratur
 „ cutis, quod in quam plurimis oculorum
 „ morbis insignem usum secum attulisse
 „ comprobavi; quippe transit hac via ramus
 „ arteriæ carotidis ad ipsum oculi globum:
 „ unde in hujus organi fluxionibus morbi-
 „ dis, obstructionibus variis, imo & in
 „ gutta serena, primi ordinis est remedium.
 „ In his autem apertis servandis cavendum
 „ est, ne ob nimiam humorum affluentiam
 „ diu in musculorum interstitiis stagnantem
 „ fiant sinus, fistulæ, aliaque similia, nec
 „ non & inde gangræna in cachecticis, quæ
 „ ob musculorum exiguorum cursum intor-
 „ tum ignavis pharmacopœis & chirurgis
 „ aliquando accidisse novi „. Pulchre hæc
 TRE COURTII (1) confirmat observatio
 de matrona ad 40 annos habente, quæ cum
 quinquennem nuchæ herpetem frustra variis
 oppugnatum opera denique empirici retro-
 pulisset, post bimestre leucorrhœam, quo-
 vis mense 7. 8. dies affligentem, nacta est.
 Hacce autem circiter post annum una cum
 fluxu menstruo cessante incidit pedetentim
 in amaurosin; cui demum jam septimestri

(1) Chirurg. Abhandl. u. Wahrnehm. p. 179. sqq.
 R r 2

cum catameniis a 10 mensibus suppressis ita medicina fieri cœpta: sanguis prima die e brachio, altera e pede missus, biduo post datum catharticum, inde potus aquæ mineralis ex Passi imperatus; tandem vesicans inter scapulas affixum, ac pone quamlibet aurem ulcus lapide caustico excitatum. Oculus uterque ad impressionem lucis, si quando vitium opticonum nervorum solveretur, arcendam, fascia obductus est. Die ab applicato vesicante 8^{vo}, ab adhibito lapide caustico 6^{tus} erat, ægra fascia, quæ quotidie sub deligatione ulcerum solvebatur, ablata videre se aliquid sensit; die 9^{no} jam colores etiam parumper discernebat; ast die 10^{mo} eos discernere non amplius valens nil nisi densissimam nebulam vidit: eo quod pridie vesperi inscio invitoque Medico per horam variis objectis intuendis oculos fatigasset. Sed cautius postmodo se hac in re gerens pristinum sensum recuperavit visum. Ulcus nuchæ a vesicante ad sanationem ductum, relictis per semestre in fluxu iis, quæ pone aures erant. Sic ægra ab amaurosi juxta ac herpete liberata est: sæpius tamen catharticum adhuc sumere, atque in biennium inde semel ut minimum quotannis venam in pede secare jussa. Quod si vero nec vesicantia nec ulcera caustico pone aures

excitata satis efficacia esse observentur, tunc observatis iisdem cautelis (m) excitandi erunt

§. 114.

3. *Fonticuli*, quorum ulcera prioribus longe esse efficaciora solent. Sic J. L. HANNEMANNUS (n) „ ad me (refert) „ accessit femina . . . annor. 35 . . . Hæc „ mihi de quodam miro visus affectu con- „ quæsta: scilicet mane usque ad horam „ 10 perfecte videre legereque potest, me- „ que præsentē hora 9^{na} matutina legit. „ Circa 10^{am} visus caligine obducitur, ut „ non queat legere, sed literæ solito ma- „ jores, ast fractæ, apparent. Antequam „ caligo ingruit, cutis in fronte convelli- „ tur. Oculi ipsi semper sicci sunt, nec „ unquam sordes ex iis effluunt. Multis „ sine successu usa. Optime omnium pro- „ fuit vesicatorium, quo fluente optime vi- „ dit, recluso autem rediit caligo. Dabam „ ei tragæam ex cortice Winterano, costo, „ cassia caryophyllata, semine fœniculi,

(m) Vide §. 112.

(n) M.sc. nat. cur. dec. 2. ann. 5. obs. 117.

„ foliis fenne, diagrydio, ☐^o vitriolato,
„ &c. Die 25^{to} ad me rediit, ufumqve
„ ☧ris laudavit, optime vidit, qvamdū illo
„ ufa eft, ut legere potuerit fine impedi-
„ mento. Qvadam autem interveniente
„ triftitia rurfum visus debilitatus eft. Sva-
„ fi fontanellam; qvandoqvīdem veficato-
„ rium tam proficuum & oppido utile ex-
„ perta fuerat „. Idem hic Auctor alibi
qvōqve (o) fonticulorum in tollendis visus
vitiis utilitatem perfcripfit, nempe „ Chi-
„ liarcha . . . visus imbecillitate acrique
„ defluxu cum rubedine oculorum laborans,
„ cum adverfus hoc malum omnia præfidia
„ frustra experiretur, fontanellam ipfi fva-
„ fit Medicus; cui confilio obediens tam
„ fingularem fucceffum jam experitur, ut
„ & ea, qvæ antehac vix oculo perfpicil-
„ lis armato confpiceret, nunc acute fine
„ perfpicillis cernat, & qvidem fenex me-
„ lius, qvam ante decennium. Chirurgo
„ cuidam . . . ante oculos mufcæ & cu-
„ lices obverfari videbantur, hicqve fon-
„ tanellam facit in brachio finiftro. Hujus
„ beneficio visus naturali claritati reftitutus,
„ mufcæqve obvolantes evanuerunt. Alius

(o) Aët. med. Hafnienf. Vol. 3. Obf. 12.

„ quidam puer rustici filius . . . omnimoda
 „ oculorum imbecillitate laborans, ita ut
 „ lucem ægre ferret, hic primo in nucha
 „ habuit fontanellam sine successu; tandem
 „ consolidata rursus fontanella in nucha
 „ unum in brachio alterum in pede ipsi fe-
 „ cerunt fonticulum. Hinc jam optime ha-
 „ bet, acute cernit, splendidissimam lucem
 „ oculi admittunt „. Perinde s. SCHULTZ
 (p) narrat binas virgines vestales ab incho-
 ata cœcitate, ut nec nere nec literas inter-
 noscere jam quirent, ope fonticulorum,
 præmissis præmittendis, fuisse prorsus libera-
 tas. Cum autem fonticuli variis corporis
 in locis excitari soleant vel eodem vel dis-
 pari effectû, W. BROMFIELD (q) optime
 eos hocce in morbo, cum primis vero, si
 is post vim illatam capiti, effusis intra en-
 cephalon humoribus, obortus est, super
 additamento futuræ temporalis excitari ob-
 servavit, facta secundum totam hujus ad-
 ditamenti longitudinem incisione eidem ex-
 acte respondente. Cum enim hæc dictæ
 futuræ pars plerisque in craniis diutissime re-
 periat pervia, reliquis futuris sensim abo-

(p) Misc. nat. cur. dec. 1. ann. 3. obs. 156.

(q) Chirurg. Wahrnehm. 1. Hauptst. p. 21. 6qq.

litis, simulque magnis duræ meningis sinibus vicinissima declivem etiam obtineat situm, ex omni prope, encephali convexitate humores inter cranium duramque matrem effusi facillime illuc derivabuntur. Et vero si, quæ de ulceribus pone aures excitandis (r) retulimus, hic in memoriam revocentur, facile quisque dabit, isthos fonticulos esse admodum efficaces.

§. 115.

4. *Setacea* autem omnibus hætenus dictis ulceribus in amauroseos curatione palmam consensu omnium præripiunt; modo iisdem cum cautelis, quas de vesicantibus (s) attulimus, adhibeantur: „ & si quid „ sperandum auxilii, inquit F. HOFFMAN- „ NUS (t), id sane a tali remedio in hoc „ affectu longe certius, quam a vesicato- „ riis vel fonticulis obtinetur „. Sic A. SPIGELIUS (u) qui (inquit) „ ex pluribus, „ præsertim sibi de industria concitatis, ster-

(r) Vide §. 113.

(s) Vide §. 112.

(t) l. c. thes. therap. §. 2.

(u) De H. C. fabr. L. 7. C. 2. p. 243.

„ nutationibus in cœcitatem derepente lapsi
 „ sunt... illos quandoque setaceo curatos
 „ vidi,,. Vidit perinde F. HILDANUS (x):
 „ adolescens 14 annos natus, & phleg-
 „ matici habitus, cum æquali sponfionem
 „ fecit, posse se sternutare ad libitum, imo
 „ etiam centies. Deposito pignore cœpit
 „ ex immodica titillatione irritatis naribus
 „ sternutare circ. centies & amplius. Exin
 „ protinus correptus est dolore capitis &
 „ hebetatione visus, qui etiam sequenti die
 „ deperditus fuit, citra tamen inflammatio-
 „ nem oculorum aut febrim... Decretum
 „ est, ut purgato corpore setaceum adhibe-
 „ retur collo, uti & scapulis cucurbitulæ.
 „ Atque his usus revulsionibus visum pau-
 „ cos post dies recepit,,. Refert idem hic
 „ Auctor (y) aliam quoque amaurosin setaceo
 „ percuratam in matrona, quæ ex errore vi-
 „ ctus in puerperio hepatis obstructione mul-
 „ ctata est cum maxima deinceps etiam crurum
 „ inflatione. Contra quod malum cum empy-
 „ ricus non præparato corpore unguentum & le-
 „ cunctis articulis ac nuchæ intrivisset, humo-
 „ res tanto impetu ad os ruebant, ut ægra

(x) l. c. Cent. 1. Obs. 24.

(y) Ibidem Cent. 5. Obs. 13.

dies aliquot vita periclitaretur; totum enim caput, præcipue facies, os, lingua, & gingivæ tantopere tuebant, ut nec verbum ægra proferre, ac vix juscum sorbere posset. Evasis quidem, at visum inde ita amissit, nihil ut fere discerneret. Nihilominus ubi post idoneam corporis præparationem, iteratasque sub diætâ ordinata catharses, setaceum nuchæ fuisset applicatum, & præter aquam ophthalmicam roborantem interne quoque vinum nervinum discutiens fuisset usurpatum, ægra ita denuo recepit visum, ut typum æque ac scripturam legere, ipsaque etiam scribere promptè posset. Meminit etiam V. RIEDLINUS (z) pueri, qui oculis sic laborabat, ut aliquoties eorum usum prorsus fere amiserit; sed applicatum setaceum revocavit visum, quem postmodo picturæ studium sensim reddidit peracutum non sine omnium admiratione. Perinde J. B. LAMZWEERDII (a) sericarius 40 annor. continuis diu obnoxius distillationibus e subita fluxione repente utriusque oculi amaurosi correptus, adhibito post catharsin

(z) Curar. med. millenar. No 441.

(a) Ad I. SCULTETI armament. chirurg. Append. Obs. 58. p. m. 633.

& Væ Sem fetaceo ad nucham, excitatoque fonticulo in brachio, & vesicantibus pone aures, cervici, brachioque sæpius admotis, sub usu simul decocti Gvaj. Sarsap. Chin. cum cephalicis alterati, cum exacta diæta, continuo purgatus, demum convaluit iterum. Neque minus proficuum est fetaceum ad solvendam amaurosin, cui suppressa quæcunque consveta sanguinis vacuatio, cum primis mensium aut hæmorrhoidum, occasionem præbuit, si revocato fluxu illa nihilominus superfit. Sic „ A. 1639 M. ROT-
 „ HIN... circa 26 suæ ætatis annum ob
 „ suppressos menses conqvesta est de utrius-
 „ que oculi... gutta serena... Huic in no-
 „ focomium susceptæ circa novilunium ve-
 „ nam saphænam dextri pedis incidi, &
 „ sanguinis ʒvj educi curavit J. SCULTE-
 „ TUS (b); deinde pilulas uterino-ce-
 „ phalicas

R. MP. de Castoreo ʒij

Extract. Cochiar. ʒj

Magist. Gialapp. gr. vj.

▽æ Artemis. q. s. form. pil. No xxj.

„ & vinum medicatum præscripsit... Post
 „ cathartorum usum fonticulum femori dex.

(b) Armam. Chirurg. Obs. 34.

tro 4 digitis supra genu inussit. Elapsis 4
septimanis menses cœperunt fluere, sed
admodum diminute: qvapropter patienti
exhibuit dosim pilularum de ammoniaco
correctarum, a qvibus purgatio satis evi-
denter fuit promota. Circa 3^{um} novilu-
nium menses apparuerunt & fluxerunt,
sed adhuc diminute: qvamobrem patiens
repetiit usum pilularum menses promo-
ventium, a qvibus ad nutum fluxere.
Qvarto mense purgatio justo tempore &
qvantitate respondit; nihilominus tamen
patiens tristissima inde visum non recepit.
Hinc, qvia antehac in J. D. COMMERE-
LII... conjuge, & J. C. EHINGERO se-
taceum nuchæ inustum ad hujusmodi ner-
vorum obstructions præstantissimum inve-
nit, cervici setonem applicuit, ulcera-
qve per 20 dies aperta detinuit, donec
ægra pristinum visum lætissima receperit.
Mensibus rite fluentibus fonticulum in fe-
more consolidavit, & ab eo tempore us-
qve ad A. 1645 incolumi sanitate fruita
est. Similem qvoqve casum reperire
est apud S. SCHAARSCHMIDTIUM (c),

(c) Med. u. chir. Nachricht. 3 Jahrgang. No 18.
p. 170. sqq.

nempe ancillæ 30 annis majori, sangvineo-melancholicæ, laboriosæ, ac semper sanæ, menses pridie occipientes ob canem prægrandem inopinato ejus in collum insilientem vehementer exterritæ, & cum pallore ac balbutie trementi continuo subistere, sequente frontis oculorumque dolore cum amblyopia per noctem in amaurosin abeunte. Sumpta vero mane insigni dosi e roob sambuci, superpotaque cerevisia calida, post elicitedum sub stragulis copiosum sudorem cephalalgia desit, superstita cœcitate; contra quam usurpato per aliquot continuos dies drastico vegetabili emetico - cathartico lucis aliquid recepit; sed admodum inde viribus exhaustæ deinceps ad utramque suram ac nucham adnota causticæ cujusdam herbæ contusæ puls vesicas excitavit copioso latice refertas, cujus uberiores proventus eadem puls per 10. 12vè dies renovata eo cum successu prolicuit, ut ægra visum inde, at debilissimum, nancisceretur. Postea variis aliis incassum tentatis redeunte lunari periodo cum catamenia non reverterentur, capitis dolor cum perfecta amaurosi repetiit, quam nequidquam emetica, cathartica, diaphoretica, scarificationes, vesicantia, &c. oppugnarunt. Conquiescente demum capitis dolore, nihil in oculis vitii præter pupillam

solito ampliorem, atqve ad insignem lucem paulisper ac lente se contrahentem, erat conspicuum, nihilqve ægra nisi lucem a tenebris discernebat. Ad revocandos itaqve menses primo octidui die ante instantem eorum periodum datum catharticum e pulv. rad. Jalapp. gr. xv. cum arcan. dupl. gr. x qvater alvum blande subduxit; postero die e pede sanguinis $\bar{3}$ viij detractæ; reliquis 6 diebus qvotidie bis ante meridiem exhibitæ guttæ 50 MRæ e TRæ $\bar{3}$ ii acris & Effent. Succini æqvis partibus conflatae, a meridie hora 3^{ta} ac 6^{ta} datus Pulv. e Pulv. temp. alb. milleped. aa. $\bar{3}$ & Sal. vol. C. C. gr. iij. vesperi autem alternis diebus jam pilul. de succino CRAT. No xv. jam pediluvium tepidum usurpatum, cujus vapor simul ad abdomen fatus loco admittendus erat. Ab his etsi pro consveto alias faciei rubore ac dolore capitis tormina nunc abdominis cum tensivis spinæ dorsi doloribus oborta mensium affuturorum spem dabant; tamen nec hi erupere, nec visus rediit. Igitur, ab elapso hoc octiduo ad sequentem usqve periodum pro humoribus attenuandis, stasibus in oculis dissipandis, & ulteriore ab iis avertendo affluxu, præscriptum saturatum decoctum e ligno Gvaj. rad. Scrophulariæ, Valerianæ, ac sem. Fœnic. qvovis

mane & a meridie hora 5^{ta} ad aliquot vascula calide hauriendum, vacando simul mane leni perspirationi; vesperi porro unus ☿ antedictorum sumendus, & interdum cum pilulis dictis alternandus. Cibi non admodum eupepti dati, ne in quiescente nunc ægra, prius laboriosa, plethoram lentosque humores causarent: potui concessum decoctum e C. C. raso, rad. Scorzonæræ cum passul. min. vetita omni cerevisia; & motus muscularis in hypocausto quotidie ad aliquot horas imperatus. His per 3 hebdomades factis interdum quædam, at non diuturna, visus indicia se se offerebant. Ineunte 4^{ta} hebdomade eadem, ut ante, cura per 6 novissimos dies ad eliciendos menses instituta eosdem debita copia movit, distinctiore inde visu reverso. Tum vero setaceo nucha trajecta est, oculique bis quotidie decocto Rorismarini & sem. Fœnic. in vino rubro foti: interne nihil præter catharticum quandoque datum. Vitis ab his in dies acutior factus, & ulcere setacei 6^{ta} hebdomade confanato ægra prorsus sana ad servitia redierat. Monet autem Cl. Observator, setaceum se, quamvis omnium remediorum adversus amaurosin efficacissimum, non ante in usum vocare voluisse, quam fluxum catameniorum revocasset;

quod longo sibi usu constaret, eo prius adhibito, quam obstructio solennis alius fluxus sanguinei (præsertim hæmorrhoidum aut mensium) esset reſerata, illam tanto contumaciorem inde evadere. Quæ cautela tironibus alte est inculcanda. Efficacissima quoque se se præbuere ſetacea in tollenda amauroſi, quam febres poſt ſe relinqvere conſueverunt. Sic narrante C. CRAMERO (*d*)

„ juvenis 24 annor. poſt ſuperatam fe-

„ brim malignam corripiebatur gutta ſerena

„ ita, ut oculo dextro fere nihil diſtingve-

„ re valeret, & ſiniſter etiam objecta valde

„ obſcure repræſentaret: in oculis nulla

„ labes aderat, & aſpectum prorsus ſanum

„ oſtendebant ambo. De ſingulari autem,

„ & ſibi admodum moleſta ſiccitate oculi,

„ præſertim dextri, conqverebatur æger.

„ Præmiſſa & aliquoties repetita purgatione,

„ ſetaceum illi per nucham traductum fuit,

„ cujus auxilio intra 3 ad 4 hebdomades

„ liberatus eſt „. Perinde „ febrim mali-

„ gnam jam aliquot menſibus hic epidemice

„ graſſante . . . femina. 30 annor. & puer

(*a*) Diſſ. de Paralyſi & ſetaceor. adv. eam uſu,
 §. 40. apud SANDIFORT theſ. diſſert. &c.
 Vol. I. No. 7.

„ 13 annor. corripiebantur gutta serena:
 „ visum recuperarunt fetacei beneficio „
 inquit J. J. WEPFERUS (e), quo „ qva-
 „ ter guttam serenam potissimum curatam
 „ norit „ (f). Sed nusquam fetaceorum
 ad amaurosin e febribus oriundam virtus
 evidentius se se probaverat, quam in epi-
 demia ACRELII, quam superius (g) jam
 narravimus. In hac cum plerisque febris
 discedens amaurosin post se reliquisset nul-
 lis remediis expugnandam, tandem caute-
 rium in uno ægrorum tentatum viam reli-
 quis ad salutem aperuit. Nempe dimachæ
 cuidam oſtiduum apyreto cœcoque nucham
 Cl. Observator candente ferro cum inuſſiſſet,
 eodem se momento æger lucem ac scintillas
 videre ajebat; sed postea nihil iterum, ut
 ante, vidit. Interea 4^{to} post operationem
 die lucem denuo sentire cœpit, qui effectus
 tamen 7^{mo} adhuc die nil augebatur. Petenti
 ægro nova inuſtio facta; a qua 5^{to} post die,
 dum utrumque ulcus ubertim manaret, vi-
 ſus increſcere cœpit, ſicque in dies dein-
 cept emendatus ad priſtinam demum aciem

(e) l. c. Obſ. 153. p. 740.

(f) Ibidem Obſ. 60. p. 175.

(g) Vide §. 46,

rediit. Ea propter setaceorum in nucha periculum fieri cœptum in iis, qui jam ab 8 ad 14 dies cœci fuerunt. Sub operatione singuli, ut dimacha, lucem, imo fenestras, sunt conspicati; sed postmodo rursum nihil cernebant. Veniebat in mentem, si mox, dum visus evanesceret, setaceum applicari posset, duplicatum inde fructum obtentum iri. Idcirco Cl. Vir sollicite calculum ratione temporum paroxysmicorum in ægris, quæ invasions nycthemeri spatio vel anticipabant vel postponebant, subduxit, iussitque secundum initas has rationes summa ope a custodibus ægrorum diu noctuque omnes eos observari, qui ex ordine decumbentes frigore corripiebantur, num non eorum quispiam, cui juxta calculum frigus febrile ingruere deberet, ab eo reperiretur immunis. Hic excitandus illico, percontandusque erat, utrum visu polleret? Primo rei periculo ipse Cl. Vir capto, binos reperit milites tirones absque cortice apyretos, at simul cœcos, quæ e vestigio setaceum acu obtusa cum funiculo e panno xylineo carpto confecto trajetum. Cumque id prima noctis hora actum esset, 8^{va} matutina visum ambo utcunque recepere. Ipso hoc mane aderat hora invasionis equi-

tis cujusdam: hic jam hora 7^{ma} uno oculo captus fuit, quamvis hora paroxysmi esset 9^{na}. Applicato illico setaceo post bihorium videre iterum cœpit, ac post 24 horas visum plane recepit. Omnes, qui in paroxysmi frigore erant, secureque cortice poterant uti, usum ejus inchoarunt: unde febre ad præstitutum tempus non revertente cœci perinde, velut qui cortice non sunt usi, reperiiebantur; sed confestim admoto setaceo intra 2. 3^{ve} dies visum recuperarunt. Curiositate denique ductus tentavit binis in ægris 6 vel 8 horis ante invasionis tempus setaceum, dato interea quavis hora ☿ Cort. Peruv. ʒj. Febris emanfit, verum visus quædam obscuratio est consecuta, eodem tamen, quo in aliis, tempore superata. Mense Martio A. 1744 bellicus Commissarius post 5 tantum toleratos 3^{na} paroxysmos apyretos, lævoque oculo cæcus, setaceum (etsi efficacissimum esse sciret) deprecatus, alia poposcit præsidia, Data; sed incassum. Post mensem setaceum admisit; at non nisi post 3 septimanas visum illius oculi recepit. Tanto etiam tempore ii egebant, qui per 2. 3. hebdomades principio morbi setaceum neglexere. Nihilominus tamen sunt amau- roses, quæ ne setaceo quidem se se expu-

guari patiuntur, q̄ualis in ZACUTI (b) viro fuit, & apparitore J. SCULTETI (i), cui post iterata cathartica, & applicata cervici vesicantia, ipsum demum etiam fetaceum in nucha nihil opis tulit. Sed hæ fere deploratæ sunt amauroses. Non possum autem hic silentio transire fetaceum auriculæ multis olim utile observatum, de q̄vo V. RIEDLINUS (k) „ huc referenda (inquit) „ forsan est cura nobilis cujusdam feminæ, „ quam illam in variis subjectis feliciter „ exercuisse amicus quidam, q̄vi ipsemet „ viderat, narravit. Adierat nempe una „ cum ipso hanc nobilem quidam, q̄vi ex „ læsione oculi a transitione virgultorum „ usu ejusdem jam per triennium privatus „ fuerat. Hunc statim bono animo esse, „ & ut ligulam a proximo mercatore emeret, jussit: q̄vo dictis parente, in altera „ ligulæ parte nodum fecit, & subito subula „ ipsamet aurem illius lateris, cujus oculus „ affectus erat, perforavit, hinc ligulam „ usque ad nodum trajecit, & simili nodo „ in altera etiam parte munivit, reliquiis

(b) Vide §. 49. d).

(i) l. c. Obs. 36.

(k) Lin. med. ann. 3. Octob. 18, p. 339. sq.

„ rescissis; hinc & ab omni vino & potu
 „ calidiore per octiduum abstineret, patien-
 „ terque, donec ligula computresceret,
 „ exspectaret, ei in mandatis dedit, sicque
 „ illum dimisit: qv̄i etiam paulo post visum
 „ omnino recuperavit, & nobili pro cura
 „ maximas rependit gratias, qv̄æ sancte te-
 „ stata est, se plurimis jam hoc modo vi-
 „ sum restituisse „.

§. 116.

5. *Ustio cranii* denique superest recen-
 senda. Hanc adversus contumacissimas capi-
 tis ægritudines jam inde ab HIPPOCRATE
 ad nostram usque ætatem a 40 & amplius
 qva Medicis qva Chirurgis fuisse commenda-
 tam iuse ostendit A. HAEN (1). Nos ex
 omni illa dissertatione ea tantum nostra fa-
 ciemus, qv̄æ ad amauroseos curationem per-
 tinent. Nempe F. DECKERS (m) narrat
 virginem post varia valetudinis incommo-
 da cœcam demum factam, atque ubi curata
 est, denuo recidivam fuisse passam. Inusto
 autem usque ad os vertice liberata denuo,

(1) Rat. med. P. 6. c. 6. §. 1. p. 232. lxx.

(m) Exercit. pract. p. 109.

ubi ulcus confanabatur, cœca rursus fiebat; quod ter accidit, terque iniustio est instituta: sicque post 3^{am} uisionem visum ægra retinuit. Hanc ipsam operationem HAENIUS, auctoritate & experientia tot tantorumque virorum motus, tentare, ubi omnia alia frustra adhibuerat, decrevit, & „ præcipue „ nos, ait (n), miserebat duorum, quos „ gutta serena ad 8^{um}, ad Corticem, ad „ machinam electricam; ad cujuscunque generis evacuantia, ad varia capitis epithemata, ad vesicantia, ad fétacea, &c. omnino rebellis & pertinax misere affligebat. „ Igitur (o) 3^{ia} Junii... operationem fecimus in adolescente 12 annor. rustico, „ robusto, toto quadrato, quem amaurosis affligebat, probabiliter nata ex contuso capite, postquam 6 mensium spatio in periodicos vomitus, quos cephalæa semper prænunciabat, inciderat. Amaurosis porro ejusmodi erat, ut noctem inter diemque nihil distingveret, summam tamen agilemque pupillæ utriusque constrictionem & dilatationem ad majus minusve

(n) l. c. p. 254.

(o) Ibidem §. 2. p. 255. sqq.

„ lumen haberet . . . Quia & sine integu-
 „ mentorum incisione & cum eadem hæc
 „ operatio fit, ultimum modum prætulit D.
 „ LEBER; cum eandem didicisset, fortuna-
 „ toque applicatam a suo Magistro dexterrimo . . . Chirurgus LAUDES vidisset, qui
 „ idem magister discipulos adstantesque chi-
 „ rurgos serio hortatus erat, hanc simplici
 „ utioni semper præferrent, metu convul-
 „ sionum, quas utio sine sectione genera-
 „ re statuebat. Integumentorum hæc sepa-
 „ ratio validum dolorem excitabat, levio-
 „ rem pericranii abrasio, maximum vero
 „ utio, quam valide urentem aiebat, licet
 „ nihil eorum, quæ circum se gerebantur,
 „ sciret. . . Dolor primis horis magnus, post-
 „ ea modicus: bonus appetitus, semel mo-
 „ do levis vomitus, qui ceterum ipsi con-
 „ suetus, observabatur. Utebatur jure
 „ carniū, aqua hordei mellita, & emulso
 „ leviter paregorico. Altero die optime
 „ habuit. Die 3^{io} fumo aromatico prunis
 „ ardentibus injecto, ac capiti admoto ap-
 „ paratum examinavimus, lintea carpta san-
 „ guine imbuta amovimus, inspersoque vul-
 „ neri ☿ mastiches labia suis singula locis
 „ adposuimus. Bona hæc, sed contracta
 „ ita, ut iniustum ossi locum exacte liberum
 „ & nudum servarent. Tenaci emplastro

„ ea ad se jungebamus , omnia deligabamus
„ sicce , ac raro deligandum locum postmo-
„ dum esse CAES. MAGATI consilio decer-
„ nebamus. Nox optima , alvus ab ene-
„ mate bona. Die 6^{to} Junii , scilicet ab
„ operatione 4^{to} pulsus sanus naturalis ; bo-
„ nus appetitus , nullus capitis , nisi ab
„ ejusdem motitatione , dolor. Hora 8^{va}
„ vespertina . . . affirmantem . . . palam audi-
„ vi , se nullibi in toto corpore , imo ne
„ in capite quidem , dolere , suumque
„ jus eadem vespera egregie sibi sapu-
„ isse. Tandem . . . pulsum adhuc tetigi
„ scrupulose , eumque tam bonum inveni,
„ quam unquam sanus homo habere potest.
„ Idem testati mihi sunt medicinæ & chi-
„ rurgiæ assistentes , qui post me pulsum
„ examinerunt. Interim visus emendatio-
„ nem observare se nullam æger conquere-
„ batur . . . A media nocte vomere cœpit ;
„ quod quia ipsi familiare , custos neglexit
„ primo , verum ronchum in respiratione
„ advertens Assistentes nosocomii vocavit,
„ qui morientem viderunt hora 2^{da} prope
„ finem diei 4^{ti}. Quod me nosque omnes
„ nec opinatus casus perculerit . . . nemo
„ dubitabit. Nec reticebo , me suspicantem,
„ ne forte vomitus violentia in syncopen
„ lapsus esset , curavisse , ut pectus ipsi va-

„ lide agigaretur, & bis injecto enemate fu-
 „ mi tabaci intestina irritarentur. Sed mor-
 „ tuus erat... Cadaver examinantes nihil
 „ mali exteriori in cranio deteximus : labia
 „ quippe vulneris bona, suppurantia, se
 „ jam cum pericranio unire cœperant in lo-
 „ co ab inuisione remotiore. Olla cranii
 „ ablata videbamus cranium adeo leviter
 „ igne tactum fuisse, ut facta usti abrasione
 „ vix quid de offea periisse videretur sub-
 „ stantia. Igitur ustio non erat aut profun-
 „ da aut etiam ad usque diploen producta,
 „ quemadmodum Auctores jubent, sed vix
 „ tangens, adeoque insufficiens : attamen
 „ ... dura mater inustæ plagæ subjecta jam
 „ ab externa sui parte, quæ os tangit, sup-
 „ purari leviter inceperat ; arachnoidea vi-
 „ debatur ibidem loci cum pia matre corru-
 „ gata ; cerebrum autem integerrimum. Ce-
 „ terum per universum cranium ambæ me-
 „ ninges admodum inflammatae. ... Cranium
 „ internum ipsum ad distantiam 2 linearum
 „ a loco usto leviter fissum fuit.... cum
 „ ... adeo tenue & transparens esset, ut
 „ vix mediam solitæ crassitudinis partem ha-
 „ beret. Præter hæc nullum in cranio vi-
 „ tium, ne in opticis quidem nervis, cui
 „ guttæ serenæ adscriberemus causam. Dum
 „ vomitus a semianno periodicus fuerat,

„ operæ pretium erat causas indagare. Ven-
„ triculus ore superiore suo initioque œso-
„ phagi solito multo amplior ita sanguine
„ omnibus suis in vasis turgens, ut hæc in
„ nonnullis locis duarum, in aliis 3 lineæ-
„ rum diametrum haberent, purpureus ce-
„ terum toto fundo suo, binisque in pla-
„ gis tam interne quam externe gangræno-
„ sus, circa pylorum bonus. Universi pul-
„ mones lateribus undique, mediastino,
„ diaphragmati, pericardio, spinæ dorsi la-
„ teri, jugulo, quolibet in puncto adeo in-
„ dissolubiliter accreti erant, ut sine alter-
„ utrius destructione impossibile esset eosdem
„ solvere, utque ubique, potissimum vero
„ in toto dextro latere, lacerati pulmonis
„ reliquię thoracem investirent. Quemad-
„ modum porro pulmones cum vicinis par-
„ tibus, ita quoque mutuis inter se lobis
„ coalescebant. Quod autem maxime mi-
„ rabile, adolescens nunquam in nostro no-
„ socomio difficilem aut læsam respirationem
„ ostendit, neque hujus quidpiam matris
„ habuit anamnesis. Unice affirmare possu-
„ mus, sesquihora modo ante mortem re-
„ spirationis pulsusque vitia apparuisse. Nec
„ minus mirabilis ventriculi & obstructi &
„ perquam inflammati & gangrænosi con-
„ templatio, ubi ad mortem fere usque nec

„ signa febris aut gangrænæ in pulsu , nec
 „ signa doloris in hoc viscere , nec signa
 „ alicujus in ejusdem functione defectus ,
 „ apparuerunt ... sed ... futuros prævideo,
 „ qui ex integra hac historia concludant ,
 „ levem hanc unctionem causam mortis neu-
 „ tiquam existitisse , sed in corpore adeo vi-
 „ tioso mortem aliunde duxisse originem.
 „ Hos obsecro , velint sequentem perpende-
 „ re casum (p). Die 4^{ta} Junii cauterium
 „ eodem modo juvenculæ 20 annor. admo-
 „ vimus ; altera scilicet die ab eodem ap-
 „ plicito adolescenti. Hæc Gutta serena la-
 „ boraverat a fine anni 1759 post vomitum
 „ spontaneum 14 dierum , postqve trime-
 „ strem defectum catameniorum. Datis
 „ purgantibus vomitus cessaverat , redie-
 „ rant menses visusqve. Toto anno optime
 „ valuit. Sub finem anni 1760 menses de-
 „ ficiunt , vomitus redit , perit visus. Eo
 „ in flatu nostrum in nosocomium infertur.
 „ Video amaurosin , quæ cum immobili u-
 „ traqve pupilla inter diem noctemqve , imo
 „ posthac de die album inter nigrumqve,
 „ distingveret. ... Cum anno elapso purgan-
 „ tibus sanitatem & visionem recuperasset,

(p) Ibidem §. 3. p. 264. sqq.

„ eadem ipsi, sed jam incassum, præscripsi.
„ Cumque demum purgantibus opio inter-
„ posito vomitum superassem, menses & vi-
„ sus deficere pergebant. Amaurosis jam
„ bis vomitum diuturnum, eumque violen-
„ tum, vomitus jam bis retardatos inseqve-
„ batur menses: unde in mensium defectum,
„ si non omnis, saltem aliqua causa vom-
„ itus videretur refundenda. Quare post-
„ quam appetitus bonus cessante vomitu redi-
„ isset, methodica ad menses revocandos
„ cura exactissime, eaque non juvante quæ-
„ vis empirica prudenter adhibita fuit.
„ Cum demum nihil juvaret, nisi quod se-
„ mel iterumque leve quoddam initium men-
„ sium videretur conspici; tandem... ma-
„ chinæ tornatilis ad arterias crurales ad-
„ motæ, post aloeticum purgans balneaque
„ vaporis... auxilium ad tres varias usque
„ vices adhibui circa id tempus, quo men-
„ ses, ni turbatus naturæ ordo fuisset, re-
„ dire debuissent. Sed & hoc frustra fuit.
„ Diu demum post menses rediere, sed irre-
„ gulariter semper; vomitus non nisi raro
„ rediit, passim adhuc bonus appetitus, bo-
„ na digestio, egestio commoda, virium
„ torositatisque incrementum. Ast vero
„ omnia hæc cum perseverante amaurosi,
„ & continuo repetentibus capitis atque o-

culorum doloribus. Videbatur ex hisce
concludi oportere, quod visus olim redi-
isset ad catameniorum restitutionem, quia
nec dum quid notabiliter aut læsi aut im-
pacti obstructique in encephalo erat; jam
vero ex vomituum tum repetitione tum
diuturnitate vitium topicum in cranio fo-
rèt, propter quod gutta serena ad resti-
tutos menses perennasset: quodque proin-
de occasio opportuna adesset, ejus curam
cauterio tentandi, id quod tutum, ...
quod nunquam noxium, sæpe vero effi-
cacissimum, hucusque credideramus. Al-
tera ergo die, ut monui, quæ in puero,
operationem eodem modo in hac puella
fecimus. Symptomata dolorum ad varias
operationis partes confuse primo, sedatis
vero doloribus eodem se percepisse mo-
do, quo adolescens narraverat, declara-
vit. Appetitu gaudentem eodem, quo
puerum, modo sustentavimus. Prima
nocte vix dormivit, & dolorem in utro-
que cervicis latere conquesta est; altera
die melius, 3^{ta} die bene se habuit, ex-
cepta febricula, 4^{ta} die pejus. Sangui-
nem tunc misimus, qui pessime phlogisti-
cus. Jamque vox deficere incepit, &
caput hebes fieri. Igitur inopina morte
pueri perculsi mortem puellæ tristes quo-

„ qve prævidimus... Medio die 5^{to} periit,
„ cum leviori faciei convulsione. In ex-
„ terno cranio omnia ut in bono vulnere.
„ Offa cranii resecta ustionem non modo
„ multum non penetrasse, sed crassum hoc
„ cranium vix attigisse patebat; parte enim
„ adusta abrasa vix de ossis substantia quid-
„ quam ablatum apparebat. Nihilominus
„ sub hoc crasso vixqve ab igne tacto cra-
„ nio dura mater suppurata inventa est, ac
„ totum sinistrum cerebri hæmisphærium, in
„ quo (ut mox patebit) ustio erat, magna
„ copia puris inter utramqve meninga sca-
„ tebat. Et, ut in priore, in utroqve ce-
„ rebri latere utraqve meninx vehementer
„ inflammata erat: aer autem copiosus,
„ ubiqve se movens, separatim a sanguine
„ in harum membranarum vasis sanguineis,
„ potissimum in hæmisphærio sinistro, miro
„ sane spectaculo inventus est. Ventricu-
„ lus superior in sinistro latere hydropicus
„ 3 plena cochlearia lymphæ gessit; dexter
„ solitam copiam. Cerebrum pone locum
„ ustionis flavum & solito mollius ac fere
„ liquidum. Notabile autem maxime infun-
„ dibulum imo maximum fuit 8 vel 9 linea-
„ rum diametrum habens, 2^{do} repletum
„ fuit materia grisea, quæ partim pultacea
„ partim calcarea fuit, 3^{tio} concretum erat

„ cum pia matre opticos involvente, 4^{to}
 „ infidebat, premebatqve ipsum opticum
 „ coalitum, non quidem ita, ut optici ner-
 „ vi post coalitum marcescerent, sed saltem
 „ sic, ut videretur illorum actio interturbata
 „ fuisse, puellaqve cœca fuisse mansura,
 „ etiamsi male haud successisset operatio.
 „ Pulmones, ut in puero præcedente, ubi-
 „ que, ne minima quidem plaga excepta,
 „ indissolubiliter cum omnibus in thorace
 „ partibus, mutuisqve inter se lobis, con-
 „ nati erant. Oesophagus & orificium su-
 „ perius ventriculi duplo, quam solent, am-
 „ pliores; pylorus tam æctus, ut calamus
 „ scriptorium haud admitteret, in crastinam
 „ demonstrationem reservatus, hæc con-
 „ strictione (an spasmo evanido?) caruit.
 „ Ex præcedentibus quippe patuit, spasmos
 „ a morte non raro superesse „. Ex his
 casibus demum HAENIUS sequentia dedu-
 cit consuetaria (q): imo ustio levissima binis
 his in casibus pessimos in encephalo pro-
 duxit effectus, mortemqve causavit: ergo
 eo certius hæc a profunda ad diploen usqve
 ustione (id quod Auctores ustionem hanc
 commendantes exigunt) facta consequi opor-

(q) Ibidem §. 4. 5. 6. p. 272. 699.

tebit; 2^{do} Effectus hi pessimi non in aliquibus tantum, sed in omnibus casibus, certo consequi debent; nam crania quæcunque sicca, etiam 4 lineas crassa cauterio suspenso tacta ita subiectum urunt digitum, ut non mature subtracti cuticula solvatur, inque bullas elevetur, id quod viceni & amplius homines in nosocomio ejus tentarunt. Eodem porro recentibus in craniis experimento capto, iis cauterio vix tactis in interna illorum superficie loca ustioni respondentia flavescebant, bullasque flavas foetidas protrudebant, si ustio $\frac{1}{3}$ minuti durabat. His in bullis oleum animale bulliens (cujus calor triplus est aquæ bullientis) meninges urit, corrugat, albamque cerebri medullam facit flavam, ut experimenta docuere. Hinc 3^{to} si uspiam operatio hæc feliciter cessit, necessum est, vel ferrum non fuisse candens, a quo illa mala produci potuissent, vel inflammationem inde natam felici ac rarissimo casu fuisse dein resolutam, vel denique cranium cauterio vix fuisse tactum, ac fonticulum tantum in capitis tegumentis fuisse excitatum. 4^{to} Qui pluries ustionem hanc tentarunt, videntur mala fide infaustos reticuisse casus numero plurimos, felicibus tantum rarissimis agyrtarum in morem narratis. 5^{to} Auctores illi plures quam 40 non omnes
ope-

operationem ipsi tentasse, sed alius ex alio eam exscripsisse videntur. Proinde 6^{to} Ustio cranii quocunque loco ab iisdem indicato semper est periculosissima, contra quam illi asseruere: eapropter etiam 7^{mo} e medicina penitus proscribenda; ut quæ sæpissime perniciofa sit, ac vix unquam proficua, &c. Hæc ille. Ego vero nihil ad hæc, quod adjiciam, habeo, nisi id unum: ustionem cranii, quæ sine integumentorum incisione sit, minus HAENIANA illa periculosam esse; id quod etiam non ita dudum abhinc H. F. DELIUS (r) ostenderat.

C A P U T VIII.

EXSTIRPATIO OCULI.

117.

EXSTIRPATIO *oculi* affecti denique superest dispicienda. In prognosi (s) exempla in medium allata sunt amauroseos monoculæ, quæ serius citius in alterum quoque oculum sanum, velut contagione quadam,

(r) Diff. de ustione cranii in epileps.

(s) Vide §. 58. No 4.

commigravit. „ Qvo factum est, inquit
 „ s. YVES (t), ut sæpe mihi in mentem ve-
 „ niret, sanum oculum conservatum iri for-
 „ tasse, cæco oculo extirpato; ut ut nun-
 „ quam ad id tentandum adjecerim ani-
 „ mum „. Verum enim vero „ crudele
 „ consilium! reponit s. SCHAARSCHMIDT
 „ (u), in qvo multa simul in medio adhuc
 „ relicta sunt. Nam qværerè primum lubet:
 „ verissimumne sit, ægros, qvì amaurosin
 „ unius primum oculi cum ophthalmia &
 „ capitis ex eodem latere dolore nacti sunt,
 „ eadem in altero qvoque oculo aliquanto
 „ post correptum iri? Demus id, non dum
 „ licet evictum, & multiplici adhuc expe-
 „ rientia probandum, qværitur porro: num
 „ infortunio huic ab internis causis penden-
 „ ti remediis internis nullatenus obviam ire
 „ sit integrum? Ac tametsi id fieri neqvi-
 „ ret, scire percuperem, qvì extirpatio
 „ unius oculi prohibeat, qvo minus humo-
 „ rum congestio ad alterum consequi possit?
 „ Deniqve his omnibus concessis nihilomi-
 „ nus adhuc percontari luberet, quot ho-
 „ minibus s. YVESIUS oculos extirparit,

(r) l. c. C. 27. §. 12. p. 321.

(u) l. c. No 20. p. 196. sq.

„ vita eorum superstiti? Et num pro hac-
 „ ce cuilibet se vadem præstare qveat?
 „ Ego quidem nemini id polliceri vellem:
 „ qvapropter etiam qværitur: præstabiliusne
 „ sit, utroque capi oculo, an uni visum
 „ conservare cum vitæ vel jactura vel dis-
 „ crimine? „ Et vero „ hæc oculi extirpa-
 „ tio seu excisio corneæ cum effluxu vitrei,
 „ & cristallini periculo minime caret; &
 „ vidit bis inde ortam hemicraniam insana-
 „ bilem, semel vero maniam „ F. B. SAU-
 VAGES (x).

SECTIO III.

DIAETETICUM REGIMEN.

CAPUT I.

ALIMENTA.

§. 118.

ALIMENTA in amauroseos curatione,
 cum indole sua spectata, tum ipsis etiam præ-
 biis, quantum ad felicem successum faciant,

nemo, nisi in amauroseos historia peregrinus, ignorare potest. Unde e superius data causarum hunc morbum producentium doctrina liquido cuilibet apparebit, esse amaurosin, cui omne pene nutrimentum subtrahere oporteat, esse contra aliud ejusdem genus, cui sola corporis nutritio unice medeatur. Nimirum

1. *Inedia*, ubi morbum plenitudo vasorum & humorum versus caput congestio causavit, haud secius, ac alia quævis vacuatio universam humorum massam imminuens, indicatur. Hinc etiam „evellendæ,
 „ ait F. HOFFMANNUS (y), quæ contu-
 „ max est, cœcitati perquam opportuna
 „ nonnunquam est curatio, quæ per inedi-
 „ am instituitur. Conducit ea potissimum
 „ in corporibus impuris, cacochymicis, san-
 „ guineque & succis abundantibus; & re-
 „ quirit prægressam, clementem quidem, sed
 „ satis efficacem alvi subductionem. Ipsa
 „ hæc curatio consistit in eo, ut ægri non
 „ nisi modico panis cocti carnisque assatæ
 „ cum passulis vescantur, vinum omnemque
 „ cerevisiam fugiant, & decoctum ex farsa-
 „ parilla, glycyrrhiza, passulis, semine-

(y) l. c. cautel. pract. §. 4.

„ qve fœniculi bibant: cui pro corporis
 „ ratione per 3 & ultra hebdomades infisten-
 „ dum „. Nec abs re; s. FORMII (2)
 „ juvenis mulier in guttam serenam incide-
 „ rat, qva ita afflicta fuit, ut cibi abstinē-
 „ tia sibi mortem inferre decreverit: cum
 „ tamen maritus & adstantes aliquid jusculi
 „ aut vini forbere per vim cogerent, & il-
 „ la perexiguum sumeret, omnia, quan-
 „ tum poterat, respuendo. In eo statu per
 „ annum integrum perseveravit, & ad ex-
 „ tremam maciem perducta est, calore na-
 „ tivo defectu pabuli humidum substantifi-
 „ cum depopulante; cum eo vero omnis
 „ simul corporis humiditas, tum ipsa mate-
 „ ria guttam serenam efficiens absumpta est:
 „ & sic ægra visum recuperavit, ac postmo-
 „ dum sensim victu analeptico refecta est „.
 Contra ea

2. *Analeptica vires restaurantia* iis con-
 cedenda erunt, qveis diuturna inedia, ve-
 nus, aut morbus visum eripuerē. „ Fieri solet
 „ circa morborum solutiones, inquit A E-
 „ TIUS (a), aut etiam ubi vires recolli-
 „ gunt ægri, circa utrumqve oculum aut

(2) Apud L. RIVIERIUM Obs. communic. 29na.

(a) Tetrabibl. 2. Serm: 1. Cap. 123. f. m. 254.

„ circa alterum obscuratio, ut vix videre
 „ possint, velut per caliginem quædam,
 „ & ut aliquando quædam ante oculos vi-
 „ deantur pilis similia; at dum oculi confi-
 „ derantur, puri apparent. Rarissime vero
 „ in talibus circumstantiis circulus pupillæ
 „ aut minor aut amplior reperitur: ipsum
 „ porro obscurationis oculorum accidens ut
 „ plurimum seminis in somno effusione præ-
 „ gressa juxta morbi solutionem aut resecti-
 „ onem e vestigio incidit; & est signum
 „ debilitatis spiritus visivi ac nervosæ par-
 „ tis. Itaque in perfecta corporis conva-
 „ lescentia etiam visus actio integre restitui-
 „ tur. Quapropter a localibus auxiliis ab-
 „ tinere oportet, & neque fomenta neque
 „ illitiones adhibere, verum resectorii to-
 „ tius corporis ductus usu hoc ipsum acci-
 „ dens corrigere,,. GRADUS (b) puerum
 „ sibi 13 annor. in cura fuisse refert, qui post
 „ semestrem morbum cæcus factus post bimes-
 „ tre viribus restauratis visum recepit. Pari
 „ modo monente I. E. GEISLERO (c) „ in
 „ illis ægris, qui lumen ob succorum de-
 „ fectum amiserunt, parum medicina, plu-

(b) FOREST. l. c. Schol. ad Obs. 35.

(c) l. c. §. 8. p. 19.

„ rimum cibis boni succi efficitur, parce
 „ sed sæpius datis; utqve cerebri oculorum-
 „ qve vasa cito impleantur, capiti frictione,
 „ oculo roborante ac leniter stimulante fotu
 „ adhibito,,. Id quod etiam suo in ægro
 BOERNERUS (d) præstitit.

C A P U T II.

A E R.

§. 119.

AER quoque hic in considerationem du-
 cendus est, ac sagaciter dispiciendum, siccus
 an humidus, calidusne an frigidus remedio-
 rum in & externorum naturam hic æmule-
 tur. In amaurosi a debilitate nervorum o-
 riunda quantum vel solus aer frigidissimus
 (balnei frigidi indolem præ se ferens) præ-
 stare queat, P. J. F. HELMERSHAUSEN (e)
 est edoctus, nempe „ miles annor. 24.
 „ structuræ & habitus corporis mollioris, ab
 „ incunabulis optimæ valetudinis, animi
 „ tranquillæ, & vitæ generis plerumque se-

(d) Vide §. 98. No 2.

(e) Nov. act. nat. cur. Tom. 5. Obs. 16.

dentarii affvetus, repente tremore artuum & visus imbecillitate verno tempore corripiebatur, nebulosa & impetuosa tempestate exercitia bellica faciens. Ita quidem & semper subito afficiebatur, ut nunquam muneris & obligationis rationem implere posset: interim tamen momentanea quies saltem affectum iterum sistebat, tremorem artuum nempe & visus imbecillitatem: per reliquum temporis spatium exercitiis bellicis vacuum bona gaudebat valetudine, quod se & excretiones regulariter & naturaliter succedentes comprobarent. Centurio ab initio simulationem suspicatus vi ad officia præstanda eum coegit; sed paulo post de vero statu præternaturali convictus curæ & observationi Medici præsidii militaris tradidit. Primo intuitu nec in oculis nec in toto corpore statum morbosum potui detegere, nisi quod pupilla sub levi & aliquali compressione magis se dilatabat, & muscoli brachii & manus inviti post factam compressionem vel potius contractionem se se extendebant, ut vix nummum quidem, multoque minus arma in manibus retinere posset. Successu etiam temporis nullum observabatur intervallum sub quiete antea accidens. Ceterum de nullo querebatur

„ symptomate, nisi interdum de horripila-
 „ tionibus & levioribus quibusdam insulti-
 „ bus febrilibus, quorum paroxysmos mox
 „ medicina specifica sedavit. Integra igitur
 „ fruens valetudine, & floridum referens
 „ vultum, & sibi & Reip. erat inutilis ac
 „ molestus; quia nec literas vel objecta dis-
 „ cernere, nec sine lapsu ambulare pote-
 „ rat. Ab initio suspicabar malum ex tran-
 „ spiratione per labores aucta, & sub tem-
 „ pestate frigida & humida iterum suppres-
 „ sa, esse prognatum, eaque ex causa ner-
 „ vos ex congestione comprimi: per dia-
 „ gnoica igitur fixiora, interpositis laxanti-
 „ bus, & transpirationem restituere, simul
 „ vero & accumulatas partes serosas in inte-
 „ rioribus ad partes ignobiliores & exter-
 „ nas derivare intendi; sed successus haud
 „ respondebat intentioni: commotiones fe-
 „ briles quidem, ut antea jamjam dixi, ces-
 „ sabant; sed tremor artuum & visus imbe-
 „ cillitas eodem manebant gradu. Exinde
 „ igitur, quod hæc symptomata diversa si-
 „ mul & semel invaderent, quod pupilla ni-
 „ mis se se dilataret, & lente contraheret,
 „ quod muscoli extremitatum officium suum
 „ quidem præstarent, sed statim perpeffa
 „ contractione inviti iterum se se relaxa-
 „ rent, quod subiectum post aliquod tem-

pus etiam de vertigine qvereretur , attamen de nullo dolore , colligendum fuit , nervos comprimi non in totum , qvia actio partium affectarum restabat , sed ex parte , speciem ergo adefse incipientis guttæ ferenæ ex nervo optico affecto , & paralyseos spuræ. Materiam igitur subtiliorem in cerèbro stagnantem & resolvere & derivare per fortiora remedia , simul vero nervos debilitatos corroborare suscepì. Qua ex causa , præmissa Væ Se iterata , camphorata & sulphurea conjunctis phlegmagogis & apophlegmatizantibus cum tonicis nervinis internis & externis in auxilium vocavi , & memor dissertationis ... BÜCHNERI ... de remediis ꝑ lib. salibus paratis per adjunctum sulphur ad morbos qvosdam magis accommodandis , ... etiam hæc remedia non inexperta reliqui ; ... at spes me fefellit. Asam fœtidam , MP. de succino CRAT. MR. tonic. STAHLII , decoctum & ꝑem Chinæ , sal succin. volatile , ꝑlia sub varia forma , externe fonticulos , vesicatoria , unguenta rubefacientia & roborantia , species cephal. cum nervinum , incassum adhibui cum jactura 3 mensium. Quod vero remedia efficere haud potuerunt , id frigus & hyems absolverunt. Notandum

„ tamen est, tremorem artuum per remedia
 „ modo commemorata evidenter imminutum
 „ esse, sed visus imbecillitatem & nubecu-
 „ lam ante oculos, qua impediabatur sub-
 „ jectum, quo minus objecta & literas dis-
 „ tingvere posset, semper in eodem statu
 „ mansisse. Tempestas frigida sub finem
 „ mensis Decembris evadens mirum in mo-
 „ dum huncce statum convertit, & quod
 „ ꝑ subl. corros. in Ω u frum. dulcificatus ulti-
 „ mum oblatus non efficere potuit, id re-
 „ pente & omnino præter expectationem
 „ evenit. Subiectum quasi desperatum &
 „ per diurnam, etsi necessariam, & vo-
 „ luntariam custodiam melancholicum die fe-
 „ sto Nativitatis CHRISTI templum intro-
 „ it sacrum, in quo ingens sentiebatur gelu,
 „ & valde miratur, quo magis frigore affi-
 „ citur, eo melius se objecta & demum li-
 „ teras in hymnario distingvere posse. Ma-
 „ ximo gaudii gradu affectus domum repe-
 „ tit, erecto animo jusculum fervens ingur-
 „ gitat; sed eheu! cœcitatem quasi plenam
 „ sentit, quo statu per totum diem tristis
 „ mansit. Altero die templum iterum fre-
 „ quentans denuo visus restitutionem expe-
 „ ritur, domum reversus prandium bis co-
 „ ctum capit, ex quo quidem aliqualem
 „ oculum debilitatem sed non hebetudi-

„ nem persentit. Hypocaustum ob frigus
„ acrè minus calidum non auget affectum;
„ & inde concludit: frigus visui esse ami-
„ cum, id quod vario modo & iteratis vi-
„ cibus experitur. Experientia igitur edo-
„ ctus, quoties jusculum calidum vel alios
„ cibos fervidos sumpserit, toties reverti
„ affectum, nec non convictus de ratione
„ & effectu frigoris in corpus suum, ex hoc
„ tempore fugit hypocausta calida, cibosque
„ ejusdem conditionis, & in præsentiariarum
„ quasi in statu naturali ratione visus se se
„ sentit. Ego vero ... ex eo tempore vi-
„ num medicatum tonicum ♂ le roborans
„ secundum præscriptionem Celeb. WHYTTS
„ ex succis vegetabilibus, cremore ☐ri a-
„ cuatis, in quibus crocus & limatura ♂ sol-
„ vitur, & per vinum generosum virtute
„ exaltatur, quotidie ad ℥jv vel vj assu-
„ mendum, & id cum euphoria, curavi, in-
„ terpositis tamen ad humoris pituitosi præ-
„ parationem & attenuationem, simul ve-
„ ro ad præparatæ materiæ electivam expur-
„ gationem, tam resolventibus cephalicis,
„ quam purgantibus specificis per nares &
„ alvum: quod impedit, quo minus malum
„ recrudescat, ac ægrotus, in primis aere
„ sereno, nec spasinis extremitatum amplius
„ vexetur, nec facultate literas, præcipue

„ prælo expressas, & objecta dignoscendi
 „ destituatur. Radicalem curationem de vi-
 „ gore naturæ, de tempore, & de thermis
 „ Lauchstädiensibus expectamus, in ato-
 „ nia oculorum in primis proficuis,,. Hæc
 Observator. Porro etiam alias (f) est me-
 moratum, eos, qvi ab esu oryzæ calidæ vi-
 sum amittunt, sola sæpe cœli permutatione
 eundem recuperare consuevisse.

C A P U T III.

P A T H E M A T A A N I M I.

§. 120.

P A T H E M A T A *animi* denique supersunt,
 extremum ac tantummodo fortuitum reme-
 dium, velut est desiderium ardentissimum,
 spes, gaudium, &c. ad quorum unum pro-
 cul dubio referri poterunt sequentes casus.
 Apud J. s. MENOCHIMUM e S. J. (g) Abbas
 Ratisbonensis ROMUALDUS cœcus somni-
 ans se visum recepisse, expergefactus reapse
 vidit. E. HAGENDORNII (b) „ mulier

(f) Vide §. 35. p. 172. sq.

(g) Nützl. und gelehrte Zeitvertreib. Cent. 2. Cap.
 6. p. 25.

(b) l. c.

„ quædam annosa visu per plusculos annos
„ orbata adeo, ut ne solis splendorem vel
„ leviter agnoscere valeret, ob rem domi
„ angustissimam non habebat, quod curan-
„ do vel mitigando huic symptomati... im-
„ penderet. Hinc DEO naturæque nego-
„ tium omne committens continuis preci-
„ bus fatigare DEUM non cessavit, ut visum
„ ... sibi redderet. Quid fit?... dum ele-
„ cto surgere aliquando molitur, en! lu-
„ cem diei... agnoscere, & postero tem-
„ pore clarius videre cœpit „. Simillimum
casum refert J. C. STOCKIUS (i) de vi-
dua 80 annor. quæ 6^{mo} ætatis anno gravi-
ter lapsa fracto utroque dextri cubiti osse,
contusaque eodem in latere usque adeo fac-
cie, ut oculus prorsus fere pessumierit, cum
sanata fuisset, dextri oculi visu plane caruit.
Tum 6^{to} inde post anno lævi quoque oculi
visus in templo repente obscurari cœpit, &
post succedens animi deliquium prorsus ex-
stinctus est, nullo vitio in oculo conspicuo,
nulloque remediorum in 3 menses usu revo-
cabilis. Sepositis ergo ultra 8 annos reme-
diis, tandem 9^{no} anno post ardentissimas sæ-

(i) Act. nat. cur. Vol. 4. Obs. 18.

pe ad DEUM preces fufas repente oculi finiftri vifum recepit. Neque alio nititur fundamento curatio cœci in templo Tiberini AESCULAPII (ni cafus hic fraudem oleat facerdotum), cujus infcriptionem marmorì olim incifam J. GRUTERUS (k) ita perhibet:

„ hisce diebus CAIO cuidam cœco oraculum edidit: veniret ad facrum altare, & genua flecteret, a parte dextra veniret ad lævam, & poneret quinque digitos fuper altare, & elevaret manum, & poneret fuper proprios oculos. Et recte vidit, populo præfente & congratulante „ .

(k) l. c.



HISTORIA I.

A. CAMERARI I (1)

Sistens amaurosin unius oculi ab idolo nigro occipientem, revellentibus nervinisque laudatis curatam.

Juvenis statura brevis, corporis habitu gracilis & macilentus, capillis niger, ante aliquot annos tertiana nostra epidemia etiam prehensus, inde tamen haecenus bene valens atque diligens; quippe in multam saepe noctem lucubrare (*m*) solitus, observavit oculo suo sinistro (nunquam dextro) obversantes musculas (*n*); sed eas aliquamdiu neglexit, quia pro veris animalculis per aerem volitantibus tamdiu habuit. Tandem vero manibus captaturus talem majusculam & prehensurus, oculis quoque illam persequens, simulque in vicino pariete quasi depingi videns, deceptum se se haecenus opi-

(1) Act. nat. cur. Vol. 1. Obs. 159.

(*m*) Vide §. 39. e).

(*n*) Vide §. 16, b.)

nione sua agnovit; proin illas ne quidem amplius curavit, maxime quod nec doleret inde vel ruberet oculus, nec ullum in legendo scribendove detrimentum caperet. Cum vero in septimanam modo quartam durarent ista (o), ex improvise inter legendum circa ipsum meridiem miratur musculam suam, quæ parva prius nihil fere hætenus ipsi faceffebat molestiæ, augeri simul & semel ad magnitudinem phaseoli prorsus nigri, circum circa tamen quasi nube quadam cincti clariore, quo ipso proin literas multas obvelavit, atque visum fere omnem isti oculo interceptit. Cum & hæc molestia durasset per 2 septimanas, neque tamen lumen omne isti oculo ademisset, quin legere adhuc isto potuerit utcunque; tandem simili veloci modo iterum quasi nihil cogitantem invasit, & sinistrum ipsius oculum occupavit nigredo major atque tenebricositas tanta, ut legere amplius vel personam agnoscere, coloresve isto oculo discernere non potuerit, lucis modo atque tenebrarum vicissitudines valens distinguere (p). Ita constitutus me demum consuluit, atque super varias

(o) Vide §. 10. No. 2.

(p) Vide §. 9. No. 2. a).

circumstantias quæsitus seqq. superaddidit, nullam prorsus causam esse sibi cognitam: lucubrationes istas non æque fuisse nimias, ad horam modo noctis IO^{am} vel II^{am}, raro ultra, protractas, nihil constare sibi de siccata scabie, nihil de emanente vel suppressa narium hæmorrhagia, de catarrhis nihil. Ebriositatem omni modo declinavit, & contra non excessus saltim sed actus omnes venereos & lascivos solenniter protestatus, victu autem semper usus est laudabili cum reliquis sodalibus eodem, quibus tamen nulla unquam de visus hebetudine quærela fuit. Nunquam quidquam in dextro oculo fuisse observatum, sed mansisse huic pristinam visus aciem; nec ex sinistro lacrymas stillare, nec ullum cujuscunque morbi alterius indicium sibi notum esse. Hisce ita perceptis tandem oculos etiam inspexi ipsos, & deprehendi, nullum prorsus in affecto sinistro comparere vitium, nisi quod pupilla ejusdem altera dextri oculi sit paulo amplior (*q*); de reliquo utrumque eadem exhibere phænomena, dilatari in tenebris, stringi ad lucem (*r*), ferre intuentis imaginem. Ante

(*q*) Vide §. 17. a).

(*r*) Ibidem b).

omnia igitur diætam ordinavi, lucubrationibus omnibus interdixi, ad diem proximum Pulv. digestivos dedi ex cinnab. nativ. præpar. cum Nitr. puriss. crystall. præp. sem. fœniculi & rad. Valerianæ. Deinde potiunculam laxantem scripsi ex rhabarbaro & fen-
næ foliis in aqua coctis cum manna (s). Ab-
hinc curavi vesicatoria in utroque brachio
poni (t), valerianæ radicem cum fragmento
succini in dorso suspensam gestari, mane se-
men fœniculi masticari, ejusdemque decocti
calentis vaporem oculis excipi; interne ve-
ro usurpari Pulv. ex rad. Valerianæ (u),
herb. Euphrasie (x), sem. fœnicul. succino
præpar. crystall. præpar. matr. perl. præpar.
non sine Nitr. puriss. cum infuso theiformi
ex herb. euphras. cum flor. beton. meliss.
acetosella, salvia, flor. consolid. regal. ci-
chor. paralyf. cyani, & pilulis, sumendis
noctibus alternis, extr. bezoard. chaqverill.
helenii, pœoniæ, valerianæ, ligni aloes,
castorei, rutæ, cum cinnab. nativ. præpar.
&c. Post dies 14 lætus rediit, & nunciavit

(s) Vide §. 68.

(t) Vide §. 111. sq.

(u) Vide §. 86.

(x) Vide §. 80.

recuperatam oculo videndi facultatem, non dum quidem diuturnam adeo & constantem, sed matutinam modo, dum evigilans per horam unam, alias plures, semel ad prandium usque, videt iterum distincte omnia, ita tamen, ut & sinistro illi oculo obversetur adhuc desuper quasi suspensa nubes exigua, & occluso dextro eidem tenuis videatur obversari nebula vel araneæ tela. Reliquum diei non dum quidem de hac visus claritate participare, neque tamen pristinam caliginem superesse. Quandoquidem vero proficiscendum ipsi erat... hinc ante discessum ejus dedi modo unicam pilularum laxantium dosin ex aloe præpar. cum magist. Jalapp. & extr. panchymag. non sine accessu extr. Valerian. insuper vesicatorium jam nuchæ imponendum svasi, pulveris vero nuperi atque pilularum reiterationem, ac reliquorum euporistorum continuationem commendavi, dato simul naribus leni errhino (y) ex herb. majoran. flor. lil. conv. femin. nigell. & elæosacch. errhino: sub quorum usu tandem penitus convaluit, & pristinam visus integritatem recuperavit.

(y) Vide §. 101.

HISTORIA II.

FR. HOFFMANNI (z)

Exhibens amaurosin subitam ex ira & neglecta scarificatione ortam, quam scarificatio in primis, dein vero alia efficacia etiam remedia, sustulere.

Studiofus 37 annor. temperamenti sanguineo-melancholici a teneris se prorsus studiis dedit, lucubrationibus admodum iudulfit, maxime cum ante biennium erudiendis liberis operam navaret. Namque tum ad seram usque noctem protraxit meditabundos labores; hora 4^{ta} matutina iterum surrexit, ad prandium usque jejunos mansit, aut saltem vini adusti haustum assumpsit, & sub epulis parco potu usus alvum semper habuit segnem. Hoc vite genere per annum cum dimidio continuato accidit, ut dum gravi aliquando percelleretur iracundia, primum capitis dolores ac sensum fornicationis in fronte, & tum subitanam incidit cœcitatem cum gravi auditu, sermone præpedito, ac tensivis brachii dextri pedisque tormen-

(z) Consult. & resp. med Cent. 1. Cas. 42.

tis (a). Adhibita protinus sunt pediluvia, & vena in sinistro pede secta, quæ non minus ac ea, quæ elapsis post binis hebdomadibus in brachio sinistro tundebatur, nullum fudit cruorem. Hinc scarificatio, cui olim assueverat, per biennium vero supersederat (b), in nucha ac vertigine capitis instituebatur; & alvi obstructio clystere emolliente oppugnabatur. Tum visus quædam rediit potentia, quæ sub accensam lucem melius, quam lunæ splendorem, videre valuit; legere ramen non dum potest, ac nubeculas adhuc ante oculos versari asserit. Ego in consilium vocatus primum ordinavi hunc §em:

R. Cinnab. nativ. præp.

Lapid. 69.

Succini præp. aa. ʒij

Sal. volat succini

Sal. C.C. aa. gr. x. M. f. §. S. ad ʒj
pro dosi sumendus. Deinceps commendavi
has pilulas:

R. ꝑ̄ dulc.

MP. nostrar. aa. ʒj.

Extr. panchym. CROLL. ʒss

—— Castorei gr. jv. M. F. pil.

(a) Vide §§. 19. 25 26.

(b) Vide §§. 37. e) 91. 95. c).

ex scrupulo 20. Harum nimirum pilularum 20 tribus successive diebus mane sumpsit. Tum per 5 dies mane pariter ac vesperi ℥em adhibuit; postea iterum pilulas per 3 dies, & demum ℥es cepit, & sic alternavit. Porro hoc decoctum dedi:

R. Rad. Valerianæ ℥j

Herb. Melissæ M. j

Sem. Fœnic. ℥ij . Conc. cont. D.

S. Species instar The bois usurpandæ. Hujus enim vaporem mane oculis admittere, & post sumpta medicamina commendata 8 vel 10 vascula forbillare debuit. Non minus exhibui balsamum meum vitæ, ut illum & naribus admoveret, & eodem tempora inungat, & tandem 8 illius guttas mane ex allegato infuso hauriat. Denique etiam quotidie in pediluvia ex surfuribus tritici & floribus Chamæmeli pedes ad furas usque immisit. Et his per aliquot hebdomades rite adhibitis visus perfectam recuperavit potentiam.



HISTORIA III.

L. HEISTERI (c)

Sistit amaurosin ab idolis nigris, e fletu multo & crebro monetarum fulgentium aspectu ortum trahentibus, occipientem, nec non medendi methodum HEISTERIANAM.

Monetarii uxor sex supra triginta annos nata post mœrorem multo cum fletu, crebrumque nitentis argenti ac fulgentis monetæ aspectum (d) ab aliquot hebdomadis varias maculas nigras, atrosque interdum annulos catenæ in modum sibi innexos (e), præ oculis observare cœpit, videbanturque hæc ab intuitu monetarum ulteriore ingravescere. Prognosi aliorum Medicorum malum in amaurosin abiturum pronunciantium exterrita, oculisque suis metuens, meum finiente Augusto A. 1712 imploravit auxilium. In oculis clavis ac pellucidis cum nulum conspicuum esset vitium, ægram bono

(c) Med chir. u. anat. Wahrnehm. 1 Band No 128.

(d) Vide §. 30. e).

(e) Vide §. 16. b).

esse animo iussi, imperaviqve 1) a letu & sollicitudine sibi temperaret, abstineretqve; quod ita humores pravi uberius ad oculos allekti vasa eorum inferciendo maculas illas augeant: 2) aspect. nitentis argenti monetæqve refulgentis, quoad ejus fieri possit, vitaret, vel si vivendi necessitas id exigat fieri, perspicillis viridibus, objecta non augmentibus, oculos eo tempore muniret: 3) solem, flammam, aliaqve fulgentia objecta, perinde candidiorem supellectilem lineam non multum intueretur, hyberno etiam tempore nivis, a sole præsertim illustratæ, aspectum fugeret; ac si per eam sibi iter faciundum foret, semper alteram in partem ab sole non illustratam oculos converteret. Porro consului 1) phlebotomiam in pede ad 3viiij. x. 2) Pilulas catharticas scopo revulsionis a capite oculisque:

℞. Extl. panchym. CROLL.

℥ dulc. aa. ʒij

Resin. Jalapp. subact. ʒj.

Effert. lign. sassafr. q. s. F. pil.

gr. j. consperg. pecif. cephal. MICH. sumat alternis diebus cubitum itura pro dosi No xiiij, vel etiam xv aut plures pro re nata, si non sat purgaretur a minore dosi. 3) Mane quovis, ac dein sæpius interdiu, oculos

aqua frigida recenti probe colluat (*f*). 4)
 Infusum ophthalmicum sangvinem attenuans
 præscripsi :

℞. Herb. Beton.

—— Euphras. aa M. j.

Ras. lign. Sassafr. ℥℞.

Sem. Fœnicul. ℥ij. M. concis. cr.
 m. D. ad scatul. Qvotidie mane & a meri-
 die hora 4^{ta}, qvantum 4 digitis capitur, in
 ollam theatam injiciat, ac fervidam aquam
 affundat, hujusqve infusi qvavis vice vascu-
 la 5. 6. instar theati potus, at non admodum
 fervide, cum saccharo hauriat. Et qvoniam
 aquæ frigida non multum tribuens ægra col-
 lyrium qvoque rogabat, præscripsi:

℞. ∇^a fl. Cyani

—— Rosar. aa. ℥jv.

Nitr. puriss. ℥j. M. Hac aqua sæ-
 pius per diem, alternando cum ∇^a pura fri-
 gida, oculos frigide humectaret vel ablue-
 ret, svasi. Spectata deniqve diæta monui,
 frugaliter vesceretur, vitaret cibos copiosos,
 præcipue concoctu difficiles, ut suillam, fic-
 ca pisa, phaseolos, &c. vino parce uteretur,
 pro potu consveto hauriret vel tenuem ce-
 revisiâ vel aquam pauxillo vini mistam. In-

(*f*) Vide §. 103. A. No 7.

de aliquo post tempore maculæ imminutæ sunt visu bono superstitæ.

Conf. ibid. casus analogi No 134. 400. 449. Et
2 Band No 206. 343 335.

HISTORIA IV.

E J U S D E M (g).

Casus priori utcumque per omnia fere similis.

Consiliarius quidam 50 annis major, plurimumque scribendo ac legendo occupatus, ante 6 fere hebdomades, dum interdiu legeret, observavit ante oculum dextrum (b) velut filum atrum serici aut lanæ ultro citroque motitari; quod phænomenon neglectum cum sponte, ut sperabatur, non desisset, neque postea seu catharsi, seu facculis discutientibus, seu vino Gallico subtiliter oculo illito, seu vino adusto Rhenano palpebræ applicato, seu denique selteranæ aquæ potui cedere volet, opem meam poposcit. Lævo oculo clauso dexter vicina objecta sic fatis acriter videbat, remota vero non per-

(g) Ibidem I Band No 196.

(b) Vide §. 16. b).

inde. Porro jam sinister quoque oculus interdum, præprimis ad multam scriptionem, dolebat. Data prognosi: malum hoc superatu arduum sæpe esse, præscripsi (omissa Væ Se & catharsi, quippe quas jam ante instituit)

R. Herb. Euphras. M. ij

Flor. Rosmar.

—— Salviæ

—— Cyani aa. p. j.

Ras. lign. sassaf. ʒj.

Sem. Fœnicul. ʒss. M. concis.

gr. m. D. spec. pro Thee bis per diem hauriendo.

R. Milleped. præp.

Sem. Fœnicul.

—— Anisi aa ʒj.

Cinnamom. ʒss.

ʒ dulc. ʒj.

Sacch. alb. ʒiiijss

°.°. destill. Fœnicul. gtt. vj.

—— ——— Anisi gtt. iij. M. F.

ʒ. Sumat mane, a meridie, & ante somnum
2 cusp. cultri ex infuso vel ∇^a Fœniculi.
Porro collyrium:

R. ∇^a Valerian.

Fœnicul. aa ʒiiij.

Fl. Cyani ʒij.

Reg. Hung. opt. ʒj.

Sal vol. oleos. s v l v. 3j. M. Utatur sæpius per diem. Imperata præterea pediluvia vespertina, crebra pedum frictio, & sedula capitis pectinatio, ac denique umbraculi ad lumen usus, vetita lectione vespertina characteris minutioris. His remediis, præsertim Pulv. iterato, æger prorsus convaluit.

HISTORIA V.

EJUSDEM (i).

Incipiens amaurosis ab amblyopia methodo Auctoris prorsus curata sistitur.

Servus 37 annorum ab aliquo tempore ita sibi visum imminui, citra ullum in oculis vitium apparens, querebatur, ut jam eminus nihil distingveret, sibi que ita videri ajebat, quasi trans peplum objecta intueretur (k). Nauseas simul stomachi sæpe experiebatur. Idcirco 29^{na} Apr. 1729 præscripsi:

R. Rad. Ypecac. gr. xxv.

☐ vitriolat. gr. x. M. F. Pulv. ma-

(i) Ibidem 2. Band. No 75.

(k) Vide §. 16. 2).

ne ex haustu calido sub idoneo regimine sumendus (1).

R. Herb. Euphras. M. j.

—— Hyssopi M. ſ.

Ras. lign. Sassafr. ʒvj. Conc. gr. m. D. pro infuso bis per diem hauriendo.

R. Trag. ophthalm. n. ʒjv. cujus mane, a meridie, ac vesperi sumat ad 3 cuspides cultri. (Est vero tragea hæc Pulv. præcedentis historiæ, nisi quod pro ꝑ dulci suffecta sit Rad. Valerian. min. cum Cubebis, omissis oleis). Porro

R. ∇æ Valerian.

Fœnicul. aa. ʒiij.

Reg. Hung. ʒiij.

Sal vol. oleos. ʒj. M. D. pro oculis ter de die hac ∇^a illinendis. Tum inter scapulas vesicans amplum appositum; ac Majo mense phlebotomia imperata. Die 19^{na} Maji nunciavit æger, se ab his remediis plane sanatum esse.

(1) Vide §. 63. sq.

HISTORIA. VI.

EJUSDEM (m).

Exhibet amaurosin perfectam, nullis, efficacissimis licet adhibitis, remediis medicabilem.

Textoris filius undeviginti annos natus, pallidus, & catarrhis obnoxius, a 4 hebdomadis post vehementem capitis dolorem ac rheumata amaurosi correptus, cum opem expeteret, dedi:

R. Extr. panchym. CROLL.

℞ dul. rit. ppt. aa. ʒiʒ

Resin. Jalapp. opt. trit. gr. 45.

M. c. eff. lign. F. pil. gr. j. Su-

mat 4^{to} quovis die sub noctem No 15 ad 20.

R. Herb. Euphras. M. j.

—— Roris mar. M. ʒ.

Rad Valerian.

Sem. Fœnicul. aa. ʒ ʒ. M. concis. cont. cr. m. D. pro infuso mane & a meridie hora 4^{ta} ad modum potus theati ad vascula 4. 5. hauriendo.

R. Eff. lign.

Eff. succin. aa. ℥iij. M. D. ad
gtt. 40 cum infuso priore semper sumendas.

R. Lap. 69 citrat. ℥j

‡ diaphoret. ℥℞.

℥ dulc. ℥ij. M. sumat qvovis
vespere, qvo pilulæ catharticæ non sumun-
tur, ad cuspidem cultri ex ∇^a fœniculi.

R. Pulv. Majoran. ℥iij.

Schœnanth.

Cubear. aa. ℥℞

Turbeth. mineral. ℥j. M. D. m.
& v. pauxillum naribus attrahendum.

R. ∇^a Valerian.

Fœnicul. aa. ℥ij.

Reg. Hung. ℥℞

Salvol. ol. sylv. ℥j. M. F. Colly-
rium, qvo oculi qvavis 3^{ta} hora diei ablu-
antur & humectentur. Porro vesicantia nu-
chæ primum, dein pone aures, ac demum
ad caput applicari jussi. Ubi hæc aliquvam-
diu frustra æger usurpasset, tandem seta-
ceum qvoqve ad nucham adhibitum est, sed
perinde sine ullo successu.

Confer. ibid. observationes 2 Band. Nro 60. 64.
in qveis eadem methodus adversus imperfectam
amaurosin feliciter cessit.

HISTORIA VII.

J. L. SCHMUCKER I (n),

In qua exhibetur amauroseos post febrem petechialem secutæ exemplum, quam SCHMUCKERIANA medendi methodus prorsus curavit.

Miles e petechiali febre decumbens 13 dies continenter deliravit. Idoneis remediis, præsertim vero 4 vesicantibus, adhibitis, ubi melius habere cœpit, amblyopiam gravem nactus est. Spes erat fore, ut viribus incrementibus visus quoque acies revertatur: contra vero hæc iisdem peribat gradibus, quibus illæ crescebant, ægerque post octiduum nihil prope vidit, cum pupilla admodum ampla, & ad omnem frictionem immobili (o). Ceteroquin dolor nullus, nullus aurium susurrus simul adfuit. Postero mane data ☐ emet. gr. jv cum saccharo (p) 4 aut 5 insignes vomitus plurimi muci lenti

(n) Chir. Wahrnehm. 1 Th. 43 Beobacht. p. 474. fqq.

(o) Vide §. 17. a) b).

(p) Vide §. 65.

bilioli moverunt. Tum amplum nuchæ veficans, aliaque pone ambas aures (*q*), admota, rursusque die insequente ac 3^{to} ☐ emet. gr. ij. pro dosi exhibita, pro eo ac par erat, vacuarunt. Unde die 4^{to} jam virus aliquatenus redibat, pupilla quoque motum recuperante; sed æger objecta haud dum rite discernebat. Veficantium loca ope ungventi basilic. cum pulv. cantharidum per 3 hebdomades in fluxu retenta (*r*), simulque exhibitæ pilulæ (*s*)

Rx. Gumm. Ammoniac.

Sapon. Venet. aa. ʒj.

☿ Milleped. ʒij.

Resin. Jalapp. gr. xvj

Rob. Junip. q. f. F. pilul. gr. jʒ.

S. ter de die No xij. Post qvattridui usum & pupilla contrahebatur promptius, & colores jam æger melius discernebat; dux tamen eidem adhuc opus fuerat. Idcirco quotidie mane jejuno stomacho millepedes (*t*) 60 contritæ in juris insulsi omniqve pingvi orbatibinis vasculis, super prunis vase clauso coctæ & colatæ, dari cœptæ; a meridie vero

(*q*) Vide §. III.

(*r*) Vide §. II 2. b)

(*s*) Conf. §. 65.

(*t*) Vide §. 82.

ac vesperi semper xij pilulæ superiores Extrinsecus porro Ω Lavend. cum Ω Θ * vol. ad æqvum pondus mistis manus humectatæ oculis admovendæ ac palpebræ superiores illinendæ erant (u). Post 4 hebdomades æger plane convaluit. Vix octiduo millepedes cum jure dabantur, cum sedimentum urina poneret, toto morbi prioris tempore nunquam visum.

HISTORIA VIII.

EJUSDEM (x)

Sistens perfectam utriusque oculi amaurosin, ab arthritide retropulsa ortam, eademque medendi ratione profligatam.

Vir 52 annorum arthriticis doloribus sæpe obnoxius, ante biennium denuo tam vehementi id genus paroxysmo dextra in axilla prehensus, ut non modo plures noctes insomnes transigeret, sed vehementer etiam febricitaret, ex amici consilio cum ad locum dolentem splenia aqua frigida imbuta

(u) Vide §. 103 B. No 3.

(x) Vermischte chir. Schrift, 2 B. No 1. p. 19.

applicuisset, vix quartum iterato remedio dolores evanuerunt; at æger post 12 horas utriusque oculi visum usque adeo amisit (y), ut lucem nullatenus sentiret (z). Pupillæ cum diffusæ magnopere tum etiam immobiles (a) erant. Eapropter locum ante dolentem illico setaceo perfricari jussi, vesicansque applicui, ac \square ri emet. gr. iij præbui, quæ vomitum copiosum causerunt. Postero die æger jam aliquid lucis percepit, pupilla quoque parumper facta mobili. Vesicanti, quod probe vires exseruit, dempto novum suffectum, ac ad palmum abhinc distante loco 3^{um}, stimuli majoris ergo, adnotum. Interno usui data MR^a ex ∇^x aurantior. \mathfrak{z} jv cum \square ri emet. gr. jv, cujus illico dimidium hauriendum erat, ac semel inde oborto vomitu, e reliquo ejusdem quavis hora cochl. j capere jussus, septies adhuc eodem die vomuit. Vespero melius jam vidit, quin tamen vel hilum adhuc distingvere valeret. Vesicantium demptorum plagæ unguento basiliconis cum pulv. Cantharidum deligabantur (b). Mane 3^{tio} æger me jam

(y) Vide §. 38 d).

(z) Vide §. 9. No 1.

(a) Vide §. 7. a) b).

(b) Vide §. 112. b).

fic satis dignovit. Dedi rursus \square ri emet. gr. ij in ∇^x \tilde{z} vj soluta, ut horis alternis cochl. j caperet: unde unicus tantum vomitus, multæ contra nausææ obortæ. Pupillæ mobilitas notabilisque contractio rediit. Insequentibus diebus pilulæ (c) ac millepedes methodo superius (d) dicta exhiberi cœptæ; postremoque tempore etiam Ω us ophthalmici (e) vapor manuum opé ad oculos admittebatur. Sicque æger intra 9 hebdomades pristinum recuperavit visum.

HISTORIA. IX.

EJUSDEM (f)

Exhibet anni unius amaurosin eadem methodo percuratam.

Eqves legionis BELLINGIANÆ ultra annum utriusque oculi amaurosin passus, dextro, cujus pupilla summopere diffusa fuit, & ad omnem frictionem immobilis,

(c) Vide §. 65.

(d) Vide §. 82. & hist. præced.

(e) Vide §. 103. B. No 3.

(f) l. c. p 22. sqq.

cernebat nihil; lævi porro oculi pupilla etfi perinde admodum ampla esset, ad frictionem tamen haud dum prorsus immota mansit. Præmissa igitur leni catharsi (g) dedi MR^{am} e \square ri emet. gr. x in ∇ ^aaurant. ℥ xij solutis, qvovis primi bidui mane ter ad cochl. ij sumendam, unde sæpius vomuit: dein toto 3^{to} die variis ex interval- lis cochl. jv semper capiebat, citrà ullum vomitum, sed nauseis continenter duranti- bus (b), nisi qvod 3 hebdomades ita per- gendo alvus qvotidie aliquoties inde solve- retur. Eodem tempore amplum nuchæ ve- ficans admotum, ac 16 dies in fluxu conser- vatum (i), qvo sanato alia pone ambas au- res applicata, & in 3 periude hebdomades in fluxu servata (k). Inde ambæ pupillæ fa- ctæ mobiles, minusqve quam ante diffuse spem integræ sanationis dedere. Idcirco qvo- tidie ter pilulæ resolventes (l) datæ, ex- terne vero Ω us ophthalmicus (m) adhibitus,

(g) Vide §. 68.

(b) Vide §. 66 No 3.

(i) Vide §. 112. b).

(k) Ibidem.

(l) Vide §. 65.

(m) Vide §. 103. B. No 3.

eo cum successu , ut visus in dies emendaretur, usque dum post 5 menses ad pristinam rediisset integritatem. Homo postmodo civilibus negotiis admotus est , ubi calamo calculisque distinebatur , oculis nihil molestiarum faceffentibus.

Confer. Historiæ §. 66. No 2 & 5. ejusdem cum isthic narratis tenoris.

HISTORIA X.

G. de VEZA Fac. Med.
Budenf. Directoris ,

*Sistens juvenem amauroticum STÖRCKII
& COLLINI remediis quoad unum oculum sic satis percuratum.*

Juvenis ad 20 annos natus rei annonariæ castrensis auriga e febre (ut videbatur putrida) plures dies neglecta (n) perfectam utriusque oculi amaurosin retulit. Die 25 April. 1779 in militare nosocomium Budense illatus debilis adhuc erat , oculis nil vitii præter amplitudinem ac immobilitatem pupillarum exhibentibus. Post varia exter-

(n) Vide §. 46.

na ophthalmica nequidquam ab chirurgo tentata demum in curam D. G. de VEZA cessit. Datum primum omnium catharticum (o):

R. MP. RUF. gr. xxv.

℞ iii dulc. gr. vij.

Magist. Jalapp. pin. sub. gr. jv.

M. F. pil. pro dosi sumendæ. Resumptis postea viribus rursus purgatus est:

R. ♂ Jalapp. ℥ss

Arcan. dupl. gr. xv. M. F. ♂ D. pro dosi. Demum die 18^{va} Junii sequentia dari cœpta:

R. Extr. Pulsatill. nigric. ℥ss (p)

—— Aconiti ℥j (q)

Aquilæ albæ ℥j (r). M. F. pil. gr. iij. S. m. & v. No 5 superbibendo calidum semper decoctum, quo pro potu communi utebatur, nempe

R. Herb. Arnicæ M. iij.

Flor. Arnicæ M. ij. (s)

Rad. Lapat. acut.

—— Bardan. aa. ℥j.

(o) Vide §. 68.

(p) Vide §. 84.

(q) Vide §. 78.

(r) Vide §. 73.

(s) Vide §. 79.

Rad. Liqvirit. 3 vj. M. concis.
 D. pro potu methodo nosocomii parando.
 Horum sub usu 10mo qvoque die interpone-
 batur catharticum posteriore loco dictum.
 Post 14 dies lucis aliquid jam oculo dextro
 usurpavit, & lapso mense vestium qvoque
 colores vividiores discernebat, visu in dies
 hujus oculi nova incrementa capiente. Post
 sesqui mensem aucta pilularum dosi, sumptis
 nempe mane ac vesperi Nro 7, visus oculo
 dextro sensim ita rediit, ut æger sine duce
 jam domi forisqve oberraret. Die tandem
 20ma Aug. celebrata revisione militari, cum
 ad servitia suis cum sociis haud amplius esset
 necessarius, nosocomio militiaqve dimissus
 est. Dextro oculo tam insignem emenda-
 tionem experto sinister nihil pene ab reme-
 diis iisdem profecit; qvippe qvo nil nisi con-
 fusam lucem ac veluti per velum transparen-
 tem se percipere æger ajebat, pupilla qvoque
 ejusdem vix quidquam mobilitatis adepta (t).

(t) Vide §. 61. No 1. a).

HISTORIA XI.

J. J. WEPFERI (u)

*Exhibens amaurosin lente natam, ac variis
ulceribus arte excitatis sublatam.*

D. JOH. CONRADI N. N. UXOR 31 annor. staturæ paulo brevioris, albicans, poculis valde dedita, adeo ut quotidie fere post meridiem ebria sit (x), venerea, iracunda (y). Die 23 Febr. 1678 dum nebat, nebula oculo dextro obversabatur (z); illam abstergere conabatur, & oculum perfricabat, mox magis magisque obtenebratus fuit oculus dexter. Die 16 Febr. jam visus in hoc oculo prope periit. Die 1 Martii nihil amplius vidit. Vena secabatur in brachio dextro: die 2 Martii salvatella manus sinistrae. Tum quoque sinister obtenebrari coepit (a). Vesicatoria post aures applicata. Die 3 Mart. magis magisque obscurabatur.

(u) l. c. Obs. 180.

(x) Vide §. 35. a).

(y) Vide §. 34. 39. b).

(z) Vide §. 16. a).

(a) Vide §. 58. No 4.

Die 5 Mart. visus in utroque oculo periit. Die 6 Mart. illam conveni, scil. 11 die ab incipiente cœcitate. Ambo oculi clarissimi, pupilla nigra (b), amplissima (c), iridis vero peripheria angustissima. Caput non valde doluit a principio huc usque; primum tamen tensionem a media fronte ad tempus & ad aurem dextram & futuram coronariam cum lancinatione quadam brevis durationis, postea incipiente cœcitate sinistri quoque oculi similem tensionem his terminis circumscriptam percepit cum brevi quadam lancinatione, nec tam vehementi, ut quandoque in hemicrania evenire solet (d). Reliquis sensibus valet. Gestat amuletum contra visus vitia: bibit vinum, cui infusæ sunt rad. Valerian. silv. (e) Cichor. Die 6 Mart. pilul. cephalic. gr. xxij sumpsit; purgarunt duodecies (f). Die 7 Mart. setaceum per cervicis cutim traduxi (g): hodie subinde cœu fulgur oculis obversabatur; aliquando

(b) Vide §. 17. d).

(c) Vide §. 17. a).

(d) Vide §. 19.

(e) Vide §. 86.

(f) Vide §. 68.

(g) Vide §. 115.

putat vannum prunis ardentibus plenam fucuti & ventilari quasi, aut ventilabro projici (b). Die 8 Mart. conquerebatur de dolore circa radicem pomi oculi & dentium ex dextra in sinistram genam translato (i). Uti cœpit Trag. ex rad. Valerian. sem. Fœnicul. & diaphor. &c. ordinata. Bibit decoct. Sassafr. passul. Corinth. Tempora illinit ungv. alabastr. acuato .°. N. M. express. Die 18 Mart. utrique carpo vesicatoria applicui (k), & noctu dedi pilul. cephal. Vesicatoria aliquoties reiterata, etiam post olecrana & subtendine deltoidis applicata fuerunt. Die 23 Mart. applicatus fuit pulv. ovillus sine juvamine. Die 25 Mart. inusta fuit moxa sinicipiti sinistro (l): postea porrectum vesicatorium. Die 27 Mart. circa medium noctis vidit lucem per rimam. Die 30 Mart. distinctius averſa luce vidit staturas stantium & ambulantium; neminem tamen agnovit. Die 11 April. 1678 distinctius vidit; me per aliquot dies absentem & nunc demum reducem agnovit; colores distingvere & figuras agnoscere, ac etiam per plateam ambulan-

(b) Vide §. 61. No 2. c).

(i) Vide §. 20.

(k) Vide §. 111.

(l) Vide §. 116.

tes videre potuit. Pupilla angusta rursus, & prope figura & amplitudine naturali prædita. In dorso nuper vesicatoria applicata fuerunt. Doluit admodum fetaceum: itaque funiculum extraxit, foramen dextrum forfice dilatavi, pisum indidi, jussi, ut ceu fonticulum aliquamdiu apertum servaret. Hactenus iterato purgabatur; perrexit tragea. Jam a diebus 6 omisit decoct. Sassafr. Die 13 April. legere potuit vocabulum Brod Germanice in tabula nigra exaratum; prætereuntes ædes ipsius vidit. Subinde caput dolet. Utrique foramini fetacei indidit pisum. Pupilla angusta manet, irisque amplior evadit. Die 22 April. ipsamet literas pinxit optime, ac combinavit, ut legi potuerit scriptum, idque linea recta, non incurve aut deflectens a linea. Menstruata erat; caput doluit. Die 23 fonticulum in-ussi brachio sinistro (*m*). Die 4 Jun. 1678 distincte vidit, in publicum prodiit: pupillæ angustæ. Ob iracundiam nuper facies obtenebrabatur (*n*), sua sponte tamen rursus clarior fiebat. Die 12 Aug. distincte vidit, pupillæ angustæ. Ait subinde se circa radi-

(*m*) Vide §. 114.

(*n*) Vide §. 34.

ces oculorum aut intra cranium quendam quasi contorsionem dolorificam percipere, subsequente cephalalgia & aliqua visus hebetudine, quæ tamen non diu durabat. Die 26 Sept. bene vidit in oculo sinistro, minus in dextro. Conqueritur adhuc de constrictione quadam & pulsatione intra frontem. Sibi non temperat a vino. Pergit purg. pil. ceph. & V. S. Alter fonticulus excitandus erit. Die 11 Nov. 1678 oculus dexter minus validus sinistro; subinde caput ibi dolet, pupilla amplior, verum si lucida intueatur, statim rursus angustatur. Aliquando tumultus miros in capite versus frontem experitur, ac si aliquid intus exploderetur cum dolore nunc tensivo, nunc gravativo, nunc punitivo, nunc momentaneo, nunc pertinacior: sentit subinde frigus quoddam: a potu sibi non temperat. Mens. Febr. 1679 adhuc vidit. Interea rursus poculis indulgit. Die 20 Febr. tussire cœpit, & purulenta eiecit. Phthisis imminet, quæ prior maritus obiit. Non desinit errores in potu committere. Svasi antiphthisica diaph. Jov. cum conf. decoct. pect. diacod. Ad d. 29 April. bibendo perrexit; vesperi ebria erat, tumultuosa & rixosa, ut solet alias bene pota. Sputum vero purulentum; non valde emaciatur. Videt bene, scribit, legit: mirum

a tussi vehementi visum non obtenebrari. Visum phthifica retinuit. Nuper scævam hemisphericam in sinistro latere passa est, unde Not. in dextro oculo minus vidit; non tamen ita visus periit, ut non objecta colorata, sed minus distincte, videret: in sinistro visus perstitit: ambæ palpebræ (forte pupillæ) æqualis magnitudinis seu amplitudinis manserunt. Die 14 Jul. phthifica post diuturnam diarrhœam, fastidium omnium medicamentorum, errores in victu, lites continuas, mortua est.

HISTORIA XII.

ZACUTI LUSITANI (o)

De amaurosi multorum annorum GALENICA methodo demum, in primis vero setaceo nuchæ indito, percurata.

Hoc malo cum premeretur puer quidam, & illæso apparente oculo videndi actione prorsus careret, & distillatione a capite, per multos annos, per oculos excreta copiosa

(o) Prax. med. admir. L. 1. Obs. 52.

materia crassa & fordida, laboraret, hunc obstructione... visualium nervorum... esse affectumprehendimus... Nos hoc ordine fumus curationem exorſi. Inſtituto regimine recto, celebratiſqve auxiliis univerſalibus, qvorum ope mucoſa excrementa ſunt vacuata, per 30 dies ſudationes imperavimus ex radice Chinæ, qvarum uſu copioſus excitabatur ſudor (*p*). Deinde cucuphis exſiccantibus & lavacris ſupra caput admotis, riſis prius bene pilis, uſi ſumus. Maſticatoria & errhina medicamenta (*q*) non prætermiſimus, qvorum ope tenax per os & nares excernebatur humor. Ut aures ſpirarent, qvæ cum oculis maxime conſentiunt, cauſticum retro ipſas affiximus (*r*), & ſimul ſetonem nuchæ indidimus (*s*), ut per has partes vacuaretur humor in oculos delapſurus. Toto, & capite, belle repurgatis alevioribus collyriis (*t*) incepimus: primum fuit verbenæ decoctum, pulv. offis ſæpiæ, ſuccus rutæ ſœniculi depuratus, ∇^a ſtillati-

(*p*) Vide §. 69.

(*q*) Vide §. 99. 100. 101.

(*r*) Vide §. 113.

(*s*) Vide §. 115.

(*t*) Vide §. 102. ſqq.

tia ex raphanis, & eorum foliis rhodomel, mel cum marrubii succo, decoctum Euphrasæ Chelidoniæ. His factis inditum est testudinis fel cum saccharo candido commixtum. Vinum album, in quo aurum quinquies erat ignitum. At cum lucem jam aliquantisper videret, hoc deinceps auxilio (quod licet videtur contemptibile, est tamen mirabilis efficacis) visum recuperavit, quod ita efficitur: accipe frustula porcine carnis vetustæ, ea in minutissimas taleolas seca, serva in ollula parvissima ænea, adjecto sale & odorifero vino albo, post 10 dies aqua stillabit, quæ ad recuperandum visum, roborandos nervos visuales, auferendam obstructionem, mirificam opem præstare fidissimo experimento adinveni.





INDEX I.

AUCTORUM.

A.

Aaskow laudat arnicam
in febribus intermit-
tentibus 468.

Aerel vidit pupillam con-
tractione iridis prorsus
abolitam 8. observavit
amauroses a metastasi fe-
bris intermittens 273.
quas sola setacea cura-
rabant 641. sqq.

Acta med. Berol. 69. 186.

- - Hafniens. 305. 551.
630.

- - Hassiaca 467.

- - Nat. cur. 205. 218.

223. 251. 282. 439.

624. 670. 672.

- - nov. Nat. Cur. 414.

460. 569. 663.

- - Parisina 117. 134.

182. 298. 310.

- - Svecica (v. Aerel,

- - Odhelius, Ribe).

Actuarius confudit mydria-
sin cum amaurosi 49.

Adolphus refert amaurosin
a colica nephritica 251.

Ægineta amaurosin qui de-
finiat? 2. eandem con-
fudit cum mydriasi 49.
in ista objecta minora
solito apparere ait 267.

Aetius eadem, quæ Ægi-
neta, asseruit 49. 267.
analeptica amauroticis a
morbo acuto præberi ju-
bet 661. sq.

Alberti de amaurosi a par-
tu 163. ab hæmorrhagia
subito repressa 192. de
ea, quæ a mercurio 453.
(v. Küchler).

Albertus (v. Wedelius).

Albinus amphyblestroidem
feliciter injectam vidit
66.

INDEX I. AUCTORUM.

Albrecht de epilepsia post amaurosin 339. de amaurosi a partu vesicantibus curata 615.

Alischer amaurosin a tertiana cortice fugata, suppressisque catameniiis ortam, his revocatis emendavit 419.

Amatus vidit amaurosin a colapho & vulnere capitis 281.

Ammanus amaurosin ab hypercatharsi ortam testatur 224.

Annal. Vratislav. (v. Buchholtz, Ebersbach, Genfelius, Kellner, Wogau) de amaurosi cephalæam solvente 72. laus arnicæ in contusis 468. amaurosis causat impotentiam lacrimandi. 345.

Archigenes 553.

Arnoldi 163.

Aurelianus splendores epilepsie esse prodromos observavit 932.

B.

Baumlin amaurosis a Væ Sc 213.

Baldinger (v. Daries) arnica data emendavit amaurosin 482.

Ballonius de amaurosi a meliceride opticos nervos premente 142.

Bartholinus 90. caligo a refosso vetusto sepulcro 183. epilepsia post splendores 333. eadem post amaurosin 339. amaurosis vomitu soluta 372.

Bartsch amaurosis gravidarum 92. puerperarum 219.

Becherel amaurosin revocatis Væ Sc pedis menstruis curatam refert 529.

Behr de amaurosi pytalismo mercuriali curata 440.

Bemerkungen von London (v. Hey).

Benedictus Alex. vidit amaurosin vulnere frontis curatam 608.

Bergen 39.

Berger de opio 172.

Berner de amaurosi a contuso capite 282.

Bertrand amaurosis in accessione febris intermittentis cortice Peruviano curata 513.

Beyträge Oesterreich. (v. Mayr).

Bing (v. Günz)

Binniger amaurosis a contortis nervis opticis 113.

Blegny amaurosis a calculo nervorum opticorum 111. post variolas 201. ab irritatis nervis vesicæ urinariæ & urethræ 299.

I N D E X I.

- Bloch amaurosis a mensibus suppressis 194. vitiosa pupillæ figura nativa 326. aquæ frigida laus in paralyfi &c. 554.
- Bœhmer aconiti laus in arthritide 466.
- Bœrhaave rejicit amauroseos definitionem antiquam 2. novam condit 3. amaurosis symptomatica sæpe curatur. 28 ab amblyopia sæpe occipit 29. vel ab idolis opticis 39. Boylei casum nescit explicare 32. de causis spectrorum lucidorum 45. idola nigra ab itinere per arenosa nactus est 132. sq. amaurosis ab exostosi venerea ossis multiformis 148. ab ebrietate 167. ab ophthalmia 259. a sanguinis jactura nata male explicatur 215. quæ ejus causa proxima, sedes? & quotuplex? 314. sqq. queis signis innotescat? 330. amaurosis imperfecta in acutis phrenitidem præfagit 341. cathartica valida poscit, si in retina sedem habet 408. ptyalifino mercuriali rite instituto curatur 437. sqq. Væ Sô ad syncopen fieri debet in cura amauroseos 527. laus pediluviorum in eadem 534. uti & errhinorum mercurialinum 546. laus aquæ frigida ad idola nigra abigenda 553.
- Bœrner balneis ac fotibus aquæ frigida curavit amaurosin ex onania ortam.
- Bonetus citatus 113. 138. 149. de amaurosi a Væ Se in fronte 213.
- Bontius de amaurosi ab esu oryzae calida 142.
- Borrichius de amaurosi syphilitica 305. collyria ad amaurosin imperfectam 551. 562.
- Van den Bosch de mydriasi verminosorum 150. 300.
- Bosman a saliva serpentis faciei illisa cæcitas 33.
- Botallus amaurosis ab erosione nervis opticis 114.
- Boxbarterus vidit amaurosin a barbæ rasura 90. item a prolixitate crinium sub alis ibidem
- Boylei mirus casus 32. cataracta errhino mercuriali curata 546.
- Brendel de amaurosi a partu difficili 162. unguentum ophthalmicum cæcitatem 14. annorum curans 561.
- Briggs amaurosis ab intenso frigore 187. lucis perceptio a bulbo oculi intropresso 319.

- Brisseau amaurosin repetit a colliqvato humore vitreo 307.
- Bromfield de amaurosi a tumore intra cranium 143. laus fonticulorum pone aures contra eandem 613.
- Brunner de amaurosi a ferro in encephalo effuso 151.
- Buchholtz de amaurosi a vini medicati potu 176.
- Büchner (v. Fischer, Segnitz).
- Büchwald (v. Wandeler).
- Budæus de amblyopia ab externo aere adaucta 188.
- Burnetus de amaurosi a fornacis calore 15.
- C.
- Cæsalpinus de amblyopia ab extenuato nervo optico 115.
- Camerarius de amaurosi opio sublata 465. vulnere capitis curata 608.
- Camerarius (El.) de amaurosi a vulnere canthi 294. de eadem vesicantibus curata 613.
- Camerarius (A.) amaurosin variis remediis sanavit 672.
- Cardanus lignorum decoctum commendat 487.
- Cartesius citatus 310.
- Cartheuser de amaurosi a suppressis catameniiis, curata iisdem revocatis 419.
- Celsus amaurosin vocat caliginem 8. confundit eam cum mydriasi 49. solvi alvi fluxu ait 372.
- Chomel de cæcitate ab effluviis mephiticis 182.
- Clauder de epilepsia amaurosin consecuta 340.
- Claudinus de idolis nigris 33. laudat oleum ex hepate mustelæ fluv. ad amaurosin 550.
- Cneulin de amaurosi vulnere frontis persanata 521. de procidentia bulbi oculi illæso visu 107.
- Collectan. Haun. 468.
- Collin aconiti laus in arthritide 466. amauroses arnicæ floribus curatæ 468. sq.
- Commentar. Edinb. 93. 183. 568.
- Commerc. lit. Norimberg. 178. 213. 223. 275. 362. 440. 527.
- Consbruch de amaurosi curata diaphoreticis 414. mercurio subl. corrosivo 460. sq.
- Craanen de amaurosi a convulsionibus 232.
- Cramer de amaurosi fetæco sanata 640.

I N D E X I.

D.

Daqvin de amaurosi a ver-
nibus 300.

Daries de eadem a succo
bellæ donæ in oculum
illapso 184.

Decker's de amaurosi a
stercorantibus 253. de
eadem uestione cranii cu-
rata 645.

Delius cit. 39. de uestione
cranii instituenda 657.

Demours de amaurosi ab
ophthalmia 264.

Denicler citatus 292.

Dolæus citatus 178.

Donatus de Comite solis
lucem sibi in tenebris
videre visa 42. de amauro-
rosi a vulnere capitis
282 de epilepsia post
splendores 335.

Drelincurtius de amaurosi
a tumore intra encephā-
lon 138.

Duretus de amaurosi a ca-
su ope cucurbitulæ ad
occiput sanata 526.

E.

Ebersbach de amaurosi pe-
riodica 363.

Erndtelius de amaurosi a
plica Polonica rescissa
205.

Eschenbach de subita amauro-
rosi 19. de alia a cata-
racta 96. a leucomate
resecto 93. a convulsio-

nibus 232. ab ophthal-
mia post cataractæ ope-
rationem 289. casus Pel-
lieriano similis 329. re-
jicit ptyalisimum mercu-
rialem in cura amauro-
seos 448. sqq.

Ettnüller de amblyopia a
spiritu salis ammoniaci
92. de amaurosi a nimia
venere 229. emetica cau-
te dari jubet 391. laus
liqvoris lumbricorum
552. & ungv. ophthal-
mici Brendelii 562.

F.

Fischer de amaurosi a la-
tente plica Polonica 206.

Floyer de amaurosi per
electricitatem curata 591.

Foesius statuit discrimen
amaurosim inter & ca-
liginem 9.

Fontanus de amaurosi a
Væ Sc 211.

Forestus de amaurosi la-
terali ex ictu 15. de
idolis visus a potatio-
ne & esu crudorum
169. de amaurosi ex ictu
capitis 283. sq. laus eu-
phrasæ in amaurosi 486.
uti & collyrii ex hepa-
te piscis Aelpuyck 549.
sq. (vide Gradus).

Formius de amaurosi per
inediam sublata 661.

Fournier de amaurosi ve-
sificantibus sanata 623.

Francus strumane solvit amaurosin? 380. eandem tabacci fumigatio discutit 542.

G.

Gabelchover de amaurosi a metastasi febris pestilentis 277.

Galenī definitio 7. solis lux major excæcat 126. exempla Dionysii sq. vetat iter per nives 132. apophlegmatismi 539. laus olei ex hepate mustelæ fluviatilis 550.

Geach de amaurosi & hemiplegia a vulnere oculi 254.

Geier de vulnere capitis 283.

Geisler de noxa vacuationum in amaurosi ab inopia humorum 406; sed analeptica dari tunc jubet 662. (v. Günz).

Genélius de amaurosi ab hæmorrhagia narium 218.

Gerbez de eadem ab solis luce in puerpera 127. & ab epilepsia, quæ reversa visus rediit 241.

Gesner aconiti laus in arthritide 466.

Gockelius de scintillis ex oculis erumpentibus 41. de amaurosi a convulsio-

nibus 233. de eadem lochiis soluta 376.

Gohlius de prævia cæcitate cephalæa biennali 69. de amaurosi a suppressa perspiratione 186. sq. ab ictu capitis 283. bis usu fontis Freywaldensis 534. semel vesicantibus sanata 624.

Gorter laus roborantium in amaurosi a nimia venere 506.

Gottschener de amaurosi aconiti usu curata 467.

Gradus restauratis a morbo viribus amaurosin abiisse vidit 662.

Grassius de vini in amaurosi efficacia 503.

Gravesande citatus 136.

Greding de amaurosi a bella donna 178. sqq.

Greimbs laus succi chelidonii 551.

Gruterus de binis tabulis in æde Tyberini Æsculapii curatorum cæcorum repertis 552. 671.

Guerin bini casus annuæ amauroseos 24. sq. de eadem a sanguine extravasato in capite 154. ab ictu oculi 287. a phantasia gravidæ 166. de Væ Se omni vererepetenti amaurosi proficua 517.

Günz de amaurosi hæreditaria 90. a tumore en-

cephali 134. a narcotico
172. a scabie ac tinea
repressis 197. 199. ab
arthritide retropulsa 209.
a Væ Se 213. sq. a par-
tu 219. a nimia venere
230. a causo 277. eme-
fi & acidulis curata 391.

H.

Hæn de visu duplicato 15.
de amaurosi a pleuriti-
dis metastasi 277. lau-
datur ejus methodus
dandi mercurium subl.
corros. 461. extollit vim
ferrati olei ad hæmor-
rhoides dolentes 551.
bis infelicitè tentavit
inustionem cranii in a-
maurosi 645. sqq.

Hagendorn de cæcitate
cum cophosi a variolis
201. de amaurosi ab
epilepsia 241. a sternu-
tatione 253. a serosa
colluvie 301. de eadem
sæpe reversa 363. de
splendoribus epilepsiæ
prænunciis 332. de a-
maurosi diuturno animi
affectu tandem soluta
669. sq.

Haller de amaurosi a reti-
na lapidea 112. de ea-
dem marti & cortici ce-
dente 508. choroisne
an retina sit visus orga-
num? 313. (v. Linnæus.

Molitor, Qvelmalz, Wefz-
prémy).

Hannæus de amaurosi a
repressis achoribus 198.
sq. a naribus læsis 297.
a vermibus fugata ant-
helminticiis 426.

Hannemann de cæcitate a
vesicante pone aures 178.
de eadem fonticulo cu-
rata 629. sq.

Heer de bulbo oculi in ge-
nam pendulo visu non
amisso 108. de amauro-
si a lunæ plenæ intuitu
128. a diaphoretico 170.

Heiland de amaurosi ab
extenuato nervo optico
116.

Heinrici de eadem a tinea
repressa 199. de alia
ptyalismò mercuriali ri-
te instituto sanata 455 sq.

Heister rejicit veterum de-
finitionem 3. dat aliam
4. exemplum amauro-
seos periodicæ 25. de
amaurosi a nebula in-
cipiente 31. a maculis ni-
gris 32. cum variis ap-
paritionibus 33. negat
amaurosim nasci ex ido-
lis opticis 39. de cæ-
co noctu etiam se lu-
cem videre credente 43.
de femina cæca, cui al-
ternis coloris albi & ru-
bri phantasma illudebat
44. sq. nigriorne pupil-
la amaurotica præ sana?

62. amaurosis a catara-
cta 100. glaucoma sibi
adsciscens 101. cum ce-
phalæa ad mortem us-
que a labe viscerum ab-
dominis 102. a vulnera-
tis nervis opticis 114. a
nivium aspectu 132. a
perspiratione suppressa
186. post variolas 201.
a convulsionibus 234.
ab odontalgia 249. a
suppressis mensibus, iis-
dem revocatis abiens
420. maculae nigrae ab
itinere in æstu 161.
amaurosin ab obstructis
nervis opticis petit 306.
rejecit sententiam Brisse-
auii 310. sq. amaurosin
pryalisino mercuriali sa-
navit 440. 447. 459.
euphrasie multum tribuit
486. laus aquæ frigidae
contra idola nigra 554.
embrocatione aliqvate-
nus sanavit amaurosin
602. exempla plurium
curatarum dat 680. sqq.
unius incurabilis 687.
- Heldius de amaurosi ab
hæmorrhagia uteri 219.
- Hellwig de eadem enemate
& cathartico sublata 530.
- Helmershausen frigore in-
tenso fugari vidit amauro-
sin 663. sqq.
- Henckel de amaurosi ab
extenuato nervo optico
116. ab hemiplegia 253.
- Herbert de cantelis in ele-
ctricitate adinistranda
600. sqq.
- Herculanus de amaurosi
a incero 163.
- Hermann de eadem a sup-
pressa febre intermitten-
te 271.
- Hey de aliqvot ægris ele-
ctricitate ab amaurosi li-
beratis 574. sqq. negat
eandem biennio diutur-
niorem electricitate sana-
ri 593.
- Hezelius cicutæ usu cura-
vit amaurosin 431.
- Hildanus de amaurosi post
crapulam 169. ab emesi
220. ab ictu capitis 283
a potiuncula qvadam
224. a cholera 226. ab
oculo icto 287. a vul-
nere supercilii, palpe-
bræ, frontis 294. sq.
laus euphrasie 485. am-
blyopia a lotione faciei
aqua frigidissima 181.
V^o So humores ad ca-
put pellit 216. setaceo
curatæ amauroses 633.
- Hildesius de amaurosi pa-
ne aromatico calide ver-
tici admoto curata 563.
- Hippocrates citat. 1. 9. con-
vulsiones pueris familia-
res esse ait 247. & vul-
nera superciliorum vi-
sui officere 291. epilep-
siam post splendores vi-
sos secutam narrat 336

I N D E X I.

- sq. visum hebetem & idola nigra in acutis damnat 341. sq.
- De la Hire citatus 310.
- Hirschel amaurosin catharticiis curavit 409.
- Höchstetter de eadem a nixibus partus 162.
- Hoffmannus (Fr.) errat in definienda amaurosi 6.
- de visu duplicato 45. de amaurosi ab emesi 220. sq. a cholera 226. a nimia venere 229. a retina affecta cum varicibus oculi externis 331. a scabie repressa 197. ab reliquiis exanthematum 202. a morbillis ibidem. ab ophthalmia 260. sq. in prognosi hallucinatus 348. sq. in cura laudat cathartica 407. expertus profuisse ptyalisinum mercurialem 439. laudat V. S. frontis & arteriotomiam temporum 520. hæmorrhagiam narium arte excitatam 522. hirudines ad anum 525. enemata 533. errhina 544. balsamum suum & epithema 564. setacea 632. sulphur aur. antim. & cinnabarim 501. inediam 660. curavit amaurosin oleo Cajeput 493. litu balsami vitæ 565. scarificatione &c. 677.
- Hoffmannus (J. M.) de amaurosi ab ictu oculi 288.
- Hollerius de cæcitate a luculento furni igne 131. laus euphrasie 485. cucurbitæ scarificatæ ad occiput 526. aquæ ophthalmicæ novennem cæcitatem curantis 560.
- Horstius de amaurosi a natta nuchæ ablata 297.
- Houttuyn de cæcitate a crebro microscopiorum usu 134.
- Hudemann de optimo modo præbendi mercur. subl. corros. 462. sq.
- Hünerwolf de amaurosi ab hæmorrhagia narium subito repressa 192.
- Hurbotius de eadem ab irritata vesica & urethra 299.

I.

- Janin de amaurosi perfecta cum mobilissimis pupillis 57. erronea explicatio amauroseos cum vel sine mydriasi 60. sq. casus Pellieriano similis citatur 329. methodus arcana electricitatem adhibendi 601. sq.
- Journal Britannique (v. Floyer).
- - de Medecine (v. Roux, Vandermonde).

A U C T O R U M.

Isaacus de amaurosi ab Rivino per ptyalismi mercurialem curata 448.

Isenflammi varia oculi vitia in cadavere detexit 117. amaurosin ptyalismo spontaneo solutam vidit 371.

K.

Kæmpf laus aconiti in arthritide 467.

Kaltschmied de amaurosi ab aqua in capite 158. a lapsu, provocatis menstruis abeunte 423.

Kellner de amaurosi a supercilii vulnere 296. fumigatione tabacci sublata 540.

Klein de eadem a bulbo ex orbita protruso 111. a varis faciei repressis 200. a podagra retropulsa 210. variolis soluta 377.

Knifel (v. Camerar.) 613.

Kramer de amaurosi ab emesi 223. a febris variolose vi 275. a phthiasi 304.

Krankengeschichte v. Wisbad, de amaurosi usu aquæ Wisbadiensis curata 414.

Küchler de amaurosi a tinea retropulsa 199.

L.

Lanzweerde de amaurosi sialagogis curata 540, uti & fetaceo 634.

Lanzonus de hæreditaria amaurosi 89. a cohibito alvi fluxu 214. de cæcitate ab ophthalmia 260.

Laubius de amaurosi ab encephali abscessu 144.

Lebenwald de eadem ab intermittente febre suppressa 272.

Leber de eadem cicuta curata 433.

Ledelius de cæcitate ab igne fornacum 131. de amaurosi a spiritu vini 168. a cerevisia narcotica 175.

Leibnitz citatus 135.

Lentilius de cæcitate a calce viva oculis inspersa 181. a metastasi febris malignæ 277. de amaurosi ab ictu capitis 284. a vulnere canthi 289. post cephalæam 343. ictero soluta 378. opio sublata 465, uti & lignorum decocto 487. laus trageæ Seretæ in ead. 486. de mercurii globulis in cranio repertis 454.

Lentinus de amaurosi a raphania 174.

Leske (v. Briggs, Geach, Klein, Water, Watson)

Liebichius citatus 419.
 Lieutaud laus olei animalis
 Dippelii 505.
 Linnaeus electricam vim a-
 maurosi inutilem vidit
 568.
 Louis bulbus orbita elapsus
 non semper visu orbat
 107.
 Ludovici de amaurosi ab
 achoribus repressis 198.
 de eadem vesicante cu-
 rata 609.
 Ludwig de amaurosi & ca-
 taracta a scabie repressa
 197. (v. Greding).
 Lyson de amaurosi a con-
 vulsione 237.

M.

Magazin Hamburg. (vid.
 Floyer, Zinn).
 Major de hereditaria amaurosi 89.
 Maitre-Jean de examine
 amauroseos monoculae
 53. negat unquam mor-
 bum esse sanabilem 347.
 Marchettus de amaurosi
 a frontis vulnere 292.
 Marteau de eadem a con-
 vulsionibus 235.
 Marx curavit amaurosin
 cortice Peruviano 512.
 aliam emplastro 564.
 Maucharti casus citati 50.
 289.
 Mauriceau de amaurosi pu-
 erperæ Væ Se pedis cu-
 rata 524.

Mayer de amaurosi a ca-
 thartico, eademque cu-
 rata 413.
 Mayr de electricitatis in
 amauroticis efficacia 595.
 sqq.
 Mead de amaurosi a ter-
 rore 164. ptyalysmo
 mercuriali sanata 439.
 (v. Wintringham).
 Meckel de nervorum fron-
 talium ramificatione 293.
 Medicus de morbo ab dys-
 pepsia 23.
 Meek'ren de amaurosi ictu
 capitis orta 284. alia eo-
 dem sanata 567.
 Meister citatus 39.
 Menochius de visu per
 somnium recuperato 669.
 Mentzelius de amaurosi ab
 epilepsia 242.
 Mery de cæcitate a nervis
 opticis marcidis 117.
 Misc. nat. cur. citata 27.
 50. 89. 116. 131. 144.
 147. 151. 154. 168.
 178. 180. 192. 198.
 201. 205. 212. 214.
 219. 230. 231. 233.
 242. 244. 250. 272.
 277. 283. 288. 294.
 297. 302. 339. sq. 372.
 380. 411. 412. 413.
 416. 426. 452. 457.
 465. 503. 523. 530.
 532. 542. 551. 559.
 610. 615. 629. 631.
 Mohrenheimii casus similis
 Pellieriano 327. sqq.

A U C T O R U M.

- Molitor de amaurosi febrili 270.
- Monro de consensu intercostalis magni cum visus organo 297. sqq.
- Morgagni de amaurosi a colica 84. cum paralyfi musculorum in bulbis 84. a graviditate 92. de Blegny's casu iudicium 112. de retina ossificata 113. unde contorsio nervorum opticorum? ibid. an eorum marcor cœcitate semper causet? 119 sqq. de amaurosi ab aqua in capite 155. sq. a convulsionibus 245. sqq. ab isto capite 286. a vulnere supercilii 291. sq. bulbi 293. negat eam ab obstructis nervis fieri 307. rejicit Brisseau's sententiam 311. sq. de colliqvatione humoris vitrei 312. experimentum Brigg'sii 319. utile 320. de diagnosi amauroseos simulatae 323. de epilepsia post splendores 338. quæ amaurosis incurabilis? 360. laus agitationis nervi frontalis 606.
- Morus de amaurosi catharsi sanata 411.
- Müller de amaurosi a diarrhœa ascitici 225. de alia vesicante curata 610.
- Muralto de cœcitate a variolis 201.
- Muschenbrœck de luce lunæ 136.
- Muys de amaurosi ab oculi vulnere 288.
- Muzel de eadem a tumore encephali 139. de binis per vesicantia ad palpebras posita emendatis 616. sqq.
- N.
- Nebelius de amaurosi venerea curata mercurio 427. alia enematis 532.
- Neisfeld de amaurosi plicam Polonicam abscissam secuta 207.
- Neuhold de eadem plicæ Polonicæ latentis comite 205.
- Newton citatus 135. 310.
- Nootnagel de amaurosi a semicupio frigido 179. dubitat de amaurosi foricariorum 182. & de compressione optici nervi a convulsione 247. de diagnosi amauroseos cum cataracta 321. quænam amaurosis insanabilis? 355. sqq. exemplum magnete curatae 558.
- O.
- Odhelius citatus 8.
- Oehme quæ causâ sit hæreditariæ amauroseos 89. a luce ortam debilitati tribuit 135. de amaurosi

I N D E X I.

- ti a tumore intra cranium 138. ab inflato humore vitreo 149. a scabie repressa 197. ab arthritide retropulsa 209 a Væ Se 213. a nervorum siccitate quando? 217. a partu 219. cho-
roisne an retina visus organum? 313.
- Oribasius mydriasin confudit cum amaurosi 49. in priore objecta minora videri ait 267.
- P.
- Panarolus de amaurosi a nimia venere 230.
- Paullini de eadem causa 230. a balneo 178. vermium excretionem soluta 372. sq.
- Pausanias de cephalæa solvente amaurosin 38.
- Pawius de amaurosi ab aquæ in encephalo 146.
- Pechlin de eadem catameniorum fluxu soluta 373.
- Pellier de cataracta fingente simul amauroseos phænomena 326.
- Petitus de proprii oculi in objecto visione 40. experimenta de intercostalis magni cum oculo consensu 298.
- Platerus male carpit veteres 266. de amaurosi a tumore encephali 140.
- a colica & convulsione 251. cum explicatione 246.
- Platner explicat Hippocratem de vulneribus superciliorum 291.
- Plempii hallucinatio 266.
- Plinius de cæco a somnio 165. de nictitatione involuntaria 323.
- Poterius de cæcitate ab ulcere sanato 195.
- Primitiæ Poloniæ (v. Hermann, Neifeld).
- Pristley citatus 313.
- Püschel de amaurosi tartaro emetico curata 404.
- Q.
- Qvelmalz de amaurosi electricitate curata 588.
- Qvercetani aqua ophthalmica 561.
- R.
- Rabours quæ mala a pyralismo mercuriali? 453.
- Raius de cæcitate a stramonio 172.
- Ramazzinus de foricariorum amaurosi 182.
- Rayger de amaurosi a mora in aqua frigida 180. de ejus cura per vesicantia 614. sq.
- Reinhold laus aconiti in arthritide 467.
- Reusneri collyrium 560 sq.

AUCTORUM.

Reydt aquis piperinis curata amaurosis 536.

Rhodius de cæcitate a luce 130. a diaphoretico 178. a laconico 179.

Ribe de amaurosi tartaro emetico curata 392.

Richter de prorsus contracta pupilla 8. de visu laterali 16. de amaurosi cum cataracta 26. ejus lente nascentis phænomena 31. 41. sq. eadem bis cum myosi 51. cum pupilla mobilissima 56. cum eadem oblonga 62. de pallore pupillæ amauroticæ 63. unde is? 65. 312. de amaurosi a viscerum abdominis vitio 102. ab onere gestato 161. a terrore 163. a perspiratione suppressa 186. an a nervi optici distractione? 107. a sinuum frontaliū oppilatione 191 ab ophthalmia 259. a vulnere palpebræ 293. cum liqva-
to humore vitreo 312. de difficultate diagnosticos certæ 318. Pelliericatum explicat 327. quoties amaurosin curavit? 348. quæ curatu difficilior? 356. sqq. fluxu narium levata, & contra 470. cataracta soluta 381. curata emetico 394. optimus hic tartarus e-

meticus 395. sq. qui solventibus junctis morbum emendavit 398. sola etiam solventia profuere 429. uti & catharticum 413. & valeriana 502. sq. nihil profuisse vidit vel mercurium 455. vel arnicam 481. sq. vel pulsatillam 500. vel martem 507. vel electricitatem 568. nec in periodica juvit cortex Peruv. 515. laus aquæ frigida 554. (v. Lyson).

Riedlin citatus 74. de prolibus cunctis a nativitate cæcis 105. de amaurosi a crapula 167. a balneo sudatorio coriariorum 179. ab arthritide repulsa & vomitu 209. a vomitu cruento 223. a vigiliis 227. martialibus cedens 507. setaceis curata 634. 644.

Rigler cortice sustulit amaurosin 510.

Riolanus citatus 115.

Riverius laudat cucurbitam scarificatam ad occiput 526. & vesicans ad caput rasum 610. (v. Formius).

Rivinus de amaurosi a tinea repressa 199. expellentibus curata 417. alias ptyalismo mercur. 448.

Rolfincius de gravidarum amaurosi 91. sq. & cum

liq̃vato humore vitreo
307. de cæcitate ab ex-
tenuato nervo optico
114.

Rommelius de amaurosi a
Væ Se 212. præsertim
cephalicæ 523.

Rondeletius de eadem ene-
mate sanata 530.

Rothart de eadem lochiis
soluta 374.

Rougers de eadem ab aqua
effusa in encephalo 153.

Roux de eadem ab aqua
in encephalo ibid. (v.
Becherel, Daquin, Janin,
Pelhier).

Rowley in mortuis nil cau-
sæ reperit 331. binas
amauroses mercurio &
sarsaparilla sanavit 455.

Rumler de amaurosi a Væ
Se 212.

S.

Sachs de epilepsia post
splendores 334.

Saint-Yves de fragi & ocu-
li proprii effigie in ob-
jectis 39. sq. de ama-
urosi cum myosi 51. de
diagnosi amauroseos 51.
sq. præsertim monocu-
læ 58. choroideam esse
vult visus organum 61.
amaurosis comata 88.
sq. monocula etiam sa-
num oculum lædit 94.
346. sed non intra idem

semper tempus ibid. ain-
blyopia a sole inspecto
127. amaurosis a fulgu-
re 130. ab igne luculen-
to 131. a passione hyste-
rica 101. a febre acuta
an sanabilis? 355. ali-
quoties curata 347. eme-
tico 391. diaphoreticis
417. an extirpatio ocu-
li cæci tentanda? 658.

Salnuth de amblyopia a so-
le 127. de amaurosi gra-
vidæ 91. a lactatione
228. a capite contuso
284. pane calido capitis
vertici admoto curata
563.

Sammlung. Fränk. de a
maurosi imperfecta cum
variis apparitionibus 36.
(v. Müller).

Sandifort (v. Cramer).

Saunder vimelectricam fru-
stra in amaurosi tenta-
vit 568.

Sauvages male definit a-
maurosin 5. de ama-
urosi a struna opticis in-
sidente 142. ab hyda-
tidibus retinæ 305. fo-
ricariorum 182. a con-
vulsione 246. Væ Se
frontis eam curari vi-
dit 520. extirpationem
oculi rejicit 659.

Schaarschmidt de uveæ pa-
ralysi 313. de amauro-
si post hemieraniam 73.
setaceo curata 636. 1qq.
reji-

AUCTORUM.

- rejecit exstirpationem oculi 958. (v. Henckel).
- Schacht (Ooft.) amaurosin cum Galeno definit 7.
- Schenk de bulbi procidentia visu perstante 107. de amaurosi a luce 131. (v. Camerar. Cneulin, Hildesius, Pausanias).
- Schenkbecher laus aconiti in arthritide 467.
- Scheuchzer de amaurosi a Væ Se 218. alia sponte abeunte 362.
- Schiebel de eadem a Væ Se 211.
- Schnucker de visu duplicato 45. sq. de choroidea in cæco rubente 46. de amaurosi cum pupillis mobilissimis 57. hallucinatio 60. sq. de pallore pupillæ amauroticæ 63. de amaurosi solvente cephalæam 72. a gravitate 91. a tumore juxta bulbum 110. a fulgure 130. a siccis naribus 191. a podagræ metastasi 210. a cranii læsionibus 280. quænam sanabilior? 356. 358 laus tartari emetici ad eam curandam, dandiqve eundem ratio 396. sangvinis mittendi necessitas 397. per hirudines 525. laus mercurii & noxæ 463. aquæ frigidæ 554. millepedum 491. errhini mercurialis 547. spiritus ophthalmicus Auctoris 561. inutilitas amicæ & pulsatillæ 482. electricitatem non prorsus rejicit 568. sq. aliquot amauroses curavit 402. 547. 689. 691. 693. (v. Püschel).
- Schneider de amaurosi ab hydrocephalo 150.
- Schober de eadem ab osseo encephali tumore 147.
- Schröck de eadem ab aqua cranii 154. de alia enematibus curata 530.
- Schubart de inveta mydriasi citra amaurosin 50.
- Schulz de amaurosi a plica Polonica rescissa 205. ab eadem latente 206. post epilepsiam 244. fonticulis curata 631.
- Sculetus de eadem ab extenuatis nervis opticis 114. sq. de alia fetaceo curata 635. quod in alia nil effecit 644. (v. Lamzweerde).
- Seger de amaurosi curata diaphoresi 416.
- Segnitz de eadem a febre intermittente suppressa 273. de alia errhinis curata 545.
- Sennertus de amaurosi gravidarum 91. a passione

I N D E X I.

- hypochondriaca 102.
a scabie repressa 196. a
cathartico validiore 244.
a plica Polonica rescissa
205. (v. Starnigelius).
Sigel de amaurosi per ele-
ctricitatem aliquatenus
emendata 569.
Silvaticus taxatur 323.
Slegel de hæmorrhagia ar-
te in naribus excitata a-
maurosin curante 522.
Smetius de visu per nasum
16. & dimidiato 13.
de amaurosi cum cata-
racta 28. a colica & epi-
lepsia 250. 252.
Spengler de electricitate
amaurosin curante 590.
Spigelius de amaurosi ve-
neræa ptyalifino mercu-
riali sanata 457. uti &
Væ Se in fronte 520. &
fetacei 632.
Spilenberger de eadem a
singulari cachexia 302.
Spindler de eadem ab epi-
leptia 242. (v. Rayger).
Sprægel de eadem curata
Væ Se facta usque ad
syncopen 527.
Starnigelius de eadem a
plica Polonicæ rescissio-
ne 204. sq.
Stock de eadem longo vi-
dendi desiderio fugata
670.
Stœller laus aconiti in ar-
thritide 467.
Störck de amaurosi cicuta
usu curata 429. sqq.
uti & usu pulsatillæ
495. sqq. corticis Peru-
viani 512. vesicantibus
623. sq. laus aconiti in
arthritide 466. sq. cicu-
tæ 436. (v. Hezel, Le-
ber, Strack, Taube).
Storch de amaurosi a nar-
cotiis 171. ab illapsu
in aquam gelidam 180.
a mensibus suppressis
195. ab epilepsia 244.
a lapsu 285. a faucium
abscessu 304. soluta ru-
pto eodem 376.
Strack de amaurosi usu
cicutæ semel, non ite-
rum, curata 433. 436.
Swieten de amaurosi a me-
tastasis febrium acuta-
rum 275. sq.
T.
Taube cicuta curavit amauro-
sin 434.
Tillingius de amaurosi in
thermis Carolinis subla-
ta 414.
Tinnæus de eadem a cra-
pula 168. ab ulcere fa-
nato 195. sq. a lapsu in
caput 285 in febris in-
termittentis paroxysmis
270.
Tralles citatus 172.
Trecourt a scabie repressa
amaurosis 197. ulceribus

A U C T O R U M.

pone aures factis perfacta 627.

Trew a vomitu cruento amaurosis 223. oleo Cajeput curata 492.

Triller a faciei maculis pustulisque retropulsis amaurosis 200.

Tulpius a vino suspecto amaurosis 176. curata vesicantibus 616.

V.

Valfalva citatus 105. ejus annulus moderator nervi optici non datur 245. amaurosis a levi bulbi vulnere 293. in ea curanda nervi frontalis agitatiō est utilis 605. sq.

Valverdus erūto bulbo nervum opticum emarcescere vidit 125.

Vandermonde de amaurosi verminosa anthelminticis sanata 427. (v. Bertrand, Fournier).

Vater (A.) de visu dimidiato 13. de amaurosi recedente cum miris visus varietatibus 18.

Velsch de amaurosi a miliaribus 204. a Væ. Se 212. per febrem soluta 364. (v. Reusner, Slegel).

Versuche Edinb. (v. Demours).

Vesalius de marcōre nervi optici post bulbū erutum 124.

Veza de amaurosi curata remediis Collini & Störckii 695. uti & aliqvatenus electricitate 599.

Vicat a metastasi rheumatica amaurosis 208.

Vieussenius amaurosin a convulsione explica 246.

Vogel (R. A.) male definit amaurosin 7. emetica quid contraindiciet? 405. sq.

- - (A. F.) de amaurosi cum cataracta, quin nosci potuerit prior 330.

Volekamer magnete amblyopiam emendavit 559

Vorwaltner ab inedia amaurosis 231.

W.

Wandeler ab encephali tumore amaurosis 138.

Warner laus olei animalis Dippelii in amaurosi 505.

Watson a convulsionibus amaurosis 239.

Weber de amaurosi emenagogis curata 421. alias magnete 555. sqq.

Wedelius de amaurosi a calore 190. a repressis achoribus 198. a nimia hæmorrhagia 219. ab emesi 221. vesicante curata 609.

I N D E X II.

- Weikard laus aquarum
Brückenaviensium in a-
maurosi 508.
- Wepferus de pallore pupil-
læ sine cataracta, & co-
lore glauco sine vitio
vitrei humoris 27. de
amaurosi intermittente
189. a sero encephali
152. ab hemiplegia 258.
per epiphoram soluta
365. curata setaceo 641.
& aliis ulceribus 698.
de epilepsia post splen-
dore 338. de mercurio
in cranio mortui re-
perio 454.
- Westphal de amaurosi
lisino mercur. curata
439.
- Wetzprémi de eadem bal-
neis frigidis curata 538.
- White de consensu oculi
cum naribus 296. de
amaurosi a gummi Gua-
jaco 93. a bulbi situ
violente mutato 109.
a fossione ininerarum
plumbi 183. sq.
- Whytt de amaurosi eme-
tico & antacidis curata
395.
- van der Wiel de eadem
a vulnere thoracis 214.
- Willis de amaurosi ab aqua
encephali 150. a sangvi-
ne ibidem 151. a con-
vulsione 246.
- Wincler cathartico sustulit
amaurosin 412.
- Winslow citatus 298.
- Wintringham ulcerum po-
ne aures in amaurosi laus
626. sq.
- Wogau a quartana sup-
pressa amaurosis 273.
- Wolff (C. S.) de viâ di-
midiato 14.
- - (J.) de amaurosi
post hemieraniam 75.
- Z.
- Zacutus de amaurosi ab
alapa 281. a syphilitide
305. setaceo curata 703.
- Zetzellius (v. Linnæus).
- Zinn de retina ossificata
113.

INDEX II.

RERUM ET VERBORUM.

A.

- A**bscessus amaurosin
causans 303 sq. ruptus
eandem solvens 376.
- Achores repressi amauro-
seos causa 198. sq.
- Aconiti laus in amaurosi
& arthritide, illudque
dandi modus 466. sq.
- Acria oculis applicata cœ-
citatem creant 181. sqq.
- Aer frigidus fugat amauro-
sin 663. uti & muta-
tus 669.
- Aesculapii in templo cœci
curati (v. Gruterus).
- Aetas maxime obnoxia a-
maurosi 88.
- Affectus animi causant a-
maurosin 163. sqq. cu-
rant etiam 669. sqq.
- Agitatio nervi frontalis a-
mauroticis utilis 605. sq.
- Alimenta in cura amauro-
seos quando vel danda
vel neganda? 659.
- Alvus fluxa solvit amauro-
sin 372.
- Amaurosis quid? 1 sqq. quo-
tuplex? 10. male cum
mydriasi confusa 49. sine
qua esse potest, imo cum
myosi 51. ejus sympto-
mata 29. sqq. causæ
proegumenæ 88. sqq.
procatarepticæ 104. sqq.
proxima 305. sqq. dia-
gnosis varia 317. sqq.
prognosis 331. sqq. cu-
ratio varia 389. sqq.
- Amblyopia 29. cum fragi-
litate, oculis obversante
40. cum oculi proprii
pictura in objectis ibid.
- Analeptica quando in cu-
ra amauroseos danda?
661. sq.
- Anthelmintica curant amauro-
sin 426.
- Antiparalytica curant amauro-
sin 466.
- Antispasmodica curant amauro-
sin 465.
- Aphonia 86.
- Apophlegmatismi curant
amaurosin 532. sqq.
- Applicata externa quando
creant amaurosin? 178.
sqq.
- Aque frigidae noxæ 181.
laus in amaurosi 553.

I N D E X II.

ophthalmicæ 560. sq.
 foteriarum 414.
 Aranei gutta oculo illapſa
 excæcat 32.
 Arenæ candor excæcat 132.
 Arnica laus in febrilibus in-
 termittentibus & amauro-
 ſi 468. ſqq. modus
 eam præbendi 479. ſq.
 Arthritis retropulſa cauſat
 amauroſin 208. ſq.
 Aſciticæ aquæ repente e-
 vacuatæ creant amauro-
 ſin 225.
 Aſellorum laus in amauro-
 ſi 491.

B.

Balbuties 86.
 Balnea amauroſim inducunt
 178. ſqq. eandem curant
 533. tum calida 534.
 tum frigida 536.
 Baſilici brachii ſecanda in
 amauroſi 561.
 564.
 Barbæ raſura creat amauro-
 ſin 90.
 Barbaris amauroſis dicta
 gutta ſerena 9.
 Baſilica brachii ſecanda in
 amauroſi 523.
 Biles piſcium pro collyrio
 laudantur 549.
 Brachii vena quæ ſecanda?
 523.
 Bulbus oculi amaurotici ſic-
 cus 66. durus 66. va-
 ricoſus, ſtridulus, tumi-
 dus vel marcidus, cum

ſenſu ſabuli inhærentis
 67. ex orbita propulſus
 non ſemper viſum tollit
 107. bulbi cæci extirpa-
 tio rejicitur 657.

C.

Cachexiæ generant amauro-
 ſes 300. .
 Cajeput oleum curat eas-
 dem 492.
 Caligo num idem cum a-
 mauroſi? 8. 9.
 Candor arenæ, nivis excæ-
 cat 132.
 Capitis læſio amauroſin
 cauſat 280. morbi cum
 amauroſi juncti ſunt omi-
 noſi 342.
 Cataracta incipiens ab a-
 mauroſi qui dignoſcen-
 da? 321. eidem com-
 plicata 325. eandem ſol-
 vens 380.
 Catarrhus narium amauro-
 ſin creat 268.
 Cathartica curant amauro-
 ſin 407. ſqq. qvalia dan-
 da? ibid.
 Cauſæ amauroſeos proequi-
 menæ 88. procatarticiæ
 104. proxima 9. 305.
 Cauſticorum virtus in a-
 mauroſi 626.
 Cephalæa amauroſin præce-
 dit vel comitatur 67.
 ceſſat ſubinde nata amauro-
 ſi 344. hancce ſolve-

RERUM ET VERBORUM.

- re visa est, 378. ejus
varietates 67. fqq.
- Cephalicæ sectio obest vi-
sui 523.
- Cephalica varia laudata
563. fqq.
- Chelidonii succus efficax
ad amaurosin 551.
- Cholera amauroseos causa
226. fqq.
- Cicuta curat amaurosin 429
fqq. at non quameunque
434.
- Cinnabaris laus in amauro-
si 501.
- Cæcitas connata 105. fqq.
ab aranei gutta oculo il-
lapsa 32. a saliva ser-
pentis faciei illisa 33.
non impedit a variis a-
ctionibus 106.
- Colli vulnus amaurosin ac-
civit 297.
- Colliquatio humoris vitrei
(v. hunc).
- Collyria varia ad amauro-
sin & amblyopiam
550. fqq.
- Colores primigenii in vi-
sus reversione conspicui
385.
- Coma 80.
- Complicata cum aliis mor-
bis oculorum amaurosis
26. fqq.
- Connata amaurosis 83. fqq.
- Consensus oculorum amauro-
sin ex uno in alium
traducit 93.
- Continua amaurosis 23.
- Convulsio variarum par-
tium cum amaurosi 83.
bulborum ibid. causat
amaurosin 232 aliquan-
do eam solvit 364.
- Cortex cerebri sedes amauro-
seos 315. Peruvianus
amaurosin sustulit perio-
dicam 507. fqq. semel
vero exasperavit 515.
- Cranii ustio (v. ustio).
- Crines sub alis recrescen-
tes amauroseos causa 90.
- Crisès variæ amaurosin sol-
ventes 364.
- Cucurbita scarificata ad oc-
ciput tollit amaurosin
526.
- Curabilisne amaurosis? &
quæ? 347. fqq.
- Curatio varia amauroseos
390. fqq. non semper
visum pristinum reddit
383.
- Cursus amauroseos causa
161.
- D.
- Definitio amauroseos varia
2. fqq. nulla hæcenus
exacta habetur 8. vix
etiam speranda ibid.
- Delirium 84.
- Desiderio longo videndi
profligata amaurosis 669
fqq.
- Deuteropathica amaurosis
28.

I N D E X II.

- Diæticum regimen in amauroseos curatione 659. fqq.
- Diagnosıs amauroseos absoluta 317. tum inchoantis ibid. tum perfectæ 318. relatıva, qva ab aliis morbis oculorum diuoscitur 321 fqq. tum simulatæ 322. complicatæ 325. demum sedis mali 330.
- Diaphoretica amaurosin causant 170. curant 416. fqq.
- Dolor capitis (v.cephalæa), oculorum, palpebrarum 78 dentium causat amaurosin 249 uti & colicus 250. & parturientium 252.
- Duratio amauroseos varia num ad curabilitatem faciat? 349. fqq.
- E.
- Effectus amauroseos 344.
- Electricitate curatæ sæpe amauro es sæpe non 567. fqq cum qveis illa cautelis adhibenda? 593. fqq.
- Embrosches vis in amaurosi curanda 602.
- Emesis solvit amaurosin 372.
- Emeticis curata sæpe amaurosis 390. ea alii vetant ibid. quando danda? 394. qvalia? 395. cum qveis cautelis 397. quando non danda? 405.
- Emmenagoga curant amaurosin 418.
- Emplastro curata amaurosis 534.
- Enematis curata amaurosis 529. fqq.
- Epilepsia 86. præfagitur ab amaurosi 339. hac superueniente cessat 344. solvit amaurosin 364.
- Epiphora solvit amaurosin 365.
- Errhina excitantia in exhaustis a venere 547. curant amaurosin 543. præsertim mercurialia 546. qvæ iis præmittenda? 544.
- Euphrasie virtus ad amaurosin curandam 485.
- Exanthemata retropulsa causant amaurosin 196. egressa solvunt 377.
- Exostoses veneræ ossis multiformis inducunt amaurosin 148.
- Exstirpatio bulbi cæci ad alterum servandum an utilis? 557.
- Extravasata encephali amauroseos causa 149 fqq.
- F.
- Fasciatio abdominis ascitici reddit visum 225. fq.

RERUM ET VERBORUM.

Febres varie causant amaurosin 269. eandem solvunt 364.

Fel (v. bilis).

Ferri usus ad amaurosin 507.

Fluidi nervei in retinam influxus impeditus est proxima causa amauroseos 314.

Fluxu narium imminuta amaurosis 370.

Fonticulis curata amaurosis 629. lqq.

Foricariorum amaurosis 182.

Fragi phantasma oculis perpetuo obversans 40.

Frigus intensum curavit amaurosin 663. lqq.

Frontalis nervi agitatione sublata amaurosis 605. læsione accita 287. lqq.

Frontis Væ Sæ utilis in amaurosi 520. vulnere sublata eadem 521. 608.

Fumigatio curat amaurosin 540. lqq.

G.

Galli sanguis illitus cæcitatem abolevit 552.

Genera varia amauroseos 10. lqq.

Graviditas causa amauroseos 90. lq.

Gutta serena quid? 9.

H.

Hæreditaria amaurosis 89.

Hæmorrhagiæ subito co-

hibita causa amauroseos 192.

Hemiplegia cum amaurosi 253. lqq.

Hirudinum applicatio ad tempora, collum, anum in amaurosi, ad vulvam in suppressis menstruis 525.

Historiæ selectæ amauroseos 672. lqq.

Humor vitreus (v. vitreus humor).

Hypochondriaca &

Hysterica passio amauroses causant 101.

I.

Icterus solvit amaurosin 378.

Icto capite visus reversus 567.

Idiosyncrasia amauroseos causa 90.

Idola optica 31. perniciofa in acutis 341.

Imperfecta amaurosis quid? & quotuplex? 12. lqq.

Indicationes in curanda amaurosi 389.

Inedia amaurosin causat 231. curat 660.

Inflammatiō (v. ophthalmia).

Ingesta amaurosin causantia 166. lqq.

Intermittens amaurosis 23.

Ira amauroseos causa 163.

Jugularis venæ sectio utilis in amaurosi 522.

INDEX II.

L.

- Laconicum accivit amaurosim 179.
 Lacrimandi impotentia ex amaurosi 345.
 Lactis metastasis causat amaurosim 191. uti & major ejus vacuatio 228.
 Laxitas vasorum ophthalmicorum causa amauroseos 93.
 Lens crystallina tumens causat amaurosim 149. vel eam mentitur 326. sqq.
 Lente nascens amaurosis 22.
 Lignorum decoctum curat amaurosim 486. sqq.
 Litus ophthalmici varii 561 sqq.
 Lochia imminuta vel suppressa amauroseos causa 193. profluentia eandem solvunt 373.
 Lotio frigidissima aqua induxit amaurosim 181.
 Ludibria optica quid? & qualia? 30. sqq.
 Lumbricorum liquor pro collyrio 552.
 Lux exæcat solaris 126. lunaris 128. flammæ 231. fulguris 130. pulveris pyrii accensi ibid. microscopiorum 133. quæ ratione id accidat? 135. sqq.

M.

- Magnete artificiali curat amaurosis 555. sqq.
 Martialia curant amaurosim 507.
 Menstrua varie causant amaurosim 193. fluentia eam solvunt 373.
 Mercurialis ptyalisinus curat amaurosim 437. sqq. non quamlibet 438. mercurialia quot scopis convenient? 437. errhina utilia 546.
 Metastases amaurosim inducunt 185. solvunt 377.
 Miliaria regressa amaurosim causant 204.
 Millepedum laus in amaurosi 491.
 Modi 4 amauroseos 316.
 Mœrore conscita amaurosis 163.
 Monetæ fulgentes exæcant 132.
 Monocula amaurosis 10.
 Morbilli regressi amaurosim induxerunt 202. sqq.
 Motus muscularis concitator amaurosim accivit 160.
 Mydriasis quid? 49. male cum amaurosi confusa ibid. potest sine amaurosi esse ibid. ingens cum visu optimo 50.
 Myosis quid? 51. juncta amaurosi ibid.

RERUM ET VERBORUM.

N.

Narcoticis inducta amaurosis 175.

Narium læsio causat amaurosin 296. ut & siccitas 190. fluxus solvit 370. nec minus hæmorrhagia arte facta 522.

Nervinis curatur amaurosis 464. sqq.

Nervus opticus deficiens 105. distractus visum non semper tollit 107. uti nec extenuatus 114. sqq. induratus 111. contortus 113. erosus, percissus 114. ejus obstructio 306. paralyfis 313 sedes amauroseos in eodem 315. ejus thalamus 315.

Nervus frontalis agitato amaurosin solvit 605. læsus causat 291. sqq.

Nervus remotior etiam læsus vel irritatus amaurosin causat 297.

Nigriorne pupilla amaurotica? 62. sqq.

Nitor monetarum excæcat 132.

Nivis aspectus visum lædit 33.

Nixus validi causant amaurosin 161.

O.

Obstructio nervorum opticorum a veteribus in

amaurosi accusata 306. nequit defendi 307.

Oculi proprii imago conspicua 40. cæci extirpatio (v. hanc).

Oleum Cajeput curat amaurosin 492. empyrevmaticum perinde 551. ex hepate piscium quorundam 550.

Onerum gravium levatio, gestatione causat amaurosin 161.

Ophthalmia sæpe efficit amaurosin 259.

Opii in amaurosi usus 404. 465.

Optici nervi (v. nervus)!

Optica ludibria quæ? 30. in sanescente morbo 285.

Oryzæ calidæ esus amauroseos causa 172. sq.

P.

Pallor pupillæ amauroticae 63. sqq.

Panis calidi capiti admoti laus in amaurosi 563.

Paralyfis cum amaurosi 82. nervorum opticorum an causa amauroseos? 313.

Partus causat amaurosin 162.

Pathemata animi (v. affectus).

Pedis Væ So in amaurosi quævis utilis? 523.

Perfecta amaurosis quæ? 11.

Periodica amaurosis 24. sq.

Perspiratione suppressa nata amaurosis 185. sqq.
 Phlebotomia in amaurosi 525.
 Phrenitidis in febribus acutis prænuucia idola nigra 341.
 Plica Polonica latens vel abscissa induxit amaurosim 204. sqq. 306. recrescens eam solvit 377.
 Podagra (v. arthritis).
 Potus inebrians amaurosim creat 166.
 Prognosis varia in amaurosi 331. sqq.
 Protopathica amaurosis 28.
 Proxima causa amauroseos 306. sqq.
 Ptyalisinus invexit amaurosim 228. solvit eandem 371. præsertim mercurialis 437. sqq. licet non semper 438. sqq. maxime veneream curat 457. sqq.
 Pulsatilla nigricante curata amaurosis 495. sqq.
 Pupillæ ex toto contractæ 8. earum vitia in amaurosi, nempe diameter, qualis? 48. mobilitas 51. sqq. figura 62. color ibid. sqq.
 Purgantia curant amaurosim 407. sqq.
 Purpura regressa amauroseos causa 204.

R.

Raphania cum amaurosi 174
 Retina amauroseos sedes 314. ossificata vel lapidescens 112.
 Roborantia curant amaurosim 505. sqq.
 Rubor pupillæ amauroticæ insolitus 66.

S.

Salivæ imminuta secretio amaurosim creat 190. aucta solvit 539.
 Salivatio (v. ptyalisinus).
 Sangvinis missio in amaurosi utilis 517. quæ eam indicent? 397. 518. quæ vetent? 518. quæ venis? 519. sqq. quantita? 527. quæ modis, & instrumentis? 525.
 Sanguis galli pro collyrio 552.
 Scabies repressa amauroseos causa 196.
 Scarificatio solita omissa amauroseos causa 192.
 Sedes amauroseos quotumplex? 314. sqq.
 Selectus venarum tundendarum in amaurosi 519.
 Sensus alii lesi amauroseos comites 87.
 Setaceis curatur amaurosis 632. non semper tamen 643. sq. 703.
 Sialagogæ in amaurosi utilia 539.

RERUM ET VERBORUM.

Simulatæ amauroseos dia-
 gnosis 322.
 Solventium laus in amauro-
 si 398. 428.
 Solutio amauroseos varia,
 nempe spontanea 361.
 convulsione 364. febre
 ib. metastasi 377. crisi ib.
 Somnio soluta amaurosis
 669.
 Sphœnoidis ossis (v. ex-
 ostosis).
 Spiritus ophthalmicus 561.
 salis ammoniaci causa
 morbi 92. vini vapor
 pro collyrio 552.
 Splendor monetarum ex-
 cæcat 132.
 Splendores amaurotici 40.
 præfagi convulsionum
 332. sqq.
 Sponte abiens amaurosis 361
 Sternutatio nimia amauro-
 seos causa 252.
 Strumane solvit amauro-
 sin? 380.
 Subita amaurosis 19.
 Sulphuris aur. antimonii
 laus in amaurosi 501.
 Superciliorum læsiones a-
 mauroseos causa 291 sqq.
 Surditas, tinnitus cum a-
 maurosi 87.
 Symptomata amauroseos
 29. sqq.
 Symptomata amaurosis
 28.
 Syphilitica amaurosis 304.
 curatur mercurio 457.

T.

Tartarus emeticus profi-
 cuus 395. sqq. qvi dan-
 dus? 396.
 Terrorem secuta amauro-
 sis 163.
 Thalami nervorum optico-
 rum sedes amauroseos
 315.
 Tinea repressâ amauroseos
 causa 199.
 Tinnitus cum amaurosi 87.
 Topica varia ad amauro-
 sin curandam 548. sqq.
 Tremor cum amaurosi 86.
 Tumores varii causantes
 amaurosin 137. sqq.

V.

Valerianæ radice curata
 amaurosis 502.
 Vapor spiritus vini in a-
 maurosi utilis 552.
 Vapores acres vitium læ-
 dentes 182. sq.
 Vari faciei aboliti amauro-
 seos causa 200.
 Variolæ post se amaurosin
 reliquere 201.
 Venæ quæ secundæ in a-
 maurosi? 519. sqq.
 Venena assumpta amauro-
 seos causa 171.
 Venus nimia amaurosin
 causat 229.
 Vermes intestinorum a-
 mauroseos causa 300.
 excreti eam solvunt
 372.

INDEX II. RERUM ET VERBORUM.

Vertigo cum amaurosi 79.

Vesicantia pone aures amauroseos causa 178. variis locis applicata eandem curant 609. qveis cum cautelis adhibenda? 623.

Vigiliæ amaurosin creant 227.

Vini laus in amaurosi 503.

Vis externa amauroseos causa 280 sqq.

Viscerum abdominalium vitia creant amaurosin 102.

Visus duplicatus 15. 45. dimidiatus 12. e directo 14. supernus 15. lateralis 15 per nasum 16. trans nebulam, fumum, nubemvè apparens fieri 30. simulacrorum variorum 31. sqq. acrior oculi sani 345.

Vitreus humor colliquatus 103. pro causa morbi p oxima habitus 307. confutatur 310.

Ulcera siccata amauroseos causa 195. arte facta eam curant 607. sqq.

Unguenta varia ophthalmica 561. sqq.

Vomitum soluta amaurosis 372.

Ustio cranii ad amaurosin curandam an svadenda? 645. sqq.

Vulnera frontis causant amaurosin 291. sqq. curant eandem 521. 608. (v. vis externa, capitis læsio, colli vulnus, extravasata, nervi læsio, nervus).



B U D Æ

TYPIS CATHARINÆ LANDERER.

ERRATA.

- Pag. 7. linea 19. pro aculi *lege* oculi
— 20. nota (b) pro A. D. G. *lege* A. E. H.
— 46. nota (o) post *Schriften* adde 2 Band.
— 75. linea 1. pro §. 16. *lege* §. 19.
— 198. linea 1. pro §. 37. *lege* §. 38.
— 211. linea 1. pro obortiis *lege* oborti iis.
— 222. linea 12 pro ὀρθοστάδιος *lege* ὀρθοσάδιος.
— 237. linea 1. pro §. 49. *lege* §. 40.
— 547. linea 5. pro ut erqvecura *lege* uter-
que cura.
— 633. nota (g) pro *Mediæcine* *lege* Me-
decine.



